ЭКСТРАКЦИЯ АССОЦИАТОВ ГАЛОИДНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ
АНИОНОВ РТУТИ(II) С ОСНОВНЫМ КРАСИТЕЛЕМ—
КРИСТАЛЛИЧЕСКИМ ФИОЛЕТОВЫМ

В. М. ТАРАЯН, Е. Н. ОВСЕПЯН и С. П. ЛЕБЕДЕВА

Ереванский государственный университет

Поступило 26 I 1970

Исследовано взаимодействие хлоридного и бромидного анионных комплексов ртути(II) с трифенилметановым красителем—кристаллическим фиолетовым. Выбраны экстрагенты, определена оптимальная кислотность водной фазы. Максимум светопоглощения экстрактов соединения в случае хлоридного анионного комплекса ртути(II) находится при 605 нм, а в случае бромидного—при 595 нм.

Кажущиеся молярные коэффициенты погашения экстрактов соединения хлоридного анионного комплекса ртути(II) $\epsilon = 82000$, бромидного — $\epsilon = 100000$.

Оба аниона взаимодействуют с катионом кристаллического фиолетового в соотношении 1:1. Выяснено влияние сопутствующих элементов.

Рис. 5, библи. ссылок 5.

Применение основных красителей при экстракционно-фотометрическом определении микрограммовых количеств различных элементов получило широкое распространение и признание.

Литературные данные, посвященные соответствующим методам определения ртути(II), ограничены. Так, имеются только указания о применении основного красителя трифенилметанового ряда—малахитового зеленого [1, 2]. Совсем недавно краситель того же ряда—кристаллический фиолетовый—был применен для экстракционно-фотометрического определения следов ртути в растениях, силикатах, почвах, природных водах, воздухе и различных газах. При этом для получения соответствующего ионного ассоциата было использовано взаимодействие йодидного анионного комплекса ртути с кристаллическим фиолетовым [3]. В цитируемой работе отсутствуют данные, широко характеризующие этот краситель как реагент для экстракционно-фотометрического определения ртути.

Нами изучено взаимодействие указанного основного красителя с двумя различными галоидными комплексными анионами ртути(II): хлоридным и бромидным. Одновременно проведено детальное исследование возможностей использования красителя кристаллического фиолетового (КФ) в качестве реагента при экстракционно-фотометрическом определении ртути.

Экспериментальная часть

Исходный раствор соли ртути(II) готовили растворением навески $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$ в 20 мл разбавленной азотной кислоты (2:3) с дальнейшим

разбавлением полученного раствора дистиллированной водой до 1 литра. Титр этого раствора устанавливали по точной навеске гарантийного препарата хлорида натрия с индикатором—дифенилкарбазидом, и потенциометрически.

Раствор красителя готовили растворением его навески в соответствующем объеме дистиллированной воды. Кислотность водной фазы регулировали добавлением разбавленной соляной или бромистоводородной кислоты. Равновесные значения рН измеряли стеклянным электродом (ламповый потенциометр ЛПУ-01), оптическую плотность экстрактов—на спектрофотометре СФ-4А. Соотношение водной и органической фаз было равно 1:1, объем каждой из них—10 мл.

Рис. 1. Кривая светопоглощения бензольных экстрактов соединения хлоридного анионного комплекса ртути (II) с КФ в зависимости от кислотности водной фазы (рН: 1—0,65; 2—1,30; 3—1,60; 4—2,25; 5—2,6; 6—3,0) относительно экстракта „холостого“ раствора. $[Hg^{2+}] = 0,5586 \cdot 10^{-5}$ М.

Рис. 2. Кривая светопоглощения экстрактов соединения бромидного анионного комплекса ртути (II) с КФ в зависимости от кислотности водной фазы (рН: 1—0,7; 2—1,02; 3—1,5; 4—2,57; 5—3,11) относительно экстракта „холостого“ раствора $[Hg^{2+}] = 0,931 \cdot 10^{-5}$ М.

В случае хлоридного анионного комплекса ртути (II) наиболее эффективным экстрагентом оказался бензол, а в случае бромидного—бинарная смесь: диэтиловый эфир—бензол в соотношении 4:1.

На рисунках 1 и 2 приведены спектры поглощения экстрактов соединений хлоридного и бромидного анионных комплексов ртути (II), с исследуемым красителем в зависимости от кислотности водной фазы, снятые относительно «холостого» раствора*.

Для экстрактов соединения хлоридного анионного комплекса ртути (II), а также экстракта самого красителя максимум светопоглощения наблюдается при 605 нм, а в случае бромидной системы—при 595 нм. При изменении кислотности водной фазы максимум в обоих случаях не смещается.

* Оптическая плотность экстрактов «холостых» растворов незначительна: 0,010—0,017.

При выяснении оптимальных условий экстракции была изучена зависимость величины оптической плотности экстрактов от кислотности водной фазы, концентрации соли соответствующего галогенида, концентрации красителя, продолжительности и числа экстракций.

Оказалось, что для полного извлечения соединения хлоридного анионного комплекса ртути(II) с КФ необходима двукратная экстракция, каждая 3-минутной продолжительности. Бромидное тройное соединение ртути(II) практически количественно извлекается однократной экстракцией за 2 минуты.

Максимальное и постоянное значение оптической плотности экстрактов соединения хлоридного анионного комплекса ртути с КФ наблюдается при рН 1,3—1,58, для соответствующего соединения с бромидным—при рН 1,10—1,14.

Наряду с этим была изучена зависимость оптической плотности от концентрации NaCl или KBr, которые вводили в систему для стабилизации концентрации иона галогенида. Оптимальная концентрация NaCl — $4 \cdot 10^{-2}$ М, KBr — $1 \cdot 10^{-2}$ М.

При изучении влияния избытка реагента на экстрагируемость ртути(II) было установлено, что для достижения максимальной оптической плотности, т. е. для количественного извлечения ацидокомплекса ртути(II) в виде окрашенного соединения в органическую фазу, необходимо обеспечить $2,63 \cdot 10^{-4}$ М концентрацию КФ в случае хлоридной системы и $1,75 \cdot 10^{-4}$ М, в случае бромидной системы.

Значение оптической плотности экстрактов соединений зависит от порядка сливания растворов. К раствору ртути(II) приливали необходимое количество соответствующей кислоты (рН 1,5 или 1,14), 1,5 мл 0,2 н раствора NaCl или 1 мл 0,1 н раствора KBr и 2,5 мл 0,1%-ного раствора КФ к раствору хлоридного и 2,0 мл к раствору бромидного ацидокомплекса ртути (II). Образовавшееся соединение из хлоридсодержащей водной фазы экстрагировали 2 раза по 3 минуты 5 мл бензола. Соответствующее соединение из бромидсодержащей водной фазы извлекалось однократной экстракцией 10 мл смеси диэтиловый эфир—бензол в течение 2 минут.

Оптическая плотность полученных экстрактов измерялась через 15—20 минут после разделения фаз.

Подчиняемость основному закону фотометрии наблюдается в интервале концентраций: 0,19—4,68 мкг Hg/мл раствора в случае хлоридной системы и 0,19—1,85 мкг Hg/мл раствора в случае бромидного анионного комплекса ртути(II).

Среднее значение кажущегося коэффициента мольного погашения экстрактов исследуемых окрашенных соединений было рассчитано на основании данных калибровочных графиков, снятых в оптимальных условиях при эффективной длине волны. Для хлоридной системы $\bar{\epsilon}_{605} = 8,2 \cdot 10^4$, для бромидной $\bar{\epsilon}_{595} = 10^5$.

Мольное отношение компонентов в образующихся соединениях ртути(II) с КФ было установлено тремя независимыми методами.

Из изомольных диаграмм «состав—оптическая плотность» (рис. 3) следует, что экстремальной точке соответствует отношение стехиометрических коэффициентов реагирующих компонентов 1:1. Из рисунка 1, иллюстрирующего метод прямой линии [4], следует, что для обеих систем в семействе кривых прямая линия получается при $n=1$. Наконец, тангенс угла наклона прямой, полученной методом сдвига равновесия, близок к единице (рис. 5).

Рис. 3. Изомольная диаграмма 'состав—оптическая плотность' систем: 1 — КФ—хлоридный анионный комплекс ртути(II) (I— $0,6982 \cdot 10^{-4}$ М; II— $0,4655 \cdot 10^{-4}$ М; III— $0,3724 \cdot 10^{-4}$ М); 2 — КФ—бромидный анионный комплекс ртути(II): (1— $0,6982 \cdot 10^{-4}$ М; 2— $0,4655 \cdot 10^{-4}$ М; 3— $0,3724 \cdot 10^{-4}$ М).

Таким образом, все полученные данные однозначно подтверждают, что отношение катиона красителя к галоидному аниону ртути(II) равно 1:1.

Известно, что ртуть(II) может существовать в растворе в зависимости от концентрации галогенид-иона в нескольких формах, которые можно описать реакциями:

Рис. 4. Определение мольного отношения компонентов в соединениях: 1—хлоридного анионного комплекса ртути(II); 2—бромидного анионного комплекса ртути(II) с КФ, методом прямой линии.

Если принять во внимание, что при указанной выше оптимальной кислотности реакционной формой КФ является положительно однозарядный его катион и что, согласно теории экстракции [5], лучше всего экстрагируются соединения, образованные однозарядными компонентами, то, очевидно, более реакционноспособным будет анионный комплекс $\text{HgI}(\text{Ia})_2^-$, чем и обуславливается вышеуказанное отношение компонентов.

Рис. 5. Определение мольного отношения компонентов в соединениях: 1 — хлоридного анионного комплекса ртути (II); 2 — бромидного анионного комплекса ртути (II) с КФ, методом сдвига равновесия.

В условиях образования исследуемых галогенидных ацидокомплексов ртути(II) с КФ изучено влияние некоторых построенных ионов

Таблица 1

Влияние сопутствующих и посторонних элементов на избирательность экстракции ассоциатов галогенидных комплексных анионов ртути (II) с красителем КФ

Ион	$K = \frac{[\text{ион}]^*}{[\text{HgCl}_3^-]^{**}}$	$K = \frac{[\text{ион}]^*}{[\text{HgBr}_3^-]^{***}}$	Ион	$K = \frac{[\text{ион}]^*}{[\text{HgCl}_3^-]^{**}}$	$K = \frac{[\text{ион}]^*}{[\text{HgBr}_3^-]^{***}}$
Co	23900	10400	Mn	1490	480
Ca	11900	2000	Cu	1190	360
Zn	11900	4800	Pb	184	46
Ni	11900	3200	Cl^-	—	10400
Al	8950	4000	PO_4^{3-}	20900	3600
Fe(III)	4770	1800	SO_4^{2-}	5970	3200
Mg	2390	800	NO_3^-	4700	9600
Cd	2390	—			

* [ион] — концентрация постороннего иона, которая еще не мешает определению.

** $[\text{HgCl}_3^-] = 8,38 \cdot 10^{-7}$ М; *** $[\text{HgBr}_3^-] = 2,51 \cdot 10^{-6}$ М.

Мешают золото, таллий, сурьма и кадмий в случае бромидной системы.

Из вышеприведенного следует, что чувствительность экстракционно-фотометрического определения ртути(II) КФ в бромидной среде выше таковой для хлоридной. Последняя, уступая бромидной системе в чувствительности, превосходит ее шириной интервала подчиняемости основному закону фотометрии, а также избирательностью (в особенности по отношению к ионам кадмия).

Оба варианта характеризуются узким интервалом оптимальной кислотности, но заметно более чувствительны по сравнению с ранее описанным методом определения ртути(II) малахитовым зеленым [1, 2].

На основании полученных результатов разработаны методики экстракционно-фотометрического определения микрограммовых количества ртути (II).

**ՀԻՄՆԱՅԻՆ ՆԵՐԿԱՆՑՈՒԹԻՒ ԲՅՈՒՐԻՂԱԿԱՆ ՄԱՆՈՒՇԱԿԱԳՈՒՅՆԻ ՀԵՏ
ՍՆԴԻԿԻ(II) ՀԱՆՈԳՆԱՅԻՆ ԿՈՄՊԼԵՔՍԱՅԻՆ ԱՆԻՈՆՆԵՐԻ ԱՍՈՑԻԱՏՆԵՐԻ
ԷՔՍՏՐԱԿՑԻԱՆ**

Վ. Մ. ԹԱՌԱՅԱՆ, Ե. Ն. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ և Ս. Պ. ԼԵԲԵԴԵՎԱ

Ա մ փ ո փ ու լ մ

Ուսումնասիրված է տրիֆենիլմեթանային շարքի ներկանյութ՝ բյուրեղական մանուշակագույնի հետ սնդիկի (II) քլորիդային և բրոմիդային անիոնային կոմպլեքսների փոխազդումը:

Գտնված են էքստրագենտները, հաստատված է ջրային ֆազի օպտիմալ թթվությունը: Միացության էքստրակտների լուսակլանման մաքսիմումները սնդիկի (II) քլորիդային անիոնային կոմպլեքսի դեպքում գտնվում է 605 նմ, իսկ բրոմիդայինի դեպքում՝ 595 նմ ալիքի երկարության մարզում: Միացության էքստրակտների լուսակլանման թվացող մոլային գործակցի արժեքներն են՝ սնդիկի (II) քլորիդային անիոնային կոմպլեքսի համար $\epsilon = 82000$, բրոմիդայինի համար $\epsilon = 100000$: Սնդիկի (II) քլորիդային և բրոմիդային անիոնային կոմպլեքսները բյուրեղական մանուշակագույնի կատիոնի հետ փոխազդում են 1:1 մոլային հարաբերությամբ: Հետազոտված է ուղեկցող տարրերի ազդեցությունը:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. М. П. Ананьевская, Тр. совещ. раб. вузов и зав. лаб., Ростовский ун-т, 1959, стр. 303.
2. М. П. Ананьевская, Тр. Новочеркасского политехн. ин-та, 143, 3 (1963).
3. E. L. Kothny, Analyst, 94, № 1116, 198 (1969).
4. E. Astus, Z. analyt. Chem., 178, 104 (1960).
5. В. И. Кузнецов, «Химические основы экстракционно-фотометрических методов анализа», Госгеолтехиздат, Москва, 1963.