ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ
 ПРОСТЫХ АМИНОЭФИРОВ

V. ДИАЛКИЛАМИНОАЛКИЛОВЫЕ ЭФИРЫ БЕНЗГИДРОЛА И *o*-, *m*- И
p-МЕТИЛБЕНЗГИДРОЛОВ И ИХ НЕЙРОФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ
 ДЕЙСТВИЕ

А. А. ГАМБУРЯН, Н. А. БАБИЯН, Н. М. МОРОЗОВА, Н. Е. АКОПЯН,
 К. М. ЧАУШЯН и О. Л. МНДЖОЯН

Институт тонкой органической химии им. А. Л. Мнджояна
 АН Армянской ССР (Ереван)

Поступило 16 VII 1970

Получены и испытаны на противосудорожную и антигистаминную активность гидрохлориды β -, γ - и δ -диалкиламиноалкиловых эфиров бензгидрола и *o*-, *m*- и *p*-метилбензгидролов.

Табл. 5, библиограф. ссылок 9.

В продолжение ранее проведенных исследований [1] нами перегруппировкой четвертичных солей аминок спиртов и бензгидрилхлоридов получены аминоэфиры следующего общего строения:

$R = H, o-, m-, p-CH_3; R' = CH_3, C_2H_5.$

$C_nH_{2n} = (CH_2)_3, (CH_2)_4, (CH_2)_5, CH(CH_3)CH_2,$
 $\quad \quad \quad |$
 $\quad \quad \quad CH_3$

$CH(CH_3)CH(CH_3), CH_2-C(CH_3)_2-CH_3$

(табл. 2, 3, 4).

Указанные аминоэтиловые эфиры и аминоэфиры с разветвленной аминоалканольной цепью получены нагреванием в абсолютном толуоле эквимолекулярных количеств аминок спирта и бензгидрилхлорида.

В выбранных условиях реакции выходы этих аминоэфиров выше у соответствующих *n*-метилзамещенных производных.

Установлено также, что гидрохлориды аминоэфиров с разветвленной цепью аминок спирта при нагревании их водных растворов гидролизуются значительно легче.

Диметил- и диэтиламинопропиловые и -бутиловые аминоэфиры получены нагреванием при 160—165° γ -оксипропил- и δ -оксибутилбензгидрилдиалкиламмонийхлоридов, полученных из аминок спиртов и бензгидрилхлоридов при комнатной температуре в абсолютном эфире.

Четвертичные соли диметиламинопропанолов и -бутанолов выделены в кристаллическом виде (табл. 1). Четвертичные же соли диэтиламин спиртов гигроскопичны. Исходный бензгидрол и *o*- и *m*-метилзамещенные его получены реакцией Гриньяра. *n*-Метилбензгидрол синтезирован через бензофенон [2]. Бензгидрилхлориды получены в абсолютном бензоле действием хлористого тионила на бензгидролы [1].

Диметиламинопропанол синтезирован с 75% выходом, алкилированием γ -аминопропанола [3]. Диэтиламинопропанол получен из β -хлорпропионовой кислоты [4], а γ -диалкиламинобутанола — из хлорангидрида β -карбметоксипропионовой кислоты [5] с выходом 70—76%. Исходные и конечные продукты хроматографировались на пластинке силикагель—гипс в подвижных фазах для аминок спиртов [6], аминоэфиров и четвертичных солей— $n\text{-C}_4\text{H}_9\text{OH}-\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}-\text{CH}_3\text{COOH}-\text{H}_2\text{O}$ (8 : 2 : 1 : 3), для бензгидрилхлоридов— $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}-\text{H}_2\text{O}-\text{NH}_3$ (8 : 15 : 5). Проявитель — пары йода.

В ряду исследованных четвертичных солей диметиламиноалканолов перегруппировка протекает с большими выходами у *n*-метилзаме-

ценных производных (72—73%). Незамещенные и *о*- и *м*-метилзамещенные перегруппировываются с выходами 56—71%. γ -Оксипропил- и *S*-оксибутилбензгидрилдиэтиламмонийхлориды перегруппировываются хуже. Выходы продуктов перегруппировки 50—59% (табл. 3, 4).

Изменение числа метиленовых групп в аминоканале не сказывается резко на реакции перегруппировки.

Аминоэфиры действием эфирного раствора хлористого водорода в абсолютном эфире переводились в гидрохлориды для исследования их биологической активности.

Противосудорожное действие гидрохлоридов синтезированных аминокэфиров изучалось на белых мышах. Судороги вызывались химическими веществами (коразолом, никотином, ареколином) и электрическим током. Испытуемые препараты вводились внутривентриально за 15 минут до введения судорожных средств в виде гидрохлоридов в дозе 50 мг/кг. Показателем влияния препаратов на центральные Н- и М-холинореактивные системы являлась способность уменьшать судорожное действие никотина и ареколина у белых мышей.

Результаты опытов показали, что производные γ -диалкиламинопропиловых эфиров бензгидролов, независимо от положения метильных радикалов в бензольном кольце, в сравнении с мебедролом, больше снижают интенсивность и продолжительность тремора и гиперкинеза, вызванного ареколином. У δ -диалкиламинобутиловых эфиров резко понижается активность в отношении ареколиновых судорог. Все изученные соединения независимо от структуры не оказывали влияния на судороги, вызванные никотином и коразолом. Однако в отношении судорог, вызванных электрическим током, все соединения снимали фазу тонической экстензии.

Токсичность препаратов изучалась на опытах с белыми мышами. Препараты вводились внутривентриально. Максимально переносимая доза большинства соединений 50 мг/кг веса. В дозе 100 мг/кг изученные соединения вызывали сильное возбуждение, а затем гибель части животных (табл. 5).

Таким образом, изменение структуры в аминокислотной части молекулы, т. е. переход от β -диалкиламиноэтиловых эфиров [7] к пропиловым, приводит к повышению противосудорожной активности, снижающейся у соответствующих диалкиламинобутиловых эфиров. Изменений при перемещении метильного радикала из *орто*- в *мета*- и *пара*-положения не удалось проследить.

В опытах на наркотизированных кошках и изолированной кишке морской свинки изучалось также антигистаминное действие отдельных препаратов. В результате опытов установлено, что изученные соединения проявляли некоторую активность только в опытах на изолированной кишке.

В опытах на кровяном давлении кошки эти соединения не проявили антигистаминной активности, в то время как мебедрол проявляет выраженную антигистаминную активность.

Данные фармакологических исследований гидрохлоридов аминокэфиров с разветвленной аминоканальной цепью будут опубликованы отдельно.

Экспериментальная часть

— β - и γ -Диалкиламиноалкиловые эфиры бензгидрола и метилзамещенных бензгидролов. Смесь 0,05 моля бензгидрил- или замещенного бензгидрилхлорида, 0,05 моля β - или γ -диалкиламиноалканоло и 50 мл абсолютного толуола кипятилась в течение 6 часов. После отгонки то-

Таблица 2

R	C _n H _{2n}	R'	Выход, %	Т. кип., °C/мм.ст.	Молекулярная формула	d ₄ ²⁰	n _D ²⁰	Анализ, %						Т. пл. солей, °C	
								C		H		N		гидрохлорид	йодметилат
								найдено	вычислено	найдено	вычислено	найдено	вычислено		
o-CH ₃	CH ₂ -CH ₂	CH ₃	45,3	176/3	C ₁₈ H ₂₃ NO	1,0074	1,5452	79,05	80,28	8,21	8,55	4,96	5,20	154*	—
m-CH ₃	CH ₂ -CH ₂	CH ₃	46,5	153-155/1	C ₁₈ H ₂₃ NO	0,9993	1,5429	80,35	80,28	8,67	8,55	4,90	5,20	133	—
p-CH ₃	CH ₂ -CH ₂	CH ₃	61,2	155-156/2	C ₁₈ H ₂₃ NO	0,9987	1,5420	80,48	80,28	8,44	8,55	4,96	5,20	149**	—
H	CH-CH ₂ -CH ₂ CH ₃	CH ₃	54,2	148/0,5	C ₁₉ H ₂₅ NO	0,9805	1,5261	80,46	80,56	9,11	8,83	5,08	4,94	—	—
H	CH(CH ₃)-CH ₂ -CH ₂	C ₂ H ₅	55,4	161-162/0,5	C ₂₁ H ₂₇ NO	0,9840	1,5331	80,97	80,98	9,02	9,38	4,68	4,49	—	155-157
H	CH(CH ₃)-CH(CH ₃)-CH ₂	CH ₃	50,8	142-143/0,5	C ₂₀ H ₂₇ NO	0,9815	1,527	80,49	80,76	9,31	9,48	5,00	4,70	—	155-156
H	CH(CH ₃)-CH(CH ₃)-CH ₂	C ₂ H ₅	51,2	162-163/0,5	C ₂₂ H ₃₁ NO	0,9897	1,5272	81,45	81,49	9,78	9,60	4,60	4,30	—	—
H	CH ₂ -C(CH ₃) ₂ -CH ₂	CH ₃	58,5	165-166/1	C ₂₀ H ₂₇ NO	0,9752	1,523	80,59	80,76	9,31	9,48	4,58	4,70	180-181	—
H	CH ₂ -C(CH ₃) ₂ -CH ₂	C ₂ H ₅	60,2	174-175/1	C ₂₂ H ₃₁ NO	0,9756	1,5229	81,25	81,49	9,28	9,60	4,42	4,30	—	—
p-CH ₃	CH(CH ₃)-CH(CH ₃)-CH ₂	CH ₃	55,3	161-162/0,5	C ₂₁ H ₂₉ NO	0,9781	1,5285	81,24	80,98	9,09	9,38	4,50	4,49	—	166-167
p-CH ₃	CH(CH ₃)-CH(CH ₃)-CH ₂	C ₂ H ₅	56,0	181-182/0,5	C ₂₃ H ₃₃ NO	0,9657	1,5258	81,25	81,05	9,67	9,79	4,10	4,12	—	—
p-CH ₃	CH ₂ -C(CH ₃) ₂ -CH ₂	CH ₃	65,2	170-172/1	C ₂₁ H ₂₉ NO	0,9738	1,5308	81,30	80,98	9,24	9,38	4,32	4,49	—	135-137

* 152-154° [8];

** 150-152° [9].

R	n	Выход, %	Т. кип., °C/мм	Молекулярная формула	d_4^{20}	n_D^{20}
H	3	60	169—170	$C_{18}H_{23}NO$	0,9989	1,5305
H	4	71	188—189	$C_{19}H_{25}NO$	0,9892	1,5368
<i>o</i> -CH ₃	3	60	185—186	$C_{19}H_{23}NO$	0,9999	1,5438
<i>o</i> -CH ₃	4	56	195—197	$C_{20}H_{27}NO$	0,9996	1,5410
<i>m</i> -CH ₃	3	70	181—182	$C_{19}H_{25}NO$	1,0035	1,5462
<i>m</i> -CH ₃	4	61,5	159—160	$C_{20}H_{27}NO$	1,0105	1,5379
<i>p</i> -CH ₃	3	73,4	189—191	$C_{19}H_{25}NO$	0,9962	1,5382
<i>p</i> -CH ₃	4	71,8	178—179	$C_{20}H_{27}NO$	0,9868	1,5338

Таблица 3

R _f	А н а л и з, %						Гидрохлорид		
	С		Н		N		Т. пл., °С	% Cl	
	найдено	вычислено	найдено	вычислено	найденс	вычислено		найдено	вычислено
0,50	80,20	80,25	9,40	8,60	5,43	5,19	91—92	11,33	11,59
0,48	80,05	80,52	9,00	8,89	4,62	4,94	101—103	10,73	11,08
0,60	81,00	80,52	9,13	8,89	5,36	4,94	131—132	10,91	11,08
0,47	81,08	80,82	10,10	9,14	5,32	4,99	152—153	10,23	10,61
0,58	80,39	80,52	8,69	8,89	5,21	4,94	63—65	11,43	11,08
0,59	80,98	80,82	9,28	9,14	5,22	4,99	95—96	10,14	10,61
0,61	81,06	80,52	9,01	8,89	4,99	4,94	125—126	11,49	11,08
0,52	81,66	80,82	9,33	9,14	5,29	4,99	98—99	9,99	10,61

R	n	Выход, %	T: кип., °C/мм	Молекулярная формула	d ₄ ²⁰	n _D ²⁰
H	3	57	161—162/1	C ₂₀ H ₂₇ NO	0,9998	1,5400
H	4	59	158—159/1	C ₂₁ H ₂₉ NO	1,0132	1,5508
o-CH ₃	3	51	176—178/1	C ₂₁ H ₂₉ NO	0,9978	1,5358
o-CH ₃	4	53	202—204/1	C ₂₂ H ₃₁ NO	1,0018	1,5448
m-CH ₃	3	50	196—197/2	C ₂₁ H ₂₉ NO	0,9988	1,5355
m-CH ₃	4	56,7	173—174/1	C ₂₁ H ₂₉ NO	1,0118	1,5498
p-CH ₃	3	51	203—205/2	C ₂₁ H ₂₉ NO	0,9969	1,5388
p-CH ₃	4	50	190—191/1	C ₂₂ H ₃₁ NO	1,0065	1,5485

* Гигроскопичны.

Таблица 4

R _f	А н а л и з, %						Гидрохлорид		
	C		H		N		Т. пл., °C	% Cl	
	найде- но	вычис- лено	найде- но	вычис- лено	найде- но	вычис- лено		найде- но	вычис- лено
	80,25	80,82	9,04	9,14	5,02	4,99	71—72	10,59	10,61
0,25	81,90	80,85	9,31	9,14	5,51	4,98	87—89	9,59	10,61
0,61	81,90	80,25	9,01	9,20	4,69	4,74	100—100	11,40	11,03
0,28	80,33	80,25	9,52	9,14	5,75	4,99	82—84	10,14	10,61
0,41	81,09	80,25	9,09	9,28	5,31	4,04	97—92	11,43	11,08
0,41	81,09	80,25	10,10	9,14	5,25	4,98	103—120	10,51	10,61
0,51	80,65	80,82	9,04	9,14	5,02	4,99	71—72	10,59	10,61
0,58	80,88	80,98	9,21	9,38	5,31	4,49	88—89	10,41	10,19
0,61	80,71	80,98	9,29	9,38	4,31	4,49	*	10,39	10,19
0,60	81,69	81,18	10,04	9,60	4,30	4,33	119—120	9,96	9,79
0,56	80,68	80,98	9,49	9,38	4,26	4,49	—	9,86	10,19
0,53	81,00	81,18	8,96	9,60	3,91	4,33	—	9,85	9,79
0,59	80,91	80,98	9,50	9,38	5,03	4,49	—	10,03	10,19
0,62	81,67	81,18	9,91	9,60	4,37	4,33	92—93	9,39	9,79

Действием эфирного раствора хлористого водорода получены гидрохлориды аминоэфиров, температуры плавления которых приведены в таблицах 2, 3, 4.

Таблица 5

R	n	R'	Электрошок	Коразол	Никотин	Ареколин
H	3	CH ₃	0	+++ (г)	+++ (г)	0
H	4	CH ₃	0	+++ (г)	+++ (г)	+++
H	3	C ₂ H ₅	0	+++ (г)	+++ (г)	3/2 ⁺⁺
H	4	C ₂ H ₅	0	+++ (г)	+++ (г)	+++
o-CH ₃	3	CH ₃	0	+++ (г)	+++ (г)	0
o-CH ₃	4	CH ₃	0	+++ (г)	+++ (г)	+++
o-CH ₃	3	C ₂ H ₅	0	+++	+++ (г)	0
o-CH ₃	4	C ₂ H ₅	3 ^{+/20}	+++ (г)	+++ (г)	+++
m-CH ₃	3	CH ₃	0	+++ (г)	+++ (г)	30/2
m-CH ₃	4	CH ₃	2 ^{+/30}	+++ (г)	+++ (г)	2 ^{++/20}
m-CH ₃	3	C ₂ H ₅	2 ^{+/30}	+++ (г)	+++ (г)	+++
m-CH ₃	4	C ₂ H ₅	3 ^{+/20}	+++ (г)	+++ (г)	+++
CH ₃	3	CH ₃	0	+++ (г)	+++ (г)	+++
CH ₃	4	CH ₃	0	+++ (г)	+++ (г)	+++
CH ₃	3	C ₂ H ₅	0	+++ (г)	+++ (г)	+++
CH ₃	4	C ₂ H ₅	0	+++ (г)	+++ (г)	+++
Мебедрол			0	+++	+++	30/2 ⁺⁺

(г) — гибель

0 — отсутствие судорог

+++ — сильные судороги в 3 балла

++ — средние судороги в 2 балла

+ — слабые судороги в 1 балл

3/2 — опыты на пяти мышах, дробное число — показатель эффекта.

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՄԻՆԱԵԹԵՐՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ

VI. ԲԵՆԶՆԻՊՐՈՒԻ ԵՎ օ-, մ-, պ-ՄԵԹԻԼԲԵՆԶՆԻՊՐՈՒՆԵՐԻ ԴԻԱԿԻԼԱՄԻՆԱԳՐՈՊԻ
ԵՎ Ց-ԴԻԱԿԻԼԱՄԻՆԱՐՈՒՑԻՎ ԵԹԵՐՆԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՆՅՐՈՑԱՐՄԱԿՈՒՐԳԻԱԿԱՆ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հ. Հ. ԳԱՄԲՐՅԱՆ, Ն. Ա. ԲԱԲԻՅԱՆ, Ն. Մ. ՄՈՐՈԶՈՎԱ,
Ն. Ե. ՉԱԿՈՐՅԱՆ, Ք. Ա. ԶԱՌԵՅԱՆ և Հ. Լ. ՄՆԶՈՅԱՆ

Ա մ փ ո փ ո լ մ

Հակացնցումային և հակահաստամինային ակտիվության ուսումնասիրման նպատակով ստացվել և փորձարկվել են ք բենզհիդրոլի և օ-, մ և պ-մեթիլբենզհիդրոլների ց-, ՛- և ծ-դիալկիլամինալիլիլթերների հիդրոքլորիդները:

Աշխատանքի նպատակն է եղել՝ պարզել ամինալկանոլային շղթայի նըշանակութունն այս տիպի պարզ եթերների ֆարմակոլոգիական հատկութունների փոփոխության հարցում:

Նշված ամինաեթերներն ստացվել են համապատասխան բենզհիդրոլքլորիդների և ամինասպիրտների շոքոտրոդային աղերի վերախմբավորման ճանապարհով:

Դիալկիլամինաեթիլթերները և ճյուղավորված ամինալկանոլային շղթայով ամինաեթերներն ստացվել են անջուր տոլուոլի մեջ բենզհիդրոլքլորիդների և ամինասպիրտի էֆլիմոլիկոլային քանակների տաքացման միջոցով: Նրկարագրված դիալկիլամինապրոպիլ- և դիալկիլամինաբուտիլթերներն ստացվել են համապատասխան ՛-օքսիպրոպիլ- և ծ-օքսիբուտիլբենզհիդրոլդիալկիլամոնիում քլորիդների վերախմբավորմամբ (տաքացնելիս):

Հաստատված է, որ դիալկիլամինաեթիլթերներից բուտիլթերներին անցնելիս հակահաստամինային ակտիվութունն ընկնում է, դիալկիլամինապրոպիլ եթերների հակացնցումային ակտիվութունը բարձրանում է, իսկ բուտիլթերների ակտիվութունը համեմատած դիալկիլամինաեթիլ եթերների հետ վելի ցածր է:

Л И Т Е Р А Т У Р А

- 1 Օ. Լ. Мнджоян, Н. М. Морозова, Изв. АН Арм. ССР, 15, 553 (1962); 16, 272 (1963).
- 2 Н. D. Hartough, A. J. Kosak, Пат. США, 2,475,564 (1949) [С. А., 43, 796bg (1949)].
- 3 Т. В. Гортинская, Н. В. Савитская, В. Г. Самоловова, Ю. С. Цизин, М. Н. Щукина, Ж. мед. пром. СССР, 11, 4, 23 (1957) [С. А. 52, 7146 (1958)].
- 4 Арпенал и опыт его клинического применения, Изд. АН Арм. ССР, Ереван, 1964, стр. 51.
- 5 Дж. Кейзен, У. Аллен, К. Вильсон, Слант. орг. препаратов, том III, Изд. ИЛ, Москва, 1949, стр. 459.
- 6 Н. К. Litnerman, A. Casmatos, J. Chromatogr., 7, 77 (1962) [С. А., 57, 5285. (1962)].
- 7 Г. А. Медникан, Биол. ж. Армении, 20, 53 (1967).
- 8 N. V. Koninklijke, Брит. пат., 743495 (1856), [С. А., 50, 16864d (1956)].
- 9 N. V. Koninklijke, Брит. пат. 683483 (1952) [С. А., 48, 728b (1954)].