ЗАМЕЩЕННЫЕ *цис*-(1H)-2,3,4,5,5a,6,7,11b-ОКТАГИДРО-
НАФТ(1,2-с)АЗЕПИНЫ

А. П. БОЯХЧЯН, Л. Л. ОГАНЕСЯН и Г. Т. ТАТЕВОСЯН

Институт тонкой органической химии им. А. Л. Миджояна
АН Армянской ССР (Ереван)

Поступило 20 V 1971

С целью получения новых транквилизаторов синтезированы *цис*-(1H)-2,3,4,5,5a,6,7,11b-октагидронафт(1,2-с)азепин и некоторые его производные. Заключение о строении конечных и промежуточных продуктов сделаны на основании спектров ПМР.

Табл. 1, библиограф. ссылки 9.

Производные изомерных дибензазепинов обладают ценными фармакологическими свойствами. Некоторые соединения этого ряда—ими-зин [1], сурмонтил [2], тегретол [3]—проявляют психофармакологическую активность.

Носителями аналогичной фармакологической активности могут оказаться и трициклические производные азепина иного строения, в частности, соединения, в которых азепиновое кольцо конденсировано с нафталиновым ядром. В литературе имеются сведения о получении изомерных нафтазепинов [4—6], однако о фармакологических свойствах этих соединений нет никаких указаний.

Нами синтезируются трициклические производные азепина с целью последующего изучения их фармакологических свойств; в настоящей статье описываются N-замещенные *цис*-(1H)-2,3,4,5,5a,6,7,11b-октагидронафт(1,2-с)азепины (I). Исходным веществом в синтезе соединений I служил описанный ранее [7] *цис*-3-кето-1,2,3,4,4a,9,10,10a-октагидрофенантрен (II). Оксим этого кетона (III), полученный в виде одного из двух возможных изомеров, действием полифосфорной кислоты подвергнут бекмановской перегруппировке в нафтазепинон IV, также оказавшийся индивидуальным веществом.

Кислотным гидролизом последнего получена аминокислота, строение которой должно быть выражено формулой V (см. ниже).

Лактам IV метилирован диметилсульфатом [8], а также алкилированная хлористым бензилом и β-диметиламиноэтилхлоридом [9]. Восстановлением алкилированных лактамов VI алюмогидридом лития получены N-замещенные октагидронафтазепины I. Этильное производное I ($R=C_2H_5$) получено ацелированием лактама IV и последующим восстановлением ацетильного производного VI ($R=COCH_3$).

При тонкослойном хроматографировании оснований I, во всех случаях наблюдалось наличие небольшого количества примеси, возможно образовавшейся в результате изомеризации по месту сочленения колец В и С.

Строение оснований I и промежуточных соединений IV, V и VI установлено сравнением ПМР спектров лактама IV и его N-ацетильного производного VI ($R = \text{COCH}_3$)*

Сигнал протонов метиленовой группы С-1 в спектре ацетильного производного смещен в слабое поле на 0,22 м. д., что говорит в пользу структуры I, а не другой возможной структуры с обратным расположением лактамной группировки. Поскольку при бекмановской перегруппировке обычно происходит *транс*-обмен, для оксима 3-кето-1,2,3,4,4а-9,10,10а-*цис*-октагидрофенантрена следует принять пространственно более благоприятное анти-строение III.

Основания I охарактеризованы в виде гидрохлоридов, о результатах фармакологического изучения которых будет сообщено отдельно.

Экспериментальная часть

Оксим *цис*-3-кето-1,2,3,4,4а,9,10,10а-октагидрофенантрена (III).

Смесь раствора 5 г (0,025 моля) кетона II в 50 мл этанола и раствора 2,6 г (0,037 моля) солянокислого гидроксиламина и 3,03 г (0,037 моля) уксуснокислого натрия в 25 мл воды кипятилась 5 часов. Спирт частично отогнан, прибавлено 100 мл воды, выделившееся масло экстрагировано эфиром, эфирный раствор промыт водой и высушен

* Авторы выражают благодарность проф. Р. Г. Костяновскому за ПМР спектральное исследование указанных соединений.

серноокислым натрием. Масло, оставшееся после отгонки растворителя, закристаллизовалось. Перекристаллизацией из водного этанола получено 5,1 г (94,8) оксима, плавящегося при 158°. При тонкостойном хроматографировании на окиси алюминия получено одно пятно в различных системах растворителей; R_f 0,73 (гексан — ацетон, 3 : 1), R_f 0,86 (хлороформ — этанол, 9 : 1), R_f 0,66 (гептан — ацетон, 4 : 1). ИК спектр: ν 3230—3300 $см^{-1}$ (ОН). Найдено %: С 78,53; Н 8,01; N 6,80. $C_{14}H_{17}NO$. Вычислено %: С 78,14; Н 7,90; N 6,51

цис-3-Оксо-(1H)-2,3,4,5,5a,6,7,11b-октагидронафт(1,2-с)азепин (IV). Смесь 5 г (0,023 моля) оксима III и 150 г полифосфорной кислоты нагревалась 10—15 минут при 140°. Слегка остывшая масса слита на лед. Образовавшиеся при растирании кристаллы отфильтрованы, промыты на фильтре водой, разбавленным раствором углекислого натрия, вновь водой и высушены. Кипячением с эфиром лактам очищен от остатков непрореагировавшего оксима. Получено 4,1 г (82%) лактама IV с т. пл. 216—217° (из метанола). R_f 0,36 (гексан — ацетон, 3 : 1), R_f 0,12 (гептан — ацетон, 4 : 1), R_f 0,68 (хлороформ — спирт, 9 : 1). ИК спектр: ν 1615 (бенз. ядро), 1665 (СО амидн.), 3200 $см^{-1}$ (NH амидн.). ПМР спектр: (CHCl₃) δ 3,08 м. д. (дублет протонов CH₂ группы при С-1, J=15 гц). Найдено %: С 78,10; Н 8,04; N 6,45. $C_{14}H_{17}NO$. Вычислено %: С 78,14; Н 7,90; N 6,51.

β -(1-Аминометил-1,2,3,4-тетрагидронафт(1,2-с)пропионовая кислота (V). К раствору 1,5 г (0,0069 моля) лактама IV в 50 мл этанола добавлено 10 мл концентрированной соляной кислоты. Смесь кипятилась 2 часа. Спирт отогнан, остаток выпарен досуха, несколько раз обработан абсолютным спиртом. После отгонки большей части растворителя гидрохлорид аминокислоты V осажден добавлением абсолютного эфира. Получено 0,8 г гидрохлорида с т. пл. 185°. Найдено %: С 62,72; Н 7,05; N 4,91; Cl 13,51. $C_{14}H_{20}NO_2Cl$. Вычислено %: С 62,33; Н 7,42; N 5,19; Cl 13,17.

цис-2-Метил-3-оксо-(1H)-2,3,4,5,5a,6,7,11b-октагидронафт-(1,2-с)-азепин (VI, R=CH₃). К раствору 4,2 г (0,019 моля) лактама IV в 70 мл сухого бензола добавлен по каплям раствор 3,475 г (0,027 моля) диметилсульфата в 30 мл того же растворителя. Смесь кипятилась 6 часов. После охлаждения прибавлен избыток 50%-ного раствора поташа, бензольный слой отделен, промыт водой и высушен серноокислым натрием. Масло, оставшееся после отгонки бензола, закристаллизовалось при растирании с эфиром. Перекристаллизацией из водного метанола получено 2,3 г (52%) белого кристаллического вещества с т. пл. 179—180°. R_f 0,94 (хлороформ — спирт, 7 : 1) R_f 0,50 (гептан — ацетон — спирт, 20 : 20 : 1). ИК спектр: ν 1660 $см^{-1}$ (СО амидн.). Найдено %: С 78,15; Н 8,27; N 6,05. $C_{15}H_{19}NO$. Вычислено %: С 78,60; Н 8,29; N 6,11.

цис-2-Ацетил-3-оксо-(1H)-2,3,4,5,5a,6,7,11b-октагидронафт-(1,2-с)азепин (VI, R=CH₃CO). Смесь 4 г (0,018 моля) лактама IV с избытком (25 мл) уксусного ангидрида кипятилась 4 часа. После уда-

ления уксусного ангидрида в вакууме остаток в колбе закристаллизовался. Перекристаллизацией из петролейного эфира получено 3 г (64%) белых блестящих кристаллов с т. пл. 129—130°. R_f 0,88 (хлороформ — ацетон, 1:1), R_f 0,62 (петролейный эфир — ацетон, 1:1), R_f 0,56 (гептан — ацетон, 3:1). ИК спектр: ν 1620 (бенз. ядро), 1680 (СО амидн.), 1705 $см^{-1}$ (СО амидн.). ПМР спектр: $(CHCl_3)$ δ 3,3 м. д. (дублет протонов CH_2 группы С-1, $J = 15$ гц). Найдено %: С 75,03; Н 6,88; N 5,38. $C_{16}H_{19}NO_2$. Вычислено %: С 74,70; Н 7,39; N 5,44.

цис-2-Бензил-3-оксо-(1H)-2,3,4,5,5a,6,7,11b-октагидронафт-(1,2-с)-азепин (VI, $R = C_6H_5CH_2$). К алкоголяту натрия, приготовленному из 0,374 г (0,016 г-ат) натрия и 10 мл сухого спирта, прибавлено 3,5 г (0,016 моля) лактама IV и 15 мл сухого толуола. Избыток спирта отогнан и к остатку прибавлен раствор 2,05 г (0,016 моля) хлористого бензила в 10 мл толуола. Реакционная смесь кипятилась 5 часов. После охлаждения к ней прибавлено 100 мл воды и маслянистый слой экстрагирован хлороформом. Масло, полученное после удаления растворителя, закристаллизовалось при смешении с петролейным эфиром. Перекристаллизацией из этанола получено 2 г (40,8%) белого кристаллического вещества с т. пл. 228°. R_f 0,89 (хлороформ — спирт, 9:1), R_f 0,43 (гептан — ацетон — спирт, 20:20:1). ИК спектр: ν 1690 $см^{-1}$ (СО амидн.). Найдено %: С 82,50; Н 7,47; N 4,82. $C_{21}H_{23}NO$. Вычислено %: С 82,62; Н 7,54; N 4,59.

цис-2-(β -Диметиламиноэтил)-3-оксо-(1H)-2,3,4,5,5a,6,7,11b-октагидронафт(1,2-с)азепин [VI, $R = (CH_3)_2NCH_2CH_2$]. Описанным выше способом из 5 г (0,023 моля) лактама IV и 2,47 г (0,023 моля) β -диметиламиноэтилхлорида получен лактам VI [$R = CH_2CH_2N(CH_3)_2$]. Выход составил всего 1,05 г (15,7%) несмотря на то, что продолжительность нагревания была увеличена до 20 часов. Получены белые пластинчатые кристаллы (из этилацетата) с т. пл. 220—221°. R_f 0,635 (хлороформ — этанол, 9:1). ИК спектр: ν 1670 (СО амидн.), 1615 $см^{-1}$ (бенз. ядро). Найдено %: С 76,01; Н 8,98; N 9,23. $C_{18}H_{26}N_2O$. Вычислено %: С 75,52; Н 9,09; N 9,79. Гидрохлорид (из эфира), т. пл. 138—140°. Найдено %: Cl 11,14. $C_{18}H_{26}N_2O \cdot HCl$. Вычислено %: Cl 11,00.

цис-(1H)-2,3,4,5,5a,6,7,11b-Октагидронафт(1,2-с)азепин (I, $R = H$). К раствору 2,28 г (0,06 моля) алюмогидрида лития в 100 мл эфира постепенно прибавлен раствор 6,45 г (0,03 моля) лактама IV в 200 мл сухого диоксана. Смесь кипятилась на водяной бане 18 часов, затем разложена 15 мл воды. Осадок гидроокисей металлов отфильтрован, несколько раз растерт с небольшими порциями эфира. Соединенный экстракт высушен серноокислым натрием. После отгонки растворителей получено 4,3 г (71%) основания, перегнавшегося при 171—173°/3 мм; n_D^{20} 1,5715; d_4^{20} 1,0567; MR_D найдено 62,65, вычислено 62,79. ИК спектр: ν 3300 $см^{-1}$ (NH). Найдено %: С 83,58; Н 9,70; N 6,59; мол. вес (определен масс-спектрометрически) 201. $C_{14}H_{19}N$. Вычислено %: С 83,58; Н 9,45; N 6,96; мол. вес 201. Хроматографирование на окиси алюминия (гептан — ацетон, 3:1) дало два пятна:

Таблица

R	Выход, %	Т. кип., °С/мм	R _f *	А н а л и з, %						Молекулярная формула	Гидрохлорид		
				найденно			вычислено				т. пл., °С	Cl, %	
				С	Н	Н	С	Н	Н			найденно	вычислено
CH ₃	73,0	183—185/4	0,78 (0,63)	83,48	9,81	6,43	83,72	9,76	6,51	C ₁₅ H ₂₁ N	156	14,08	14,11
C ₂ H ₅	67,5	168—171/3	0,73 (0,60)	83,77	10,40	6,14	83,81	10,04	6,11	C ₁₆ H ₂₃ N	195—196	13,56	13,37
C ₆ H ₅ CH ₂	45,0	200—205/1	0,58 (0,42)	86,30	8,27	4,91	86,59	8,59	4,81	C ₂₁ H ₂₅ N	65—66	10,44	10,83
(CH ₃) ₂ NCH ₂ CH ₂ **	93,0	—	—	62,35	8,81	8,01	62,31	8,69	8,11	—	173—174	19,89	20,57

* Окись алюминия, гептан—ацетон; в скобках указаны значения R_f примесей.

** Основание не перегнано, выход и анализы рассчитаны на гидрохлорид.

R_f 0,75 (интенсивное). R_f 0,56 (следы). Гидрохлорид (из эфира), т. пл. 179—180°. Найдено %: Cl 15,27. C₁₄H₁₉N·HCl. Вычислено %: Cl 14,94. Йодметилат (из эфира) т. пл. 198—200°. Найдено %: J 37,73. C₁₄H₁₉N·C₂H₅I. Вычислено %: J 37,02.

цис-2-Алкил-(1H)-2,3,4,5,5а,6,7,11b-октагидронафт(1,2-с)азепины (I). Описанным выше способом, восстановлением N-замещенных лактамов VI алюмогидридом лития (в случае N-ацетильного производного взято 3 моля алюмогидрида лития на 1 моль лактама) получены соответствующие основания, выходы и константы которых приведены в таблице.

**ՏեղԱԱԿԱԿԱՄ ցիս-(1H)-2,3,4,5,5a,6,7,11b-04SU-
շիփրոնԱՅԹ(1,2-с)ԱԶԵՊԻՆՆԵՐ**

Ա. Փ. ԲՈՅԱԿՉՅԱՆ, Լ. Լ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ և Վ. Տ. ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ

Ա մ փ ո փ ու մ

Դիրինյակայինի շարքի միացությունները հետաքրքիր ֆարմակոլոգիական հատկություններ ունեն՝ մասնավորապես ցուցարերում են սեղատիվ ադդեցություն:

Սպասվում է, որ նման ֆարմակոլոգիական հատկություններ կունենան և այլ կառուցվածքով տրիցիկլիկ ազիայինները, որոնցում ազիայինային օղակը կոնդենսված է նաֆթալինի կորիզի հետ:

Ներկա հոդվածում նկարագրված է ցիս-(1H)-2,3,4,5,5a,6,7,11b-օկտա-հիդրոնաֆթ(1,2-с)ազիայինի և նրա ածանցյալների սինթեզը:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. М. Д. Машковский, А. И. Полежаева. Журнал невро. п псих.. 8, 964 (1959).
2. P. Lambert, J. Guyotet, Presse Med., 31, 1425 (1961).
3. M. A. Davls, S. O. Wikthrop, R. A. Thomas, F. Herr, M. Charest, R. Gaudry, J. Med. Chem., 7, 88 (1964).
4. G. Schroeter, Ber., 63B, 1322 (1930).
5. F. Johnson, W. A. Nasutavicus, Пат. США 3,205,221 (1965); (С. А., 64, 2114f (1966))
6. D. H. Jones, J. Chem. Soc., С, 1969, 1642.
7. А. П. Болхчян, Г. Т. Татевосян, Арм. хим. ж., 22, 955 (1969).
8. R. E. Benson, Th. L. Cairus, J. Am. Chem. Soc., 70, 2115 (1948).
9. П. А. Петюник, П. А. Безуглый, ХГС, 1970, 954.