ПРОИЗВОДНЫЕ ПИРИМИДИНА

XXIII. СИНТЕЗ НЕКОТОРЫХ 2,4-ЗАМЕЩЕННЫХ 5-(*п*-АЛКОКСИ-
 ФЕНИЛ)ПИРИМИДИНОВ

М. А. КАЛДРИКЯН, С. А. ХУРШУДЯН и А. А. АРОЯН

Институт тонкой органической химии АН Армянской ССР (Ереван)

Поступило 15 VII 1970

С целью изучения связи структуры с биологическим действием синтезированы 2,4-замещенные 5-(*п*-алкоксифенил)пиримидины—аналоги цитозина и тиоцитозина. Алкилирование α -формил-*п*-алкоксифенилацетонитрилов ортомуравьиным эфиром приводит к α -(*п*-алкоксифенил)- β -этоксинакрilonитрилам, циклизацией которых с тиомочевинной и гидрохлоридом гуанидина синтезированы 2-меркапто-4-амино- и 2,4-диамино-5-(*п*-алкоксифенил)пиримидины. 2-Меркаптопиримидины переведены в 2-окси-4-амино-5-(*п*-алкоксифенил)пиримидины.

Табл. 4, библиографических ссылок 7.

В настоящем сообщении приведены результаты исследований по синтезу 2,4-замещенных 5-(*п*-алкоксифенил)пиримидинов (I)—аналогов природных пиримидиновых метаболитов нуклеинового обмена цитозина и тиоцитозина

а) X=SH, Y=NH₂ б) X=Y=NH₂ в) X=OH, Y=NH₂
 R=CH₃...*изо*-C₄H₉

Известно, что некоторые производные 2,4-диаминопиримидинов, являющиеся ингибиторами клеточного роста и размножения и применяющиеся как антималярийные препараты—сильные антагонисты фолиевой и фоллиновой кислот в различных биологических системах. Кларк и другие показали, что биологическая активность диаминопиримидинов связана с химической природой заместителей [1]. В связи с этим определенный интерес представляет синтез соединений I, где, в отличие от ранее синтезированных пиримидинов [2], в 5-положение вместо *п*-алкоксифенильного радикала введен *п*-алкоксифенильный.

В качестве исходных веществ были применены *п*-алкоксифенилцианиды, нагревание которых с этилформиатом с применением эквивалентного количества этилата натрия по описанному в литературе способу [3], приводит к α -формил-*п*-алкоксифенилацетонитрилам II.

Существование II в енольной форме IIa создает возможность их применения в синтезе пиримидинов.

Попытка синтезировать пиримидины I непосредственным взаимодействием II с тиомочевинной или гидрохлоридом гуанидина оказалась безуспешной. Поэтому II алкилированы в соответствующие α -(*p*-алкоксифенил)- β -этоксинакрилонитрилы III по методу Расселя [4] с 54—76% выходами.

Как видно из литературных данных, при алкилировании аналогичных енолов диазومتаном, алкилгалогенидами, диалкилсульфатом α -замещенные β -этоксинакрилонитрилы получают с низкими выходами [4].

Соединения III представляют собой желтоватые жидкости, перегоняющиеся в вакууме. Следует отметить, что они, несмотря на хорошие данные элементарного анализа, дают экзальтацию молекулярной рефракции, что, по-видимому, является результатом наличия сопряжения двойной (C=C) и тройной (C $\equiv$ N) связей [5].

Осуществить синтез III непосредственным взаимодействием *p*-алкоксифенилцианидов с ортамуравьиным эфиром в присутствии уксусного ангидрида по способу Болемонта [6] нам не удалось.

Введением III в реакцию циклизации с тиомочевинной и гидрохлоридом гуанидина с применением этилата натрия синтезированы Ia, б. Ia,

представляют собой не растворимые в воде и обычных органических растворителях светлые кристаллические вещества с высокой температурой плавления, Iб—желтые кристаллы, не растворимые в воде, частично растворимые в органических растворителях.

Окислением Ia 30%-ной перекисью водорода в щелочной среде получены производные цитозина Ib.

5-(*n*-Пропоксифенил)цитозин синтезирован и другим способом—нагреванием 2-меркаптопиридина с хлоруксусной кислотой и последующим омылением образовавшегося 2-карбоксиметилмеркаптопроизводного соляной кислотой.

Экспериментальная часть

α -Формил-*n*-алкоксифенилацетонитрилы (II). Смесь 0,1 моля *n*-алкоксибензилцианида, 7,4 г (0,1 моля) этилформиата и этилата натрия, приготовленного из 2,3 г (0,1 г-ат) натрия и 80 мл абсолютного спирта, при перемешивании нагревают на водяной бане в течение 5 часов. После охлаждения к смеси приливают 1,5—2 л воды, экстрагируют эфиром. Водный слой подкисляют *in situ* серной кислотой и экстрагируют эфиром. Эфирный слой промывают водой и высушивают над сернокислым натрием. После удаления эфира остаток кристаллизуется. Кристаллы перекристаллизовывают из смеси эфир-петролейный эфир (табл. 1).

Таблица 1

R	Выход, %	Т. пл., °С	Молекулярная формула	А н а л и з, %					
				С		Н		N	
				найде-но	вычис-лено	найде-но	вычис-лено	найде-но	вычис-лено
CH ₃ *	53,0	120—121	C ₁₀ H ₉ NO ₂	68,82	68,55	5,19	5,17	7,76	7,99
C ₂ H ₅	63,4	115—116	C ₁₁ H ₁₁ NO ₂	70,05	69,82	6,12	5,85	7,13	7,40
C ₃ H ₇	61,5	116—117	C ₁₂ H ₁₃ NO ₂	70,62	70,91	6,33	6,44	7,00	6,89
<i>изо</i> -C ₃ H ₇	68,0	92—93	C ₁₂ H ₁₃ NO ₂	70,80	70,91	7,00	6,44	6,62	6,89
C ₄ H ₉	71,0	123—124	C ₁₃ H ₁₅ NO ₂	71,75	71,86	7,20	6,95	6,28	6,44
<i>изо</i> -C ₄ H ₉	50,3	102—103	C ₁₃ H ₁₅ NO ₂	72,09	71,86	7,23	6,95	6,48	6,44

* По литературным данным [3] т. пл. 100—102°.

α -(*n*-Алкоксифенил)- β -этоксиякрилонитрилы (III). Смесь 0,5 моля α -формил-*n*-алкоксифенилацетонитрила и 20 мл ортомуравьиного эфира нагревают на плаве Вуда при 170—180° в течение 2 часов, собирая при этом фракцию, кипящую при 50—80° (смесь образовавшихся этилформиата и спирта). Реакцию считают законченной, когда температура паров достигает 80°.

Таблица 2

R	Выход, %	Т. кип., °С/мм	Молекулярная формула	d_4^{20}	n_D^{20}	MR _D		Анализ, %					
						найдено	вычислено	С		Н		N	
								найдено	вычислено	найдено	вычислено	найдено	вычислено
CH ₃	54,4	189–190/3	C ₁₃ H ₁₃ NO ₂	1,0427	1,5422	60,36	56,51	70,67	70,91	6,14	6,44	7,00	6,89
C ₃ H ₅	76,1	175–177/1	C ₁₃ H ₁₅ NO ₂	1,0527	1,5405	64,80	61,20	71,95	71,86	7,00	6,95	6,83	6,44
C ₃ H ₇	72,0	181–181/1	C ₁₄ H ₁₇ NO ₂	1,0387	1,5330	69,11	65,82	72,88	72,70	7,71	7,40	6,42	6,05
<i>и о</i> -C ₃ H ₇	62,0	182–184/1	C ₁₄ H ₁₇ NO ₂	1,0369	1,5344	69,38	65,82	73,08	72,70	7,56	7,40	6,43	6,05
C ₄ H ₉	68,6	192–193/1	C ₁₅ H ₁₉ NO ₂	1,0264	1,5322	74,10	70,44	73,05	73,43	8,03	7,80	5,61	5,70
<i>и о</i> -C ₄ H ₉	60,3	200–202/1	C ₁₅ H ₁₉ NO ₂	1,0315	1,5309	73,57	70,44	73,25	73,43	7,63	7,80	5,52	5,70

После отгонки избытка ортоуравьинного эфира в вакууме при 20—30 мм продукт реакции перегоняют при 1—2 мм (табл. 2).

2-Меркапто-4-амино-5-(*n*-алкоксифенил)пиридин (1а). Смесь 0,02 моля III, 1,52 г (0,02 моля) тиомочевины и этилата натрия [из 0,46 г (0,02 г-ат) натрия и 30 мл абсолютного спирта] при перемешивании нагревают на водяной бане в течение 5—6 часов. Прибавляют 100 мл воды, отфильтровывают. Фильтрат кипятят с углем в течение 10—15 минут, фильтруют и подкисляют уксусной кислотой. Выпавшие кристаллы оставляют на ночь в холодильнике, отфильтровывают, промывают водой и высушивают (табл. 3).

Таблица 3

R	Выход, %	Т. пл., °C	Молекулярная формула	Анализ, %			
				N		S	
				найде-но	вычис-лено	найде-но	вычис-лено
CH ₃ *	69,0	284—285	C ₁₁ H ₁₁ N ₃ OS	17,69	18,01	13,98	13,74
C ₂ H ₅	66,9	274—275	C ₁₂ H ₁₃ N ₃ OS	16,69	16,99	12,70	12,96
C ₃ H ₇	73,0	268—269	C ₁₃ H ₁₅ N ₃ OS	16,32	16,07	12,25	12,26
<i>изо</i> -C ₃ H ₇	73,0	263—264	C ₁₃ H ₁₅ N ₃ OS	16,16	16,07	12,31	12,26
C ₄ H ₉	70,0	253—254	C ₁₄ H ₁₇ N ₃ OS	15,52	15,26	11,79	11,64
<i>изо</i> -C ₄ H ₉	87,0	258—259	C ₁₄ H ₁₇ N ₃ OS	15,42	15,26	11,49	11,64

* По литературным данным [7], т. пл. 285—288°.

2,4-Диамино-5-(*n*-алкоксифенил)пиридин (1б). К алкоголяту натрия, приготовленному из 0,9 г (0,04 г-ат) натрия и 50 мл абсолютного спирта, прибавляют 1,9 г (0,02 моля) гидрохлорида гуанидина и 0,02 моля III. Реакционную смесь кипятят в течение 5 часов. Прибавляют 100 мл воды и оставляют в холодильнике на ночь. Кристаллы отфильтровывают, промывают водой, высушивают и перекристаллизовывают из уксусной кислоты (табл. 4).

2-Окси-4-амино-5-(*n*-алкоксифенил)пиридин (1в). К раствору 0,005 моля Ia в 5 мл 4*n* едкого натра постепенно при перемешивании приливают 2,5 мл 30%-ной перекиси водорода в 2,5 мл воды. Смесь нагревают на водяной бане в течение 5—10 минут для разложения избытка перекиси водорода. Охлажденный раствор подкисляют уксусной кислотой. Фильтруют кристаллы, промывают водой (табл. 4).

2-Карбоксиметилмеркапто-4-амино-5-(*n*-пропоксифенил)пиридин. Смесь 2,3 г (0,008 моля) Ia (R=C₃H₇), 0,8 г (0,008 моля) монохлоруксусной кислоты, 5 мл уксусной кислоты и 15 мл воды кипятят до полного

растворения (около 1 часа). После отгонки растворителя в вакууме водоструйного насоса остаток кристаллизуется. Кристаллы промывают водой. Выход 2,3 г (92 %); т. пл. 147—148°. Найдено %: N 13,02; S 10,36. $C_{15}H_{17}N_3O_3S$. Вычислено %: N 13,15; S 10,03.

Таблица 4

X	R	Выход, %	Т. пл., °C	Молекулярная формула	А н а л и з, %					
					C		H		N	
					найдено	вычислено	найдено	вычислено	найдено	вычислено
NH ₂	CH ₃ *	57,0	202—204	C ₁₁ H ₁₂ N ₄ O	60,85	61,09	5,26	5,59	25,77	25,91
NH ₂	C ₂ H ₅	78,2	184—185	C ₁₂ H ₁₄ N ₄ O	62,25	62,59	6,13	6,12	24,70	24,33
NH ₂	C ₃ H ₇	54,2	159—160	C ₁₃ H ₁₆ N ₄ O	63,72	63,91	6,35	6,60	23,22	22,93
NH ₂	<i>н</i> зо-C ₃ H ₇	50,0	183—184	C ₁₃ H ₁₆ N ₄ O	64,07	63,91	7,00	6,60	22,65	22,93
NH ₂	C ₄ H ₉	50,0	174—175	C ₁₄ H ₁₈ N ₄ O	64,96	65,09	7,30	7,02	22,00	21,69
NH ₂	<i>н</i> зо-C ₄ H ₉	50,0	176—177	C ₁₄ H ₁₈ N ₄ O	65,36	65,09	7,26	7,02	21,35	21,69
OH	CH ₃ **	90,0	331—332	C ₁₁ H ₁₁ N ₃ O ₂	60,53	60,82	5,36	5,10	18,99	19,34
OH	C ₂ H ₅	87,0	304—305	C ₁₃ H ₁₃ N ₃ O ₂	62,48	62,32	5,57	5,66	18,47	18,17
OH	C ₃ H ₇	80,0	310—311	C ₁₃ H ₁₅ N ₃ O ₂	63,42	63,66	6,45	6,16	17,25	17,13
OH	<i>н</i> зо-C ₃ H ₇	83,3	293—294	C ₁₃ H ₁₅ N ₃ O ₂	63,33	63,66	5,87	6,16	16,97	17,13
OH	C ₄ H ₉	80,5	283—284	C ₁₄ H ₁₇ N ₃ O ₂	64,75	64,84	6,46	6,61	16,38	16,20
OH	<i>н</i> зо-C ₄ H ₉	83,3	280—282	C ₁₄ H ₁₇ N ₃ O ₂	64,53	64,84	6,37	6,61	16,15	16,20

* По литературным данным [3], т. пл. 202—205°.

** По литературным данным [7], т. пл. 332—338°.

2-Окси-4-амино-5-(*n*-пропоксифенил)пиримидин (Iв, R=C₃H₇). Смесь 1,4 г (0,005 моля) 2-карбоксиэтилмеркапто-4-амино-5-(*n*-пропоксифенил)пиримидина и 5 мл соляной кислоты кипятят в течение 1—2 часов. После охлаждения выпадают кристаллы, которые обрабатывают аммиаком, отфильтровывают и промывают водой. Выход 0,8 г (78%). Проба, смешанная с образцом Iв (R=C₃H₇), полученным по первому способу, не дает депрессии температуры плавления.

ՊԻՐԻՄԻԴԻՆԻ ԱՇԱՆՑՅԱԼՆԵՐ

XXIII. 2,4-ՑԵՂԱԿԱԼՎԱՄ-5-(պ-ԱԼԿՈՔՍԻՖԵՆԻԼ)ՊԻՐԻՄԻԴԻՆՆԵՐԻ ՍԻՆՏԵԶ

Մ. Հ. ԿԱԼԴՐԻԿՅԱՆ, Ս. Հ. ԽՈՒՐՇՈՒԿՅԱՆ և Հ. Ա. ՀԱՐՈՅԱՆ

Ա մ փ ո փ ո լ մ

Կառուցվածքի և կենսաբանական ազդեցությունների և եղած կապի ուսումնասիրության նպատակով սինթեզված են 2,4-տեղակալված 5-(պ-ալկոքսիֆենիլ)-

նիլ)պիրիմիդիններ՝ ցիտոզինի և թիոցիտոզինի համանմաններ: α -Ֆորմիլ- α -ալկոբութիֆենիլացետոնիտրիլները ալկիլմամբ ստացված α -(α -ալկոբութիֆենիլ)- β -էթոքսիակրիլանիտրիլները թիոմիզանյութի և գուանիդինի հիդրոքլորիդի հետ ենթարկված են ցիկլացման և այդ կերպ սինթեզված են 2-մերկապտոն-, 2,4-դիամինա-5-(α -ալկոբութիֆենիլ)պիրիմիդիններ: 2-Մերկապտոպիրիմիդիններն օքսիդացված են համապատասխան 2-օքսի-4-ամինա-5-(α -ալկոբութիֆենիլ)պիրիմիդիններին:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. D. A. Clark, Cancer Res., 1952, 12, 255; G. H. Hitchings, J. Biol. Chem., 1952, 199, 11, 43.
2. А. А. Ароян, М. А. Калдрикян, Р. Г. Мелик-Оганджян, Арм. хим. ж., 20, 61 (1967); А. А. Ароян, Р. Г. Мелик-Оганджян, Арм. хим. ж., 20, 314 (1967); А. А. Ароян, М. С. Кјамер, Арм. хим. ж., 20, 218 (1967).
3. P. B. Russel, G. H. Hitchings, J. Am. Chem. Soc., 73, 3763 (1951).
4. P. B. Russel, N. Whittaker, J. Am. Chem. Soc., 74, 1310 (1952).
5. С. С. Гицанов, Структурная рефрактометрия, Москва, 1959, стр. 32, 169.
6. Сб. «Синт. гетер. соед.», Вып. 7, ИТОХ АН АрмССР Ереван, 1966, стр. 79.
7. B. R. Baker, H. L. Kelley, J. Med. Chem., 12, 1039 (1969).