СИНТЕЗ α, ω -ДИ(АМИНО)ПОЛИОРГАНОСИЛОКСАНОВ

К. А. АНДРИАНОВ, В. В. АСТАХИН, М. О. МЕЛИКЯН и В. К. ПЫЖОВ

Институт общей и неорганической химии АН Армянской ССР (Ереван)

Поступило 2 IX 1970

Аммонолизом α, ω -дихлорполиорганосилоксанов с числом атомов кремния от 2 до 5 получены и охарактеризованы линейные α, ω -диамины: α, ω -ди(амино)тетраэтил-, α, ω -ди(амино)диэтилдипропилдсилоксаны; α, ω -ди(амино)гексаэтил-, α, ω -ди(амино)триэтилтрипропилтрисилоксаны; α, ω -ди(амино)октаэтил-, α, ω -ди(амино)тетраэтилтетрапропилтетрасилоксаны и α, ω -ди(амино)декаэтилпентасилоксан. В качестве исходных получены и охарактеризованы α, ω -дихлордиэтилдипропилди-, α, ω -дихлортриэтилтрипропилтри-, α, ω -дихлордекаэтилпентасилоксаны.

Рис. 1, табл. 2, библиографические ссылки 5.

α, ω -Дифункциональные соединения представляют интерес как исходные вещества при получении высокомолекулярных кремнийорганических и смешанных кремнийорганических—органических полимеров методом поликонденсации. В частности, α, ω -ди(амино)полиорганосилоксаны как линейные диамины могут представить интерес в качестве исходных веществ для получения высокомолекулярных соединений полиамидного типа.

Из литературных данных известно, что при аммонолизе α, ω -ди(хлор)диметилсилоксанов получают как циклические соединения—силазоксаны, так и линейные—диамины. Согласно этим данным, аммонолиз α, ω -ди(хлор)диметилсилоксанов с числом атомов кремния от 2 до 6 приводит к образованию циклических силазоксанов [1], а аммонолиз тех же соединений с числом атомов кремния 7 и выше—к линейным α, ω -ди(амино)диметилсилоксанам [2].

Аммонолиз 1,3-дихлор-1,1-диметил-3,3-диэтилсилоксана приводит к образованию также циклического соединения [1а].

В настоящей работе нами исследован аммонолиз α, ω -дихлордиэтилсилоксанов и α, ω -дихлорэтилпропилсилоксанов с общими формулами

Исходные α, ω -дихлордиалкилсилоксаны I получены неполным гидролизом диалкилдихлорсиланов по аналогии с описанным в литературе неполным гидролизом диметилдихлорсилана [3] и теломери-

защисей гексаалкилциклотрисилоксанов с диалкилдихлорсиланами, описанными нами ранее [4]. Из исходных α, ω -дихлорполиорганосилоксанов впервые нами получены и описаны α, ω -дихлордекаэтилпента-, α, ω -дихлордиэтилдипропилди-, α, ω -дихлортриэтилтрипропилтрисилоксаны. Некоторые физические константы и данные элементного анализа этих соединений приведены в таблице 2.

При исследовании аммонолиза указанных соединений было обнаружено, что в этом случае ход реакции иной, по сравнению с аммонолизом описанных в литературе соединений аналогичного порядка. Во всех случаях, судя по данным элементного анализа и ИК спектров, нами получены только линейные α, ω -диамины, согласно следующему уравнению:

1. $\text{R}=\text{C}_2\text{H}_5$, $n=1$; 2. $\text{R}=\text{C}_2\text{H}_5$, $n=2$; 3. $\text{R}=\text{C}_2\text{H}_5$, $n=3$; 4. $\text{R}=\text{C}_2\text{H}_5$, $n=4$;
5. $\text{R}=\text{C}_3\text{H}_7$, $n=1$; 6. $\text{R}=\text{C}_3\text{H}_7$, $n=2$; 7. $\text{R}=\text{C}_3\text{H}_7$, $n=3$.

Полученные соединения жидкости. Выходы, некоторые физические константы и данные элементного анализа приведены в таблице 1.

Рис. ИК спектры ди(амино)этилпропилсилоксанов:

- 1 — $\text{H}_2\text{N}[\text{Si}(\text{C}_2\text{H}_5)(\text{C}_3\text{H}_7)\text{O}]\text{Si}(\text{C}_2\text{H}_5)(\text{C}_3\text{H}_7)\text{NH}_2$;
2 — $\text{H}_2\text{N}[\text{Si}(\text{C}_2\text{H}_5)(\text{C}_3\text{H}_7)\text{O}]_2\text{Si}(\text{C}_2\text{H}_5)(\text{C}_3\text{H}_7)\text{NH}_2$;
3 — $\text{H}_2\text{N}[\text{Si}(\text{C}_2\text{H}_5)(\text{C}_3\text{H}_7)\text{O}]_3\text{Si}(\text{C}_2\text{H}_5)(\text{C}_3\text{H}_7)(\text{NH}_2)$.

ИК спектры ди(амино)этилпропилсилоксанов (рис.) указывают на отсутствие деформационных колебаний в области ~ 905 и ~ 1170 cm^{-1} , характерных для группы >NH . Наличие валентных колебаний в области $3380\text{--}3396$ и $3460\text{--}3473$ cm^{-1} , характерных для группы NH_2 , где наблюдается линейный характер указанных соединений.

Таблица 1

Вещества II	Т. кип., °С/мм	Молекулярная формула	n_D^{20}	d_4^{20}	MR _D		Выход, %	А н а л и з, %							
					найдено	вычислено		С		Н		Si		N	
								найдено	вычислено	найдено	вычислено	найдено	вычислено	найдено	вычислено
R=C ₂ H ₅ , n=1	56/0,5	C ₈ H ₂₄ N ₂ OSi ₂	1,4362	0,9089	63,44	63,54	52,5	44,36	43,58	10,81	10,97	25,29	25,48	12,65	12,69
R=C ₂ H ₅ , n=2	98/0,5	C ₁₂ H ₃₄ N ₂ O ₂ Si ₃	1,4377	0,9272	91,29	91,44	86,6	44,77	44,66	10,47	10,62	26,23	26,11	8,27	8,68
R=C ₂ H ₅ , n=3	144—145/1	C ₁₆ H ₄₄ N ₂ O ₃ Si ₄	1,4400	0,9391	119,1	119,34	64,7	45,63	45,22	10,28	10,43	26,30	26,44	6,54	6,59
R=C ₂ H ₅ , n=4	154—155/0,5	C ₂₀ H ₅₄ N ₂ O ₄ Si ₅	1,4413	0,9478	146,92	147,24	64,5	45,61	45,57	10,54	10,32	26,13	26,64	4,99	5,31
R=C ₃ H ₇ , n=1	68/2	C ₁₀ H ₂₄ N ₂ OSi ₂	1,4390	0,8959	72,94	72,80	72,5	48,03	48,32	11,46	11,35	22,83	22,60	11,2	11,2
R=C ₃ H ₇ , n=2	106—107/2	C ₁₅ H ₃₈ N ₂ O ₂ Si ₃	1,4404	0,9136	105,3	105,33	84,4	49,59	49,39	11,02	11,06	23,46	23,10	7,26	7,67
R=C ₃ H ₇ , n=3	153—155/1	C ₂₀ H ₄₈ N ₂ O ₃ Si ₄	1,4423	0,9223	138,00	137,86	82,7	49,83	49,94	10,72	10,90	23,28	23,35	5,84	5,82

Таблица 2

Вещества I	Т. кип., °С/мм	Молекулярная формула	n_D^{20}	d_4^{20}	MR _D		А н а л и з, %							
					найдено	вычислено	С		Н		Si		Cl	
							найдено	вычислено	найдено	вычислено	найдено	вычислено	найдено	вычислено
R=C ₂ H ₅ , n=4	172—175/1—2	C ₂₀ H ₃₀ Cl ₂ O ₄ Si ₅	1,4436	1,0033	149,70	150,40	42,36	42,44	9,29	8,9	24,55	24,81	12,35	12,53
R=C ₃ H ₇ , n=1	58/1,5	C ₁₀ H ₂₄ Cl ₂ OSi ₂	1,4410	0,9974	76,09	75,96	42,56	41,79	8,8	8,4	19,91	19,54	24,57	24,67
R=C ₃ H ₇ , n=2	92/1	C ₁₅ H ₃₄ Cl ₂ O ₂ Si ₃	1,4429	0,9857	108,55	108,49	44,06	44,63	9,33	8,98	20,70	20,87	18,05	17,56

ИК спектры сняты Л. В. Хажакяном, за что авторы выражают ему благодарность.

Экспериментальная часть

Неполный гидролиз диэтилдихлорсилана. К раствору 707 г диэтилдихлорсилана в 700 мл эфира медленно в течение 2 часов прибавлялась смесь 60,75 г воды и 60 мл диоксана (из расчета 0,75 моля воды на 1 моль дихлорида). После отгонки эфира и диоксана остаток фракционирован на колонке. Выделены следующие фракции:

1) $69^{\circ}/1-2$ мм — 150 г; n_D^{20} 1,4370; % Cl: найдено 27,31. $C_8H_{20}Cl_2OSi_2$. Вычислено %: Cl 27,34 (1,3-дихлортетраэтилдисилоксан). Лит. данные: т. кип. $85-90^{\circ}/10$ мм; n_D^{20} 1,4363 [5].

2) $99^{\circ}/1-2$ мм — 99,8 г; n_D^{20} 1,4390; % Cl: найдено 19,96. $C_{12}H_{20}Cl_2O_2Si_2$. Вычислено %: Cl 19,61 (1,5-дихлоргексаэтилтрисилоксан). Лит. данные: т. кип. $90-131^{\circ}/10$ мм; n_D^{20} 1,4393 [5].

3) $132^{\circ}/1-2$ мм — 39 г; n_D^{20} 1,4416; % Cl: найдено 14,67. $C_{16}H_{40}Cl_2O_3Si_4$. Вычислено %: Cl 15,29 (1,7-дихлороктаэтилтетрасилоксан). Лит. данные: т. кип. $131-145^{\circ}/10$ мм; n_D^{20} 1,4398 [5].

4) $172-175^{\circ}/1-2$ мм — 18,4 г (1,9-дихлордекаэтилпентасилоксан). Физические константы и данные элементного анализа приведены в таблице 2.

Неполный гидролиз этилпропилдихлорсилана. По аналогии с гидролизом диэтилдихлорсилана, из 186 г этилпропилдихлорсилана при фракционировании выделены следующие фракции:

1) $58^{\circ}/1,5$ мм — 36 г (1,3-дихлордиэтилдипропилдисилоксан).

2) $92^{\circ}/1$ мм — 15,3 г (1,5-дихлортриэтилтрипропилтрисилоксан).

Физические константы и данные элементного анализа приведены в таблице 2.

1,7-Дихлортетраэтилтетрапропилтетрасилоксан. Получен теломеризацией триэтилтрипропилциклотрисилоксана с этилпропилдихлорсиланом и описан нами раньше [4].

α,ω -Ди-(амино)диалкилсилоксаны (II). В колбу с обратным холодильником, охлаждаемым ацетоном и твердой двуокисью углерода, конденсировался аммиак. При перемешивании из капельной воронки медленно прибавлялся соответствующий α,ω -дихлордиалкилсилоксан в избыток аммиака и затем в 2-кратном количестве по отношению к хлориду абсолютный эфир. Холодильник заменялся охлаждаемым проточной водой. Перемешивание продолжалось до испарения аммиака. Образующийся при реакции хлористый аммоний отделялся фильтрацией. После отгонки эфира, продукт перегонялся в вакууме.

α,ω-γի(ԱՄԻՆԱ)ՊՈԼԻՈՐԳԱՆԱՍԻԼՕՔՍԱՆՆԵՐԻ ՍԻՆԹԵԶ

Կ. Ա. ԱՆԴՐԻԱՆՈՎ, Վ. Վ. ԱՍՏԱԽԻՆ, Մ. Ն. ՄԵԼԻՔՅԱՆ և Վ. Կ. ՊԻՃՈՎ

Ա մ փ ն փ ու մ

Նկարագրված է α,ω-դի(ամինա)պոլիօրգանասիլօքսանների ստացումը α,ω-դի(քլոր)պոլիօրգանասիլօքսաններից ամոնոլիզի օգնությամբ:

Այս մեթոդով ստացել և նկարագրել ենք α,ω-դի(ամինա)տետրաէթիլդիսիլօքսանը, α,ω-դի(ամինա)հեքսաէթիլտրիսիլօքսանը, α,ω-դի(ամինա)օկտաէթիլտետրասիլօքսանը, α,ω-դի(ամինա)դեկաէթիլպենտասիլօքսանը, α,ω-դի(ամինա)դիէթիլդիպրոպիլդիսիլօքսանը, α,ω-դի(ամինա)տրիէթիլտրիպրոպիլտրիսիլօքսանը և α,ω-դի(ամինա)տետրաէթիլտետրապրոպիլտետրասիլօքսանը, Որպես հյանլուծիչ ստացված և նկարագրված են α,ω-դիքլորդեկաէթիլպենտասիլօքսանը, α,ω-դիքլորդիէթիլդիպրոպիլդիսիլօքսանը և α,ω-դիքլորտրիէթիլտրիպրոպիլտրիսիլօքսանը:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. а) Н. Н. Соколов, ЖОХ, 29, 258 (1959); б) С. R. Krüger, E. G. Rochow, Angew. Chem., 74, 491 (1962); в) С. R. Krueger, E. G. Rochow, Inorgan. Chem., 2, 1295 (1963); г) J. G. Murray, R. K. Grifflith, J. Org. Chem., 29, 1215 (1964).
2. К. А. Андрианов, Л. М. Волкова, В. Н. Таланов, Изв. АН СССР, ОХН, 1963, 2045.
3. W. Paninod, D. F. Wilcock, J. Am. Chem. Soc., 68, 358 (1946).
4. К. А. Андрианов, В. В. Астахин, М. О. Мелкян, Н. Г. Мушегян, В. К. Пыжов, Арм. хим. ж., 21, 317 (1968).
5. А. А. Жданов К. А. Андрианов, А. А. Богданова, Изв. АН СССР, ОХН, 1961, 1261.