УДК 547.317.4+547.431.4+547.811

РЕАКЦИИ ГАЛОГЕНОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

III. ЦИКЛОАЛКИЛИРОВАНИЕ бис-ХЛОРМЕТИЛОВОГО ЭФИРА
 ДИВИНИЛАЦЕТИЛЕНОВЫМИ УГЛЕВОДОРОДАМИ

А. А. ГЕВОРКЯН, Ш. О. БАДАНЯН и А. А. МАНУКЯН

Институт органической химии АН Армянской ССР (Ереван)

23 VI 1971

При исследовании взаимодействия бис- α -галогеналкиловых эфиров с рядом моноолефинов [1] и диолефинов [2,3] нами обнаружена реакция, приводящая к производным тетрагидропирана. Схема этих превращений представляется в виде двух последовательных реакций генерирования α -хлорированного эфира аллилкарбинола и внутримолекулярного присоединения. Исходя из такого представления и данных литературы о порядке присоединения α -галогенированных эфиров к винил- и дивинилацетиленовым системам [4], мы полагали, что удастся вовлечь в реакцию циклообразования также дивинилацетилен и ряд его производных согласно следующей схеме:

Как и следовало ожидать, в результате реакции образуются два вещества (ГЖХ) в почти равных количествах. Чтобы доказать, что они являются производными пирана, продукт реакции бис-хлорметилового эфира с дивинилацетиленом подвергли гидрированию водородом в момент выделения. При помощи ГЖХ показано, что при этом образуется 3-пропилтетрагидропиран (I). На этом основании для компонентов смеси нами приписываются структуры I и II.

Кроме того, было показано, что при взаимодействии дихлоридов с аминами реагируют оба дихлорида, а в результате реакции получается (с выходом до 80%) не смесь изомерных аминов, а один амин, для которого принимается структура III.

Такой ход реакции, очевидно, объясняется тем, что исходные дихлориды являются изомерами положения двойной связи [5].

Экспериментальная часть

Взаимодействие дивинилацетилена с бис-хлорметиловым эфиром. К смеси 1—1,5 г свежеплавленного хлористого цинка, 11,5 г (0,1 моля) бис-хлорметилового эфира и 30 мл сухого эфира при температуре кипения эфира при перемешивании прикапали 11 г (0,14 моля) дивинилацетилена в течение 4 часов. После окончания прикапывания смесь продолжали нагревать еще 3 часа, промыли водой, экстрагировали эфиром, эфирный экстракт промыли раствором поташа, водой и высушили сульфатом натрия. После удаления растворителя разгонкой выделили 3,6 г (14%) смеси, состоящей, по-видимому, из 4-хлор-3- α -хлораллилиден)-тетрагидропирана и 3-(1',3'-дихлорпропенил-1')- Δ^3 -дигидропирана. Т. кип. 100—103°/4 мм; n_D^{20} 1,5410; d_4^{20} 1,2586. Найдено %: С 49,37; Н 5,53; Cl 36,60. $C_8H_{10}Cl_2O$. Вычислено %: С 49,73; Н 5,27; Cl 36,75. В ИК спектре имеются поглощения при 878, 930, 984, 1613, 1637 и 3075 cm^{-1} . Этот продукт при восстановлении водородом в момент выделения по [3], образует 3-пропилтетрагидропиран, идентичный образцу, полученному восстановлением 4-хлор-3-пропилтетрагидропирана. ГЖХ (прибор УХ-2, колонка 420 см с ПЭГ-1500, нанесенный на хроматон N-AW-HMDS, температура колонки 135°, детектор пламенно-ионизационный) показала идентичность обоих образцов 3-пропилтетрагидропиранов.

Взаимодействие винилизопропенилацетилена с бис-хлорметиловым эфиром. Реакцию проводили аналогично вышеописанному. Из 9,2 г (0,1 моля) винилизопропенилацетилена и 11,5 г (0,1 моля) бис-хлорметилового эфира в присутствии 1 г хлористого цинка получили 9,5 г (46%) смеси, по-видимому состоящей из 4-метил-4-хлор-3-(α -хлораллилиден)тетрагидропирана и 4-метил-3-(1',3'-дихлорпропенил-1')- Δ^3 -дигидропирана. Т. кип. 104—106°/4 мм; n_D^{20} 1,5275; d_4^{20} 1,2001. Найдено %: С 51,63; Н 5,86; Cl 34,58. $C_9H_{12}OCl_2$. Вычислено %: С 52,17; Н 5,79; Cl 34,25. В ИК спектре имеются поглощения при 895, 924, 971, 995, 1642, 1672 и 3043 cm^{-1} . ГЖХ этого образца показывает два пика с некоторым преобладанием более полярного компонента.

Получение 4-метил-3-(1'-хлор-3'-диалкиламинопропенил-1')- Δ^3 -дигидропиранов. Смесь 0,05 моля 4-метил-4-хлор-3-(α -хлораллилиден)тетрагидропирана и 4-метил-3-(1',3'-дихлорпропенил-1')- Δ^3 -дигидропирана и 0,15 моля вторичного амина в диэтиловом эфире оставляли стоять при комнатной температуре 3—4 дня. За это время реакция заканчивается полностью. Реакционную смесь подкисляли соляной кислотой, экстрагировали эфиром, водный слой подщелачивали содой, выделившийся амин экстрагировали эфиром и после удаления растворителя продукт перегоняли в вакууме. Таким образом синтезированы следующие амины.

4-Метил-3-(1'-хлор-3'-диметиламинопропенил-1')- Δ^3 -дигидропиран. Выход 80%, т. кип. 118°/5 мм; n_D^{20} 1,5030; d_4^{20} 1,042. Найдено %: N 6,63; Cl 16,54. $C_{11}H_{18}NOCl$. Вычислено %: N 6,49; Cl 16,47.

4-Метил-3-(1'-хлор-3'-диэтиламинопропенил-1')- Δ^3 -дигидропиран. Выход 69%, т. кип. 125—126°/6 мм; n_D^{20} 1,5080; d_4^{20} 1,0457. Найдено %: N 5,90; Cl 14,82. $C_{13}H_{22}NOCl$. Вычислено %: N 5,74; Cl 14,58.

4-Метил-3-(1'-хлор-3'-пиперидинопропенил-1')- Δ^3 -дигидропиран. Выход 59%, т. кип. 132°/2 мм; n_D^{20} 1,5215; d_4^{20} 1,0655. Найдено %: N 5,63; Cl 13,58. $C_{14}O_{22}NOCl$. Вычислено %: N 5,47; Cl 13,50.

ГЖХ аминов на колонке длиной 200 см, с 3%-ной жидкой фазой CM-1835, нанесенной на хроматон, обработанный 5%-ным раствором NaOH, при температуре колонки 135—160° показала, что они, в отличие от исходного хлорида, являются индивидуальными продуктами.

ЛИТЕРАТУРА

1. А. А. Геворкян, Ш. О. Баданян, А. А. Манукян, П. И. Казарян, Арм. хим. ж., 25, 909, (1971).
2. С. А. Варганян, А. А. Геворкян, Ф. В. Дангян, Изв. Арм. ССР, ХН 15, 259 (1962).
3. А. А. Геворкян, Ш. О. Баданян, П. И. Казарян, А. А. Манукян, Арм. хим. ж., в печати.
4. С. А. Варганян, А. О. Тосунян, «Успехи химии», 34, 618 (1965).
5. С. А. Варганян, Ш. О. Баданян, Г. А. Мусаханян, Изв. АН Арм. ССР, ХН, 16, 19 (1963).