ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИАГОНАЛЬНЫХ
 СЕЧЕНИЙ $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7\text{—Ga}(\text{NO}_3)_3\text{—H}_2\text{O}$ и $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7\text{—ZnSO}_4\text{—H}_2\text{O}$
 ЧЕТВЕРНЫХ ВЗАИМНЫХ СИСТЕМ ТИПА Na^+ , $\text{Ga}^{3+} // \text{B}_4\text{O}_7^{2-}$,
 $\text{NO}_3^- \text{—H}_2\text{O}$ И Na^+ , $\text{Zn}^{2+} // \text{B}_4\text{O}_7^{2-}$, $\text{SO}_4^{2-} \text{—H}_2\text{O}$ ПРИ 20°С

С. М. ГУБАСАРЯН, С. Г. ИСААКЯН и Г. Г. БАБАЯН

Кироваканский филиал Ереванского политехнического института
 Ереванский государственный университет

Поступило 27 XII 1972.

Методами физико-химического анализа исследованы диагональные сечения $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7\text{—Ga}(\text{NO}_3)_3\text{—H}_2\text{O}$ и $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7\text{—ZnSO}_4\text{—H}_2\text{O}$ четверных взаимных систем типа Na^+ , $\text{Ga}^{3+} // \text{B}_4\text{O}_7^{2-}$, $\text{NO}_3^- \text{—H}_2\text{O}$ и Na^+ , $\text{Zn}^{2+} // \text{B}_4\text{O}_7^{2-}$, $\text{SO}_4^{2-} \text{—H}_2\text{O}$ при 20°. Установлено, что образуются соединения переменного состава. Твердые фазы исследованы термографическим, рентгенографическим и ИКС методами анализа.

Рис. 4, библиографические ссылки 7.

Сведения о взаимодействии тетрабората натрия с нитратом галлия и сульфатом цинка в водной среде в литературе отсутствуют. Настоящая работа посвящена физико-химическому исследованию диагональных сечений $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7\text{—Ga}(\text{NO}_3)_3\text{—H}_2\text{O}$ и $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7\text{—ZnSO}_4\text{—H}_2\text{O}$ четверных взаимных систем Na^+ , $\text{Ga}^{3+} // \text{B}_4\text{O}_7^{2-}$, $\text{NO}_3^- \text{—H}_2\text{O}$ и Na^+ , $\text{Zn}^{2+} // \text{B}_4\text{O}_7^{2-}$, $\text{SO}_4^{2-} \text{—H}_2\text{O}$, выяснению условий образования боратов галлия и цинка из водных растворов с установлением состава образующихся твердых фаз по методу „остатков“ Шрейнемакера и их идентификации термографическим, рентгенографическим и ИКС методами анализа.

Экспериментальная часть

В качестве исходных компонентов для исследования взаимночетверных систем были взяты: $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$, $\text{Ga}(\text{NO}_3)_3 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$, $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ марки «х. ч.» и вода двукратной дистилляции. Приготовленные реакционные смеси помещались в водяной термостат, где поддерживалась температура в 20° до установления равновесия, которое определялось анализом жидкой фазы. Оно наступило через 2—3 суток. Затем осадок отделялся от жидкой фазы фильтрованием. Равновесные жидкие и твердые фазы анализировались на содержание в них Ga^{3+} , Zn^{2+} , $\text{B}_4\text{O}_7^{2-}$ и H_3BO_3 . Концентрация ионов Ga^{3+} и Zn^{2+} определялась комплексонометрически [1, 2, 3], тетраборат ионов — ацидиметрически, борная кислота — алкалометрическим методом в присутствии маннита [4],

предварительно маскируя Ga^{3+} и Zn^{2+} комплексоном III [5, 6]. Вода определялась по разности. Жидкая фаза подвергалась физико-химическому исследованию. Удельная электропроводность жидкой фазы измерялась реохордным мостом Р-38, рН — на рН-метре ЛПУ-01, плотность определялась пикнометрически, показатель преломления — на рефрактометре РЛ-2.

Термический анализ выделенных боратов проводился на дериватографе МОМ-1100 и на пирометре Курнакова, скорость нагрева 15–20 град/мин.

ИК спектры поглощения записывались на спектрофотометре ИКС-14А в диапазоне от 400 до 4000 $см^{-1}$ с использованием смежных призм NaCl и LiF. Рентгенографический анализ проведен методом порошка на антикатоде (Fe и С) с режимом работы 35 кв 8–10 ма. Для изображения кривых растворимости и определения состава твердых фаз по методу „остатков“ Шрейнемакерса в четверных взаимных системах Na^+ , $Ga^{3+} // B_4O_7^{2-}$, $NO_3^- - H_2O$ и Na^+ , $Zn^{2+} // B_4O_7^{2-}$, $SO_4^{2-} - H_2O$ при 20° пользовались диагональной проекцией из вершины угла H_2O на соответствующую диагональ $Na_2B_4O_7 - MeX$ [где $MeX = Ga(NO_3)_3$, $ZnSO_4$]. Для нанесения фигуративных точек системы на концентрационный треугольник за 100% принимались $Na_2B_4O_7 + MeX + H_2O$.

Обсуждение результатов

Изотерма растворимости диагонального сечения $Na_2B_4O_7 - Ga(NO_3)_3 - H_2O$ (рис. 1) четверной взаимной системы Na^+ , $Ga^{3+} // B_4O_7^{2-}$, $NO_3^- - H_2O$ при 20° характеризуется наличием двух ветвей кристаллизации. Первая отвечает кристаллизации $Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$ и имеет сравнительно незначительную протяженность. Вторая с содержанием азотнокислого галлия в жидкой фазе от 0,59 до 16,74 масс. % соответствует кристаллизации боратов галлия переменного состава:

Отсутствие ветви кристаллизации $Ga(NO_3)_3$ при 20° свидетельствует о его высокой растворимости в водных растворах и склонности системы к перенасыщению.

Диаграмма растворимости диагонального сечения $Na_2B_4O_7 - ZnSO_4 - H_2O$ (рис. 2) четверной взаимной системы Na^+ , $Zn^{2+} // B_4O_7^{2-}$, $SO_4^{2-} - H_2O$ при 20° содержит три поля кристаллизации, отвечающих выделению в твердую фазу H_3BO_3 , $ZnSO_4 \cdot 7H_2O$ и боратов цинка переменного состава

Изученные зависимости физико-химических свойств равновесных насыщенных растворов четверных взаимных систем Na^+ , $Ga^{3+} // B_4O_7^{2-}$, $NO_3^- - H_2O$ и Na^+ , $Zn^{2+} // B_4O_7^{2-}$, $SO_4^{2-} - H_2O$, удельной электропроводности (κ), рН, плотности (d) и показателя преломления (P_c) подтвер-

дили образование в изученных системах соединения переменного состава галлия и цинка.

Рис. 1. Изотерма растворимости диагонального сечения $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$ — $\text{Ga}(\text{NO}_3)_3$ — H_2O четверной взаимной системы Na^+ , Ga^{3+} // $\text{B}_4\text{O}_7^{2-}$, NO_3^- — H_2O при 20° .

Рис. 2. Диаграмма растворимости диагонального сечения $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$ — ZnSO_4 — H_2O четверной взаимной системы Na^+ , Zn^{2+} // $\text{B}_4\text{O}_7^{2-}$, SO_4^{2-} — H_2O при 20° .

Рис. 3. Дериватограмма бората галлия переменного состава $\text{Ga}_2\text{O}_3 \cdot 9\text{Na}_2\text{O} \cdot 18\text{B}_2\text{O}_3 \cdot 18\text{H}_2\text{O}$.

Рис. 4. Дериватограмма бората цинка $6,4\text{ZnO} \cdot 2\text{B}_2\text{O}_3 \cdot 33\text{H}_2\text{O}$.

Для подтверждения индивидуальности полученных боратов цинка и галлия отдельные образцы твердой фазы были исследованы термографически, ИК спектроскопически и рентгенографически. Анализ термограмм показал, что изученные образцы имеют разные кривые нагревания. Для иллюстрации приводятся дериватограммы только двух образцов: для бората галлия состава $\text{Ga}_2\text{O}_3 \cdot 9\text{Na}_2\text{O} \cdot 18\text{B}_2\text{O}_3 \cdot 18\text{H}_2\text{O}$ и бората

цинка состава $6,4\text{ZnO} \cdot 2\text{B}_2\text{O}_3 \cdot 33\text{H}_2\text{O}$. На кривой нагревания $\text{Ga}_2\text{O}_3 \cdot 9\text{Na}_2\text{O} \cdot 18\text{B}_2\text{O}_3 \cdot 18\text{H}_2\text{O}$ имеются эндотермические эффекты при 75 , 85 , 172 и 185° , отвечающие выделению адсорбционной и кристаллизационной воды, и экзотермический эффект при 685° , отвечающий боковой перегруппировке [7].

Дериватограмма бората цинка $6,4\text{ZnO} \cdot 2\text{B}_2\text{O}_3 \cdot 33\text{H}_2\text{O}$ (рис. 4) характеризуется эндотермическими эффектами обезвоживания при 50 , 90 , 150 , 240 и 340° и структурным превращением при 630° . При 740° происходит разложение.

Рентгенографический анализ позволил установить различие кристаллических структур изученных образцов и рассчитать межплоскостные расстояния (d_{hkl}).

Изучение ИК спектров поглощения показало, что полосы поглощения соответствуют валентным и деформационным колебаниям связи $\text{B}-\text{O}$ различной координации $\text{B}_{(4)}-\text{O}$, $\text{B}_{(3)}-\text{O}-\text{B}_{(3)}$, $\text{B}_{(4)}-\text{O}-\text{B}_{(4)}$ — $\text{B}_{(3)}-\text{OH}$ и т. д.

20°-ՈՒՄ $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7-\text{Ga}(\text{NO}_3)_3-\text{H}_2\text{O}$ եւ $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7-\text{ZnSO}_4-\text{H}_2\text{O}$
 ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԼՈՒԾԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՖԻԶԻԿԱ-ՔԻՄԻԱԿԱՆ
 ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ս. Մ. ՂՈՒՐԱՍՈՐՅԱՆ, Ս. Գ. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆ և Հ. Գ. ԲԱՐԱՅԱՆ

$\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7-\text{Ga}(\text{NO}_3)_3-\text{H}_2\text{O}$ և $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7-\text{ZnSO}_4-\text{H}_2\text{O}$ համակարգերը հանդիսանում են Na^+ , $\text{Ga}^{3+} // \text{B}_4\text{O}_7^{2-}$, $\text{NO}_3^- - \text{H}_2\text{O}$ և Na^+ , $\text{Zn}^{2+} // \text{B}_4\text{O}_7^{2-}$, $\text{SO}_4^{2-} - \text{H}_2\text{O}$ փոխադարձ քառակոմպոնենտ համակարգերի անկյունագծալին կտրված քները:

Այս համակարգերի լուծելիությունն ուսումնասիրվել է սկզբնական հազեցած լուծույթը ջրային թերմոստատում 20° -ում հավասարակշռության վիճակի բերելու եղանակով:

Համակարգի հավասարակշռության հաստատվելու ժամանակը որոշվել է հեղուկ ֆազի բաղադրությունը պարբերաբար ստուգելով: Պինդ ֆազի բաղադրությունը որոշվել է Շրենյեմակերսի «ամացորդների» եղանակով:

$\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7-\text{Ga}(\text{NO}_3)_3-\text{H}_2\text{O}$ համակարգի լուծելիության իզոթերմը բնութագրվում է բյուրեղացման երկու դաշտով, նատրիումի տետրաբորատի տասմոլ. ջրով և գալիումի բորատի փոփոխական բաղադրությամբ ֆազի դաշտով:

$\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7-\text{ZnSO}_4-\text{H}_2\text{O}$ իզոթերմին համապատասխանում է բյուրեղացման երեք դաշտ, որոնցից երկուսը՝ ելանյութերի բյուրեղացմանը, իսկ երրորդը՝ փոփոխվող բաղադրության ֆազերին:

Ստացված պինդ ֆազերի անհատականությունն ապացուցված է թերմոգրաֆիկ, ռենտգենոգրաֆիկ անալիզներով և իհ սպեկտրների տվյալներով:

PHYSICO-CHEMICAL INVESTIGATION OF DIAGONAL
SECTIONS $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7\text{—Ga}(\text{NO}_3)_3\text{—H}_2\text{O}$ AND $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7\text{—ZnSO}_4\text{—H}_2\text{O}$
FOUR-MEMBER MUTUAL SYSTEM Na^+ , $\text{Ga}^{3+} // \text{B}_4\text{O}_7^{2+}$, $\text{NO}_3^- \text{—H}_2\text{O}$
AND Na^+ , $\text{Zn}^{2+} // \text{B}_4\text{O}_7^{2-}$, $\text{SO}_4^{2-} \text{—H}_2\text{O}$ AT 20°

S. M. GHUBASSARIAN, S. G. ISSAHAKIAN and H. G. BABAYAN

The solubility diagram of $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7\text{—Ga}(\text{NO}_3)_3\text{—H}_2\text{O}$ system is defined by two crystallization fields, corresponding to sodium tetraborate and gallium borate hydrates of unsteady composition. The solubility isotherm of $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7\text{—ZnSO}_4\text{—H}_2\text{O}$ system contains three branches of crystallization. The solid phases of the systems studied are identified by thermographical, UR spectroscopical and X-ray methods of analysis.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Т. В. Черкашина, Зав. лаб., 22, 276 (1956).
2. А. М. Дымов, А. П. Савостин, Аналитическая химия галлия, Изд. Наука, М., 1963, стр. 99.
3. Г. Шварценбах, Г. Флашка, Комплексонометрическое титрование, Изд. Химия, М., 1970, стр. 264.
4. М. Г. Васильева, В. М. Лалькина, Н. А. Махарашвили, А. Л. Соколова, В. М. Сокофер, Н. Г. Цкирия, Анализ бора и его органических соединений, Атомиздат, М., 1965, стр. 13.
5. Rugglori, *Analyt. chim. Act.*, 25, 145 (1961).
6. М. Б. Щеголь, Н. Б. Бурчинская, ЖАХ, 11, 106 (1956).
7. А. Кешан, Синтез боратов в водном растворе и их исследование, Изд. АН Лат. ССР, Рига, 1955, стр. 150.