ЭКСТРАКЦИОННО-АБСОРБЦИОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 РЕНИЯ ОСНОВНЫМ КРАСИТЕЛЕМ—
 АКРИДИНОВЫМ ЖЕЛТЫМ

В. М. ТАРАЯН и А. Г. ГАЙБАКЯН

Ереванский государственный университет

Поступило 10 VII 1974

Предложен метод экстракционно-абсорбциометрического определения рения акридиновым желтым (АЖ). В качестве экстрагента применена смесь дихлорэтан: ацетон (1:1). При оптимальной кислотности водной фазы (рН=2,3—5,3 по H_3PO_4) перренат АЖ практически переходит в органическую фазу. Подчиняемость закону Бера соблюдается в интервале 1—20 мкг Re в 5 мл экстракта. Перренат-ион взаимодействует с катионом АЖ в мольном отношении 1:1. Изучено влияние молибдена, ванадия, вольфрама на избирательность экстракции перрената АЖ.

Рис. 4, табл. 2, библиографические ссылки 4.

Ранее были разработаны экстракционно-абсорбциометрические и экстракционно-флуориметрические методы определения микрограммовых количеств рения основными красителями акридинового ряда—акридиновым оранжевым и акрифлавином [1—4].

Данное исследование посвящено изучению возможностей применения аналога акридинового оранжевого и акрифлавина—основного красителя—акридинового желтого (АЖ).

Экспериментальная часть

Запасной $5,4 \cdot 10^{-3}$ М водный раствор перрената аммония готовили из дважды перекристаллизованной соли. Измерения оптических плотностей экстрактов образующегося трехкомпонентного соединения проводили на спектрометре СФ-4А. Равновесные значения рН водной фазы измеряли на потенциометре ЛПУ-01. Из апробированных растворителей в качестве экстрагентов наиболее пригодными оказались бинарные смеси дихлорэтана с ацетоном, извлекающие ионный ассоциат рения и почти не извлекающие простую соль реагента (табл. 1).

Таблица 1

Зависимость оптической плотности экстрактов* от состава экстрагирующей смеси и природы кислоты в водной фазе

$[ReO_4^-] = 1,08 \cdot 10^{-5} M$, $[АЖ] = 1,92 \cdot 10^{-4} M$, $pH = 3$

Среда	Экстрагирующая смесь		A_0	A
H_3PO_4	Дихлорэтан : ацетон	9 : 1	0,007	0,106
	"	8 : 2	0,033	0,160
	"	6 : 4	0,040	0,160
	"	5 : 5	0,048	0,185
H_2SO_4	Дихлорэтан : ацетон	9 : 1	0,033	0,09
	"	8 : 2	0,039	0,155
	"	1 : 4	0,048	0,170
	"	5 : 5	0,065	0,180
HCl	Дихлорэтан : ацетон	9 : 1	0,025	0,105
	"	8 : 2	0,033	0,150
	"	6 : 4	0,032	0,166
	"	5 : 5	0,040	0,200

* A_0 — оптическая плотность „холостого“ опыта, измеренная по отношению к органическому растворителю; A — оптическая плотность экстракта ионного ассоциата, измеренная по отношению к „холостому“ опыту.

Из приведенных в табл. 1 данных следует, что независимо от природы кислоты наибольшее извлечение образующегося соединения рения наблюдается при соотношении дихлорэтан: ацетон = 1:1.

Спектр поглощения экстракта перрената АЖ, полученного из фосфорнокислой водной фазы, приведен на рис. 1.

Максимум светопоглощения наблюдается при 455—460 нм, где поглощение «холостого» опыта незначительно.

Для выяснения оптимальных условий экстракции была исследована зависимость оптической плотности дихлорэтан-ацетоновых экстрактов перрената АЖ от кислотности водной фазы (рис. 2).

Постоянная и максимальная оптическая плотность экстракта перрената АЖ достигается при извлечении из фосфорнокислой водной фазы (pH 2,3—5,3). В условиях оптимальной кислотности однократная экстракция достаточна для практически полного извлечения рения. Фактор извлечения равен 0,92. Экстракты соединения перрената АЖ, как и экстракты «холостых» проб, устойчивы в течение 1 рабочего дня. Для достижения постоянной оптической плотности достаточно 2 мл $4,8 \cdot 10^{-4} M$ водного раствора акридинового желтого в 5 мл водной фазы. В найденных оптимальных условиях кислотности и концентрации реагента равновесие в исследуемой двухфазной системе устанавливается при встряхивании в течение 1 мин. Подчиняемость основному закону фотометрии соблюдается до 20 мкг рения в 50 мл экстракта.

Рис. 1. Спектры поглощения дихлорэтан-ацетоновых экстрактов: 1 — перрената АЖ; 2 — „холодого“ опыта.

Рис. 2. Зависимость оптической плотности экстрактов от кислотности водной фазы: 1 — перрената АЖ; 2 — „холодого“ опыта; $[Re] = 1,08 \cdot 10^{-5}$ М, $[AJ] = 1,92 \cdot 10^{-4}$ М. $V_{орг.} = V_{вод.} = 5$ мл, $\lambda = 455$ н.м., $b = 5$ мм.

На основании данных калибровочного графика было найдено среднее значение кажущегося коэффициента молярного светопоглощения для экстракта перрената АЖ при $\lambda_{455} = 3,5 \cdot 10^4$. Соотношение компонентов в перренате АЖ определено методом изомольных серий с применением экстракции (рис. 3) и методом «сдвига равновесия» (рис. 4). В логарифмических координатах зависимость образования исследуемого соединения от концентрации красителя и перренат-иона носит линейный характер и тангенс угла наклона близок к единице.

Рис. 3. Изомольная серия растворов перренат-иона и АЖ $\lambda = 455$ н.м., $b = 5$ мм. Общая молярная концентрация: 1 — $4,03 \cdot 10^{-6}$ М; 2 — $8,06 \cdot 10^{-5}$ М; 3 — $1,30 \cdot 10^{-4}$ М.

В логарифмических координатах зависимость образования исследуемого соединения от концентрации красителя и перренат-иона носит линейный характер и тангенс угла наклона близок к единице.

Рис. 4. Логарифмический график зависимости образования ассоциата перрената от концентрации АЖ. $[Re]_{орг.}$ — концентрация соединения перрената АЖ в органической фазе; $[Re]_{вод.}$ — концентрация перрената АЖ в водной фазе; $[AJ]$ — равновесная концентрация АЖ в водной фазе.

Из приведенных данных следует, что перренат-анион вступает в реакцию с катионом АЖ в мольном отношении 1:1. Установлена избирательность экстракции рения в оптимальных условиях для экстракционно-абсорбциометрического его определения. Специфика вскрытия рений-содержащих проб, т. е. предварительное спекание с окисью кальция в окислительной атмосфере и т. д., способствует удалению основной массы мешающих элементов. Поэтому избирательность экстракции перрената АЖ была исследована при наличии в водной фазе только молибдена, вольфрама и ванадия (табл. 2).

Таблица 2
Избирательность экстракционно-абсорбциометрического определения рения АЖ ($C_{Re} = 10 \text{ мкг/5 мл}$)

Элемент	Кол-во, мкг
Mo (VI)	75
V (V)	30
W (VI)	40

Ход определения. К раствору рения добавляли 1 мл $9,6 \cdot 10^{-4}$ М водного раствора АЖ, разбавляли соответствующим фосфатным буфером до 5 мл и экстрагировали 1 раз 5 мл смеси 1,2-дихлорэтан:ацетон (1:1). После разделения фаз объем органической фазы доводили указанной смесью до 5 мл и фотометрировали при длине волны 455 нм против «холостого» опыта.

ՌԵՆԻՈՒՄԻ ԷՔՏՐԱԿՎԱՅԻՈՆ-ԱՔՍՈՐԲՑԻՈՄԵՏՐԻԿ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
ՀԻՄՆԱՅԻՆ ՆԵՐԿԱՆՅՈՒԹ ԱՎՐԻԴԻՆԱՅԻՆ ԴԵՂԻՆՈՎ

Վ. Մ. ԹԱՌԱՅԱՆ և Ա. Գ. ԳԱՏԲԱԿՅԱՆ

Առաջարկված է ռենիումի էքստրակցիոն-աքսորբցիոմետրիկ որոշման եղանակ ակրիդինային դեղինով, Ուսումնասիրված է մոլիբդենի, վանադիումի և վոլֆրամի ազդեցությունը ակրիդինային դեղինով պերռենատի էքստրակցիայի ընտրողականության վրա:

EXTRACTION-ABSORPTIONAL DETERMINATION OF RHENIUM
WITH THE BASIC DYE ACRIDIN-YELLOW

V. M. TARAYAN and A. G. GAIBAKIAN

A method for the determination of microgramm amounts of rhenium has been worked out based on the measurement of the absorbed light

intensity by acridin-yellow perrhenate with 1,2-dichloroethane:acetone (1:1) extracts.

The extraction of perrhenate with acridin-yellow from phosphoric, sulphuric and hydrochloric solutions has been studied. The apparent molar extraction coefficient is found to be equal to $3,5 \cdot 10^4$.

The effect of accompanying foreign elements on the selective extraction of rhenium has been investigated.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. В. М. Тараян, А. Г. Гайбалян, Арм. хим. ж., 23, 895 (1970).
2. Л. А. Григорян, А. Г. Гайбалян В. М. Тараян, ДАН Арм. ССР, 54, 229 (1972).
3. Л. А. Григорян, А. Г. Гайбалян, В. М. Тараян, Зав. лаб. 40, 136 (1974).
4. В. М. Тараян, А. Г. Гайбалян, Арм. хим. ж., 26, 812 (1973).