ПРОИЗВОДНЫЕ ПИРИМИДИНА

XXXVII N¹-(*п*-АЛКОКСИБЕНЗИЛ)-5,6-ДИГИДРОУРАЦИЛЫ
 И ТИОУРАЦИЛЫ

М. А. КАЛДРИКЯН и А. А. АРОЯН

Институт тонкой органической химии им. А. Л. Миджояна
 АН Армянской ССР, Ереван

Поступило 31 VII 1973

Изучена циклизация N¹N¹-цианэтил-*п*-алкоксибензил-N³-бензонилтиомочевин, а также метиловых эфиров β-(*п*-алкоксибензиламино)пропионовых кислот в соответствующие 5,6-дигидротиоурацилы и урацилы.

Табл. 4, библиографические ссылки 17.

Производные дигидропириимидинов (дигидроуротат) представляют собой важные промежуточные продукты в биосинтезе пириимидиновых нуклеотидов [1—3]. После выделения из печени дигидроцитидиновой кислоты было установлено, что некоторые дигидроцитозины являются предшественниками цитидиновых производных [4—6].

В настоящей работе описан синтез 5,6-дигидроурацилов и тиоурацилов I, содержащих *п*-алкоксибензильный радикал в положении 1.

X=O, S; R=CH₃...*изо*-C₄H₉

Существует несколько путей синтеза аналогичных соединений. Одним из них является каталитическое гидрирование пириимидинового кольца [7,8]. Однако этот метод ограничен и имеет недостатки. Так, при гидрировании цитозина, кроме 5,6-дигидропроизводного, образуются также тетра- и гексагидроцитозины. Другой метод, разработанный Фишером [9] и видоизмененный Джонсоном [10], Брауном [11] и Банклейом [12], включает получение замещенных β-аланинов и циклизацию в 1-замещенные дигидроурацилы. Ченгем и Левисом описана циклизация простых цианэтилмочевин в щелочной и кислой среде [13]. Ими было установлено, что 1-алкил-1-цианэтилмочевин при кипячении с разбавленной соляной кислотой с хорошими выходами превращаются в 1-алкил-5,6-дигидроурацилы. Позднее Даубом с сотр. [14] эта методи-

цианата в 20 мл абс. эфира. Через день образовавшиеся кристаллы отфильтрованы, промыты абс. эфиром и перекристаллизованы из этанола (табл. 2).

Таблица 1

R	Выход, %	Т. кип., °С/мм	d ₄ ²⁰	n _D ²⁰	А н а л и з, %					
					С		Н		N	
					найдепо	вычислено	найдепо	вычислено	найдепо	вычислено
CH ₃	83,5	153—154/1	1,0707	1,5348	69,30	69,44	7,15	7,40	14,65	14,72
C ₂ H ₅	91,0	185—187/3	1,0451	1,5211	70,67	70,50	7,96	7,89	13,93	13,71
C ₃ H ₇	80,5	175—177/1	1,0331	1,5198	71,77	71,50	8,07	8,31	12,56	12,83
изо-C ₃ H ₇	84,2	182—183/2	1,0158	1,5160	71,68	71,50	8,57	8,31	12,75	12,83
C ₄ H ₉	81,6	185—187/1	1,0226	1,5178	72,56	72,30	8,78	8,67	12,35	12,05

Таблица 2

R	Выход, %	Т. пл., °С	А н а л и з, %			
			N		S	
			найдепо	вычислено	найдепо	вычислено
CH ₃	75,2	122—123	11,43	11,88	9,29	9,07
C ₂ H ₅	81,0	120—121	11,65	11,43	8,67	8,72
C ₃ H ₇	76,5	110—111	11,27	11,01	8,75	8,40
изо-C ₃ H ₇	72,0	84—85	11,37	11,01	8,15	8,40
C ₄ H ₉	66,1	126—127	10,46	10,62	8,34	8,10

Метилловые эфиры β-(п-алкоксибензиламино)пропионовых кислот. Смесь 0,05 моля п-алкоксибензиламина, 4,6 г (0,05 моля) метакрилата и 30 мл абс. метанола оставлена при комнатной температуре на 25—30 час. Метанол отогнан, остаток перегнан в вакууме (табл. 3).

N¹-(п-Алкоксибензил)-5,6-дигидроурацилы. Смесь 0,02 моля метилового эфира β-(п-алкоксибензиламино)пропионовой кислоты, 6 г (0,1 моля) мочевины и 8 мл ледяной уксусной кислоты кипятится 3 часа, затем к ней постепенно прибавлялось 5 мл конц. HCl и кипячение продолжалось еще 2 часа. Смесь разбавлялась водой (1:5), образовав-

шийся после стояния осадок отфильтровывался, промывался водой и перекристаллизовывался из этианола (табл. 4).

Таблица 3

R	Выход, %	Т. кип., °С/мм	d_4^{20}	n_D^{20}	Анализ, %					
					C		H		N	
					найдено	вычислено	найдено	вычислено	найдено	вычислено
CH ₃	65,0	175—177/3	1,0940	1,5176	64,67	64,55	7,45	7,67	6,01	6,27
C ₂ H ₅	70,0	169—171/1	1,0453	1,5068	65,52	65,70	8,26	8,07	6,21	5,90
C ₃ H ₇	70,0	178—180/2	1,0408	1,5008	66,78	66,90	8,57	8,42	5,26	5,57
изо-C ₃ H ₇	83,5	185—187/3	1,0360	1,4900	67,12	66,90	8,21	8,42	5,68	5,57
C ₄ H ₉	63,7	180—182/1	1,0355	1,4997	67,63	67,89	8,58	8,73	5,45	5,27
изо-C ₄ H ₉	63,0	185—187/1	1,0292	1,5010	67,95	67,89	8,94	8,73	5,37	5,27

Таблица 4

R	X	Выход, %	Т. пл., °С	Анализ, %							
				C		H		N		S	
				найдено	вычислено	найдено	вычислено	найдено	вычислено	найдено	вычислено
CH ₃	O	65,0	139—140	61,21	61,52	6,10	6,02	12,07	11,95		
C ₂ H ₅	O	66,0	147—148	62,57	62,80	6,70	6,49	11,50	11,28		
C ₃ H ₇	O	67,5	142—143	64,00	64,12	6,82	6,92	10,50	10,68		
изо-C ₃ H ₇	O	85,5	97—98	64,34	64,12	7,20	6,82	10,21	10,68		
C ₄ H ₉	O	71,0	129—130	64,80	65,19	7,03	7,29	10,49	10,13		
изо-C ₄ H ₉	O	60,0	126—127	64,87	65,19	7,40	7,29	10,43	10,13		
CH ₃	S	30,0	176—177					11,34	11,19	13,08	12,81
C ₂ H ₅	S	40,0	174—175					10,01	10,58	12,59	12,12
C ₃ H ₇	S	34,0	171—172					10,35	10,06	11,27	11,51
изо-C ₃ H ₇	S	30,0	149—150					10,02	10,08	11,41	11,51
C ₄ H ₉	S	30,0	172—173					10,00	9,58	11,25	10,96
изо-C ₄ H ₉	S	40,6	193—194					9,69	9,58	10,52	10,96

N^1 (*p*-Алкоксибензил)-5,6-дигидротиоурацилы. Смесь 0,02 моля метилового эфира β -(*p*-алкоксибензиламино)пропионовой кислоты, 3,8 г (0,05 моля) тиоцианата аммония и 8 мл ледяной уксусной кислоты нагревалась 2 часа при 100—105°, затем к ней прикапывалось 5 мл конц. HCl и нагревание продолжалось еще 3 часа. Обработка аналогична предыдущей (табл. 4).

ՊԻՐԻՄԻԴԻՆԻ ԱՇԱՆՑՅԱԼՆԵՐ

XXXVII. N^1 -(պ-ԱԿՕՔՍԻԲԵՆԶԻԼ)-5,6-ԴԻԶԻԴՐՈՒՐԱՑԻԼՆԵՐ ԵՎ ԹԻՈՒՐԱՑԻԼՆԵՐ

Մ. Հ. ԿԱԴՐԻՎՅԱՆ և **Հ. Ա. ՀԱՐՈՅԱՆ**

Ուսումնասիրված է N^1, N^1 -ցիանէթիլ-պ-ալկօքսիբենզիլ- N^3 -բենզոլթիօրամիզանյութերի, ինչպես նաև β -(պ-ալկօքսիբենզիլամինա)պրոպիոնաթթուների մեթիլէսթերների ցիկլիզացիան համապատասխան 5,6-դիհիդրոթիոուրացիլների և ուրացիլների:

Հաստատված է, որ N^1, N^1 -ցիանէթիլ-պ-ալկօքսիբենզիլ- N^3 -բենզոլթիօրամիզանյութերի դեպքում ցիկլիզացիան չի հաջողվում իրականացնել ոչ թթվային և ոչ էլ հիմնային միջավայրում: β -(պ-ԱԿՕՔՍԻԲԵՆԶԻԼԱՄԻՆԱ)-պրոպիոնաթթուների մեթիլէսթերները տաքացնելով միզանյութի կամ ամոնիումի թիոցիանատի հետ սառցային քացախաթթվի միջավայրում սինթեզված են N^1 -(պ-ալկօքսիբենզիլ)-5,6-դիհիդրոուրացիլներ և թիոուրացիլներ:

PYRIMIDINE DERIVATIVES

N^1 -(*p*-ALKOXYBENZYL)-5,6-DIHYDROURACILES AND THIOURACILES

M. H. KALDRİKIAN and **H. A. HAROYAN**

Cyclization of N^1, N^1 -cyanethyl-*p*-alkoxybenzyl- N^3 -benzoylthiouras and methyl β -(*p*-alkoxybenzylamino)-propionates to the corresponding 5,6-dihydrothiouraciles and uraciles has been studied. In the case of N^1, N^1 -cyanethyl-*p*-alkoxybenzyl- N^3 -benzoylthiouras no cyclisation occurs. N^1 -(*p*-Alkoxybenzyl)-5,6-dihydrouraciles and thiouraciles were synthesized by heating methyl β -(*p*-alkoxybenzylamino)propionates with urea or ammonium thiocyanate in acetic acid.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. J. Lieberman, A. Kornberg, J. Biol. Chem., 207, 911 (1954).
2. C. Cooper, K. Wu, D. W. Wilson, J. Biol. Chem., 216, 37 (1955).
3. R. A. Yater, A. B. Purdee, J. Biol. Chem., 221, 743 (1956).
4. L. Crossman, D. W. Visser, J. Biol. Chem., 216, 775 (1955).

5. *M. Green, S. S. Cohen*, J. Biol. Chem., **228**, 601 (1957).
6. *M. Green, H. D. Barnerr, S. S. Cohen*, J. Biol. Chem., **228**, 621 (1957).
7. *C. Janton, D. Shugar*, Acta Biochim. Polon., **7**, 309 (1960).
8. *M. Green, S. S. Cohen*, J. Biol. Chem., **225**, 397 (1957).
9. *E. Flsher, G. Roeder*, Ber., **34**, 3751 (1901).
10. *T. B. Johnson, J. Livak*, J. Am. Chem. Soc., **58**, 299 (1936).
11. *D. J. Brown, E. Hoerge-, S. F. Mason*, J. Chem. Soc., 211 (1955).
12. *J. E. Gearlen, S. B. Binkley*, J. Org. Chem., **23**, 491 (1958); *R. C. Smith, S. B. Binkley*, J. Org. Chem., 249 (1959).
13. *C. C. Cheng, L. R. Lewis*, J. Heterocycl. Chem., **1**, 260 (1964).
14. *L. Doub, U. Krolls*, J. Heterocycl. Chem., **7**, 527 (1970).
15. *А. А. Ароян, А. Е. Есаян*, Арм. хим. ж., **21**, 409 (1968).
16. *J. C. Ambalang, T. B. Johnson*, J. Am. Chem. Soc., **61**, 632 (1939).
17. *Р. С. Балтрушис, Н. И. Мариошюс*, ХГС, 1969, 904.