УДК 542.952.53+547.551.1+547.552.1+547.553.1+547.564.4+547.538.141

СИНТЕЗ И ПРЕВРАЩЕНИЕ β,γ -НЕПРЕДЕЛЬНЫХ АМИНОВ

ХV. АЛКИЛИРОВАНИЕ АРОМАТИЧЕСКИХ АМИНОВ СТИРОЛОМ В ПРИСУТСТВИИ НАТРИЯ

Г. Т. МАРТИРОСЯН, Э. А. ГРИГОРЯН и Е. А. САРУМЯН

Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт
 полимерных продуктов, Ереван

Поступило 6 IV 1973

Показано, что алкилирование ароматических моно- и диаминов стиролом в присутствии каталитических количеств металлического натрия имеет место лишь при повышенных температурах (110—140°) и длительном нагревании (5—6 час).

Табл. 2, библиограф. ссылок 5.

В предыдущих сообщениях [1—3] нами было показано, что реакция аминирования сопряженных 1,3-диеновых углеводородов и активированных олефинов первичными и вторичными алифатическими и гетероциклическими аминами в присутствии натрия протекает в мягких условиях, приводя к соответствующим алкилированным аминам с высокими выходами. При этом было показано, что ароматические амины в изученных условиях в эту реакцию не вступают.

Нахождение условий, позволяющих осуществить алкилирование ароматических аминов, представило бы практический интерес ввиду применимости вторичных жирноароматических аминов в качестве стабилизаторов для полимерных материалов [4]. Нами показано, что для алкилирования ароматических моно- и диаминов стиролом в присутствии каталитических количеств натрия необходимо 5—6-часовое нагревание реакционной смеси при 110—140°. В результате, в отличие от алифатических первичных аминов [5], во всех случаях изученных условий происходит алкилирование только за счет одного атома водорода (табл. 1,2).

Выходы полученных аминов в значительной степени зависят от условий проведения реакций. Так, при более высокой температуре и длительном нагревании выходы увеличиваются (табл. 1, оп. 2,3,5,6,13). К такому же результату приводит и прикапывание стирола к предварительно нагретой смеси ароматического амина и натрия (оп. 7,8,11,16).

Таблица 1

Алкилирование ароматических аминов стиролом в присутствии натрия

№ опыта	Исходный амин	Соотношение амина к стиролу, моли	Темп. реакции, °С	Время взаимодействия, часы	Продукты реакции	Выход, %
1	Анилин	1:1	130	3	N-(β-фенилэтил)анилин	28,3
2	"	1:2	120—125	6	"	42,3
3	"	1:2	125—140	6	"	59,8
4	л-Толуидин	1:1	115—130	5	N-(β-фенилэтил)л-толуидин	36,9
5	"	1:1,4	130—135	5	"	60,0
6	"	1:1,4	130—135	7	"	63,3
7*	"	1:1,4	120—130	3	"	78,0
8*	"	1:1,4	120—130	6	"	88,6
9	о-Толуидин	1:1,4	125—140	6	N-(β-фенилэтил)-о-толуидин	38,5
10	м-Толуидин	1:1,2	115—120	3	N-(β-фенилэтил)-м-толуидин	15,0
11*	"	1:1,3	120—130	5	"	40,0
12**	о-Фенилендиамин	1:1	120—130	5	N-(β-фенилэтил)-о-фенилендиамин	58,1
					N,N'-(ди-β-фенилэтил)-о-фенилендиамин	4,4
13	"	1:2	120—130	10	"	43,1
					"	12,1
14	м-Толуилендиамин	1:2	120—130	6	N-(β-фенилэтил)-м-толуилендиамин	60,0
15	л-Аназидин	1:1,4	120—125	4	N-(β-фенилэтил)-л-аназидин	58,8
16*	"	1:1,4	120—130	5	"	74,8

* Реакция проведена прикапыванием стирола к амину.

** Продукты кристаллизуются.

Отдельными опытами показано, что N-этиланилин и полученные нами жирноароматические вторичные амины далее не подвергаются алкилированию стиролом. Эти данные позволяют предположить, что полученные с небольшими выходами при алкилировании ароматических диаминов продукты диалкилирования являются симметричными дувторичными аминами:

Общее описание алкилирования ароматических аминов

А. Смесь 0,5 моля амина, 0,6—1 моля стирола и 0,2 г мелко нарезанного натрия при перемешивании нагревается до 115—140° 5—6 час. По-

R	R'	R''	Т. кип., °C/мм	n_D^{20}
H	H	H	173—175/6	1,5998
H	H	CH ₃	141—143/1*	1,5877
CH ₃	H	H	134—135/1	1,5889
H	CH ₃	H	143—150/1	1,5873
NH ₂	H	H	178—179/1**	—
C ₆ H ₅ (CH ₂) ₂ NH	H	H	232—235/2***	—
H	NH ₂	CH ₃	200—201/1	1,6202
H	H	OCH ₃	185—186/3	1,5930

* Т. пл. 29—30°. ** Т. пл. 45°. *** Т. пл. 65°.

Таблица 2

d_4^{20}	Молекулярная формула	А н а л и з, %						Т. пл. гид-рохлоридов, °С	R_f
		н а й д е н о			в ы ч и с л е н о				
		С	Н	Н	С	Н	Н		
1,0517	$\text{C}_{14}\text{H}_{15}\text{N}$	85,50	7,31	7,40	85,28	7,60	7,10	119	0,84
1,0270	$\text{C}_{15}\text{H}_{17}\text{N}$	86,30	8,41	6,50	85,30	8,06	6,64	145	0,85
1,0301	$\text{C}_{15}\text{H}_{17}\text{N}$	86,42	8,17	6,36	85,30	8,06	6,64	142	0,88
1,027	$\text{C}_{15}\text{H}_{17}\text{N}$	85,54	8,12	7,26	85,30	8,06	6,64	105	0,81
—	$\text{C}_{14}\text{H}_{16}\text{N}_2$	78,53	7,92	13,20	79,20	7,55	13,20	—	0,89
—	$\text{C}_{22}\text{H}_{24}\text{N}_2$	83,37	7,81	7,58	83,50	7,5	8,80	—	0,93
1,1027	$\text{C}_{18}\text{H}_{18}\text{N}_2$	79,80	8,40	12,20	79,60	7,96	12,39	—	0,87
1,0837	$\text{C}_{15}\text{H}_{17}\text{ON}$	79,10	8,60	6,10	79,29	7,4	6,16	134	0,67

лученные продукты отделяются отгонкой (табл. 2). Индивидуальность алкилированных аминов доказана ТСХ на незакрепленном слое окиси алюминия (д/х) смесью эфир: бензол, 1:2 (проявитель—металлический йод).

Б. Аналогично А, с той лишь разницей, что стирол прикапывается к нагретой до 115—140° и перемешиваемой в течение 1—1,5 часа смеси амина и натрия.

β, γ-ՉԱԳԵՑԱՄ ԱՄԻՆՆԵՐԻ ՍԻՆԹԵԶ ԵՎ ՓՈՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

XV. ԱՄԻՆՈՒ ԱՄԻՆԱՎՈՐՈՒՄ ԱՐՈՄԱՏԻԿ ԱՄԻՆՆԵՐՈՎ, ՆԱՏՐՈՒՄԻ ՆԵՐՎԱՅՈՒԹՅԱՄԲ

Գ. Ք. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ, Է. Ա. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ և Ե. Ա. ՍԱՐՈՒՄՅԱՆ

Ցույց է տրված, որ մետաղական նատրիումի ներկայությամբ արոմատիկ մոնո- և դիամինների ալկիլումը ստիրոլով իրականացվում է բարձր ջերմաստիճանում (110—140°), երկարատև (5—6 ժամ) տաքացմամբ: Բարձր ելքերով ստացվում են միայն համապատասխան երկրորդային ալիֆատիկ արոմատիկ ամիններ: Արոմատիկ առաջնային ամիններում, ի տարբերություն ալիֆատիկ ամինների, ամինալորումն ընթանում է միայն առաջնային ամինախմբի ջրածնի ատոմներից մեկի հաշվին: Արդյունքները բերված են 1 և 2 աղյուսակներում:

THE SYNTHESIS AND TRANSFORMATION OF β, γ-UNSATURATED AMINES

XV. AMINATION OF STYRENE BY AROMATIC AMINES IN THE
PRESENCE OF METALLIC SODIUM

G. T. MARTIROSIAN, E. A. GRIGORIAN and E. A. SAROUMIAN

It has been shown, that the amination of styrene by aromatic mono- and diamines in the presence of metallic sodium to his place at high temperatures (110—140°) and by prolonged heating (5—6 hrs).

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Г. Т. Мартиросян, Э. А. Григорян, Изв. АН Арм. ССР, ХН, 10, 31 (1963).
2. Г. Т. Мартиросян, Э. А. Григорян, А. Т. Бабалян, Изв. АН Арм. ССР, ХН, 17, 517 (1964).
3. Г. Т. Мартиросян, Э. А. Григорян, А. Т. Бабалян, Арм. хим. ж., 20, 420 (1967).
4. Авт. свид. СССР, 15031, 150522, 150523 (1962).
5. Г. Т. Мартиросян, А. Ц. Казарян, Э. А. Григорян, А. Т. Бабалян, ЖОрХ, 6, 446 (1970).