ПРОИЗВОДНЫЕ ИНДОЛА

LIИ. УСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТИЛЬНОЙ ГРУППЫ В КОЛЬЦЕ E
 2(3)-МЕТИЛ-5-ОКСО-1,4,4a,5,7,8,13b,13c-ОКТАГИДРО-
 13Н-БЕНЗ(g)ИНДОЛО(2,3-a)ИНДОЛИЗИНА

С. А. ПОГОСЯН, А. Г. ТЕРЗЯН и Г. Т. ТАТЕВОСЯН

Институт тонкой органической химии им. А. Л. Миджояна
 АН Армянской ССР, Ереван

Поступило 7 IV 1975

Установлено положение метильной группы в кольце E 2(3)-метил-5-оксо-1,4,4a,5,7,8,13b,13c-октагидро-13Н-бенз(g)индоло(2,3-a)индолизина.

Библ. ссылки 5.

Ранее был описан синтез 2(3)-метил-5-оксо-1,4,4a,5,7,8,13b,13c-октагидро-13Н-бенз(g)индоло(2,3-a)индолизина I, в котором положение метильной группы в кольце E не было установлено [1].

Для установления положения метильного заместителя в соединении I нами осуществлен синтез этого вещества по способу Вавzoneка и Нордстрема [2]. Эти авторы синтезировали 5-оксо-бенз(g)индолоиндолизины кипячением водно-спиртового раствора триптамина с замещенными фталальдегидами.

Для решения поставленной задачи необходимо было иметь в качестве одного из исходного компонентов кислоту V, способ получения которой разработан нами.

Взаимодействием ангидрида *цис*-4-метил- Δ^4 -циклогексен-1,2-дикарбоновой кислоты с безводным метиловым спиртом получен стерически однородный (по ГЖХ) монометиловый эфир III, который далее восстановлением по Розенмунду [3] переведен в альдегидэфир IV. Конденсацией триптамина с альдегидокислотой V, полученной гидролизом соответствующего альдегидоэфира IV, по Вавзонеку был получен лактам I, идентичный лактаму, полученному циклизацией оксимидина [1]. Идентичность обоих образцов установлена сравнением их ИК спектров, а также отсутствием депрессии точки плавления смешанной пробы.

Таким образом, положение метильной группы при двойной связи в кольце E лактама I совпадает с положением метильной группы в альдегидоэфире IV. Следовательно, после установления положения метильной группы в альдегидокислоте V можно сделать заключение относительно расположения метильного заместителя в пентациклическом лактаме I. Для этой цели альдегидэфир IV восстановлен по Кижнеру [4] в диметил- Δ^4 -циклогексен-1-карбоновую кислоту VI. Дегидрогенизация и одновременное декарбоксилирование кислоты VI над палладием на угле при 300—330° по прописи [5] привели к образованию ксилола, который без выделения окислен перманганатом калия в дикислоту VII. Ввиду высокой температуры плавления этой кислоты она была идентифицирована в виде диметилового эфира VIII.

Так как температура плавления полученного диметилового эфира VIII соответствует температуре плавления диметилового эфира изофталевой кислоты и смешанная проба не дает депрессии, можно с уверенностью сказать, что метильная группа в альдегидоэфире IV находится в положении 4, а в лактаме—2.

Предварительное фармакологическое изучение I выполнено под руководством Р. С. Сафразбекян и Э. В. Власенко. Этот препарат существенных изменений на температуру и поведение животных не оказывал, обнаружена его низкая анальгетическая активность.

Экспериментальная часть

цис-2-Карбметокси-4-метил- Δ^4 -циклогексен-1-карбоновая кислота (III). Смесь 23,6 г (0,16 моля) ангидрида *цис-4-метил- Δ^4 -циклогексен-1,2-дикарбоновой кислоты* и 14 мл абс. метанола нагревалась на водяной бане 24 часа. После удаления метанола к остатку дважды прибавлялся бензол по 50 мл и отгонялся под уменьшенным давлением. Оставшееся после отгонки бензола масло перегнано в вакууме при 166—170°/3 мм. Получено 3 г (73%) густого масла. При растирании с петролейным эфиром масло закристаллизовывалось в виде бесцветных блестящих чешуек, плавящихся при 67—69°. Найдено %: С 60,08; Н 7,48. $C_{10}H_{14}O_4$. Вычислено %: С 60,59; Н 7,12.

Хлорангидрид цис-2-карбметокси-4-метил- Δ^4 -циклогексен-1-карбоновой кислоты. Смесь 20,5 г (0,1 моля) 2-карбметокси- Δ^4 -циклогексен-1-карбоновой кислоты и 50 мл хлористого тионила нагревалась на водяной бане в течение часа. Избыток хлористого тионила удалялся при уменьшенном давлении. Для удаления следов хлористого тионила дважды прибавлялось по 40 мл бензола и вновь отгонялось при тех же условиях. Хлорангидрид перегонялся в вакууме при 153—156°/3 мм. Выход 19,5 г (90%).

Метилловый эфир 2-формил-4-метил- Δ^4 -циклогексен-1-карбоновой кислоты (IV). Смесь 80 мл сухого ксилола и 40 мг сернистого хинолина нагревалась в медленном токе водорода до кипения ксилола. Имеющаяся в смеси влага отгонялась вместе с частью ксилола. Затем прибавлялось 2 г 5% палладия на сульфате бария и снова отгонялась часть ксилола. После прибавления 21,7 г (0,1 моля) хлорангидрида *цис-2-карбметокси-4-метил- Δ^4 -циклогексен-1-карбоновой кислоты* реакционная смесь перемешивалась в струе водорода при 170—180° до прекращения выделения хлористого водорода (5 час.). Катализатор отфильтровывался, растворитель отгонялся при уменьшенном давлении. Оставшееся после удаления растворителя прозрачное масло перегонялось в вакууме при 126—127°/3 мм. Получено 12 г (61%) вязкого бесцветного вещества, n_D^{20} 1,4830, d_4^{20} 1,0736, M_{R_2} 48,26, выч. 47,37. ИК спектр, cm^{-1} : 1725 (C=O), 1030 (эф. C—O), 1630 (C=C). Найдено %: С 65,65; Н 7,19. $C_{10}O_{14}O_3$. Вычислено %: С 65,89; Н 7,37. Семикарбазон, т. пл. 155—158° (из спирта). Найдено %: С 55,21; Н 7,16; N 17,56. $C_{11}H_{18}N_3O_3$. Вычислено %: С 54,98; Н 7,55; N 17,48.

2-Формил-4-метил- Δ^4 -циклогексен-1-карбоновая кислота (V). Смесь 5 г (0,027 моля) метилового эфира 2-формил-4-метил- Δ^4 -циклогексен-1-карбоновой кислоты IV и 25 мл соляной кислоты кипятилась 12 час. При

концентрировании раствора при уменьшенном давлении выпало 3,6 г (80%) кристаллов с т. пл. 78° (из эфира). Найдено %: С 63,79; Н 76,10. $C_{10}H_{12}O_3$. Вычислено %: С 64,27; Н 7,19. Семикарбазон, т. пл. 219—222° (из спирта). Найдено %: С 52,85; Н 6,20; N 18,20. $C_{10}H_{15}O_2N_3$. Вычислено %: С 53,08; Н 6,66; N 18,66.

5-Оксо-2-метил-1,4,4а,7,8,13b,13с-октагидро-13Н-бенз(г)индоло(2,3-а) индолизин (I). Смесь 3 г (0,018 моля) 2-формил-4-метил- Δ^4 -циклогексен-1-карбоновой кислоты и 2,8 г (0,018 моля) триптамина в 180 мл 50% этанола, содержащая 18 мл 2 н соляной кислоты, нагревалась 40 час. на водяной бане. Часть выпавшего продукта выделялась из горячего раствора, часть—после удаления половины фильтрата. Общий выход 1,6 г (26%), т. пл. 210—212° (из спирта), не дает депрессии с описанным ранее [1] образцом лактама I. ИК спектр (ваз. масло), cm^{-1} : 1595 (C=C), 1680 (C=O) и 3350 (NH).

2,4-Диметил- Δ^4 -циклогексен-1-карбоновая кислота (VI). Смесь 100 мл диэтиленгликоля и 4 г (0,06 моля) едкого кали осторожно нагревалась до растворения последнего. Раствор охлаждался до 80—100°. К содержимому колбы прибавлялось 3,65 г (0,02 моля) метилового эфира 2-формил-4-метил- Δ^4 -циклогексен-1-карбоновой кислоты и 3 мл 85% гидразин-гидрата. Смесь осторожно нагревалась до полного завершения экзотермической реакции и еще один час. Затем жидкость медленно отгонялась до достижения 205°. После прекращения перегонки смесь нагревалась с обратным холодильником еще 3 часа, охлаждалась и выливалась в колбу, содержащую 100 мл воды. Разбавленная смесь подкислялась и охлаждалась. Выпавший осадок отфильтровывался, а водный слой экстрагировался бензолом. Осадок растворялся в бензоле, бензольный раствор высушивался над безводным сернокислым натрием. После отгонки растворителя остаток перекристаллизовывался из ацетона. Получено 1,4 г (40%) вещества, плавящегося при 87°. ИК спектр ($CHCl_3$), cm^{-1} : 1625 (C=C) и 1715 (C=O). Найдено %: С 70,54; Н 8,89. $C_{13}H_{14}O_2$. Вычислено %: С 70,98; Н 9,15.

Диметиловый эфир изофталевой кислоты (VIII). Смесь 1,6 г (0,01 моля) VI и 0,5 г 10% палладия на угле в 30 мл ацетона нагревалась в пробирочном автоклаве при 300° 14 час. Продукты реакции отделялись от катализатора, ацетон отгонялся, остаток обрабатывался 40% раствором едкого кали. Нерастворившийся слой экстрагировался эфиром. Эфирная вытяжка промывалась водой, высушивалась, эфир отгонялся, остаток кипятился с 3 г перманганата калия в 100 мл воды 30 час. После удаления двуокиси марганца и подкисления выпали кристаллы (0,25 г, плавящиеся выше 300°), из которых нагреванием в 3 мл метилового спирта в присутствии 0,13 мл серной кислоты в течение 16 час. был получен диметиловый эфир с т. пл. 65°. С образцом метилового эфира изофталевой кислоты вещество не дало депрессии точки плавления.

ԻՆԴՈԼԻ ԱԾԱՆՑՅԱԼՆԵՐ

LIII. ՄԵԹԻԼ ԽՄՐԻ ՏԵՂԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 2(3)-ՄԵԹԻԼ-5-ՕՔՍՈ-1,4,4a,5,7,8,13b,13c-ՕԿՏԱԶԻԴՐՈ-13H-ԲԵՆԶ(g) ԻՆԴՈԼՈ(2,3-a) ԻՆԴՈԼԻԶԻՆԻ E ՕՂԱԿՈՒՄ

Ս. Ն. ՊՈԳՈՍՅԱՆ, Ա. Գ. ԹԵՐԶՅԱՆ և Գ. Տ. ԹԱԿԵՎՈՍՅԱՆ

Ապացուցված է, որ 2(3)-մեթիլ-5-օքսո-1,4,4a,5,7,8,13b,13c-օկտահիդրո-13H-բենզ(g)ինդոլո(2,3-a)ինդոլիզինում մեթիլ խումբը գտնվում է 2 դիրքում:

INDOLE DERIVATIVES

LIII. DETERMINATION OF POSITION OF THE METHYL GROUP IN RING E OF 2(3)-METHYL-5-OXO-1,4,4a,5,7,8,13b,13c-OCTAHYDRO-13H-BENZ(g)INDOLO(2,3-a)INDOLIZINE

S. H. POGHOSSIAN, A. G. TERZIAN and G. T. TATEVOSSIAN

It has been demonstrated that the methyl group in ring E of the compound 2(3)-methyl-5-oxo-1,4,4a,5,7,8,13b,13c-octahydro-13H-benz(g)-indolo(2,3-a)indolizine is situated at the 2-position.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. С. А. Погосян, А. Г. Терзян, А. Б. Исраелян, Г. Т. Татевосян, Арм. хим. ж., 27, 597 (1974).
2. S. Wawzonek, I. D. Nordstrom, J. Med. Chem., 8, 265 (1965).
3. Rosenmund, Ber., 51, 583 (1918).
4. Л. Әбрхам, Д. Мак-Леод, Дж. Кэйзон, Синтезы орг. препаратов, сб. 10, стр. 62.
5. Ф. А. Мартиросян, Р. М. Испирян, В. О. Бабаян, Арм. хим. ж., 24, 697 (1971).