КИНЕТИКА ТЕРМИЧЕСКОГО ОКИСЛЕНИЯ
 ПРОПИОНОВОГО АЛЬДЕГИДА. I

Э. А. ОГАНЕСЯН, Г. А. САЧЯН и А. Б. НАЛБАНДЯН

Институт химической физики АН Армянской ССР, Ереван

Поступило 10 VI 1975

Изучена реакция термического окисления пропионового альдегида в реакторе, оборудованном борной кислотой, в интервале 259—358°. В продуктах обнаружены перекиси типа RCO_3H и RO_2H , зарегистрированы спектры ЭПР перекисных радикалов. Предполагается, что образование основных продуктов обусловлено распадом радикалов RO_2 и RCO_3 .

Рис. 4, библиографические ссылки 5.

Ранее при исследовании кинетики окисления пропионового альдегида [1,2] было сделано заключение, что кинетические закономерности аналогичны полученным при окислении ацетальдегида. Эксперименты проводились в статических условиях в пирексовых реакторах. Основным продуктом окисления $\text{C}_2\text{H}_5\text{CHO}$ при температурах ниже 155°C была надпропионовая кислота, а при $t > 200^\circ$ наряду с ней в значительных количествах наблюдалось образование низкомолекулярных веществ. Было показано, что процесс протекает автокаталитически и сделано предположение [2], что разветвление цепи происходит в результате взаимодействия альдегида с перекисью, вероятно, с образованием комплекса. Авторы работ [1—3] для эффективной энергии активации в области независимости реакции от концентрации кислорода получили величину $E_{эф} = 15$ ккал/моль. Скорость реакции оказалась пропорциональной квадрату концентрации альдегида.

Для объяснения экспериментальных данных использовался механизм, применяемый при окислении CH_3CHO .

В предложенном механизме [2] большое внимание уделяется радикалам RCO_3 и перекиси RCO_3H . Для обнаружения радикалов и изучения закономерностей их накопления вместе с закономерностями расходования и накопления промежуточных и конечных продуктов реакции в настоящей работе применен кинетический метод вымораживания радикалов в сочетании с ЭПР [4].

Окисление пропионового альдегида проводилось в струевых условиях в пирексовом реакторе ($d=2,7$ см, $l=30$ см), обработанном борной кислотой. Окислению подвергалась смесь, содержащая 2,2% $\text{C}_2\text{H}_5\text{CHO}$ и 97,8% воздуха при атмосферном давлении в интервале 259—358°C.

Анализ на $\text{C}_2\text{H}_5\text{CHO}$, CH_3CHO , CH_2OH , $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, $(\text{CH}_3)_2\text{CO}$ проводился хроматографически по способу, описанному в работе [5], CO —на линде 5 Å, CO_2 —на полисорбе-1. Перекиси определялись иодометрически, надкислоты—в солянокислой среде при непосредственном титровании 0,01 н $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$, суммарная перекись—в сернокислой среде через 12 час., H_2O_2 —на ФЭК с применением титанового реактива. Следует отметить, что в условиях данных опытов в продуктах окисления $\text{C}_2\text{H}_5\text{CHO}$ нами был обнаружен ацетон, кинетическая кривая накопления которого не приводится из-за плохого разделения его от $\text{C}_2\text{H}_5\text{CHO}$ на колонке хроматографа. Наблюдалось также образование продукта, который, видимо, является эфиром.

В работе [3] в продуктах окисления пропионового альдегида была обнаружена $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$, образование которой, вероятно, может происходить как в реакционной зоне, так и в результате распада перекисей при отборе пробы. В условиях данных опытов хроматографический анализ продуктов реакции показал, что в случае, когда коммуникации после реактора обогревались при температуре ниже 80° и не обрабатывались борной кислотой, в продуктах оказались CH_3COOH и $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$. При повышении температуры до 100° и обработке борной кислотой карбоновые кислоты не обнаруживались. Это указывает на то, что эти кислоты образовывались не в реакционной зоне, а в коммуникациях.

На рис. 1 приведены кинетические кривые расходования $\text{C}_2\text{H}_5\text{CHO}$ и накопления RCO_3H , RO_2H , CH_3CHO , $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, CO , CO_2 , полученные при 291°. В ходе опытов удалось зарегистрировать спектр ЭПР радикалов перекисного типа, представленный на рис. 2. Однако, поскольку в продуктах реакции обнаружены в соизмеримых количествах перекиси типа RCO_3H и RO_2H , образование которых, видимо, связано с реакциями

то записанный нами спектр ЭПР, очевидно, представляет собой наложение спектров перекисных радикалов типа RO_2 , RCO_3 . Максимальная концентрация радикалов достигает 10^{13} част/см³.

Из рис. 1 видно, что процесс протекает автокаталитически с периодом индукции—0,5 мин. В предыдущих работах по окислению C_2H_5CHO из перекисных соединений были обнаружены только надпропионовая кислота и следы H_2O_2 , в то время как в условиях наших экспериментов образуются также органические гидроперекиси, по-видимому, в основном типа RO_2H . Согласно механизму, предложенному в работе [2], не исключено также образование перекиси дигропила, в результате рекомбинации радикалов. Но так как в наших опытах не установлена прямая зависимость скорости накопления органической перекиси от квадрата концентрации радикалов, то она может оказаться в продуктах реакции только в незначительных количествах.

Рис. 1. Кинетические кривые расходования C_2H_5CHO (1) и накопления перекисных радикалов (2), RCO_3H (3), RO_2H (4), CO (5), CO_2 (6), CH_3CHO (7), C_2H_5OH (8) для смеси 2,2% C_2H_5CHO и 97,8% воздуха при $t=291^\circ C$.

Рис. 2. Спектр ЭПР перекисных радикалов при $T=77^\circ K$.

Из рис. 1 видно, что кинетические кривые накопления радикалов и перекисей RCO_3H , RO_2H отличаются друг от друга. Максимальная концентрация перекисных радикалов соответствует максимальной скорости расходования C_2H_5CHO . Что касается RCO_3H , то она является промежуточным продуктом. Она достигает максимальной концентрации при больших τ_k , чем перекисные радикалы. RO_2H образуется при меньших τ_k и наблюдается только ее накопление. По абсолютному значению концентрации RO_2H превышают $[RCO_3H]$.

Максимальная скорость накопления CH_3CHO в пределах ошибок эксперимента соответствует максимальной концентрации радикалов. При дальнейшем уменьшении концентрации радикалов концентрация CH_3CHO несколько увеличивается.

Кинетические кривые накопления CO , CO_2 отличаются от кинетической кривой накопления CH_3CHO . Максимальные скорости накопления окиси и двуокиси углерода соответствуют максимальной концентрации радикалов, однако CO и CO_2 продолжают накапливаться и тогда, когда концентрация радикалов падает. Образование CO и CO_2 , по-видимому, происходит в основном при распаде радикалов RCO , RCO_2 , соответственно. Источником CO_2 может быть также распад RCO_2H .

Кинетика окисления $\text{C}_2\text{H}_5\text{CHO}$ была изучена также при 259, 325, 358°. Для примера на рис. 3 приведены кинетические кривые расходования $\text{C}_2\text{H}_5\text{CHO}$ и накопления продуктов при 325°.

Рис. 3. Кинетические кривые расходования $\text{C}_2\text{H}_5\text{CHO}$ (1) и накопления перекисных радикалов (2), RCO_2H (3), RO_2H (4), CO (5), CO_2 (6), CH_3CHO (7), CH_3OH (8), $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ (9) для смеси 2,2% $\text{C}_2\text{H}_5\text{CHO}$ и 97,8% воздуха при $t = 325^\circ\text{C}$.

Из кинетических кривых следует, что при повышении температуры период индукции уменьшается. При всех температурах надпропионовая кислота достигает своей максимальной концентрации позже, чем перекисные радикалы. При повышении температуры их максимумы сближаются и сдвигаются к меньшим τ_k . Концентрация RCO_2H по абсолютной величине уменьшается. Кривая накопления RO_2H при 325 и 358° проходит через максимум. Своей максимальной концентрации она достигает при τ_k больших, чем τ_k максимальных концентраций радикалов и перекиси RCO_2H . При 358° время достижения максимальных концентраций RCO_2H и RO_2H примерно одно и то же. С повышением температуры максимальная концентрация RO_2H уменьшается. При всех изученных температурах концентрация RO_2H больше, чем концентрация RCO_2H . С повышением температуры это различие становится более заметным. Из полученных данных можно сделать заключение, что в согласии с литературными данными RO_2H является более устойчивой перекисью, чем RCO_2H .

При 325° в продуктах обнаруживаются также CH_3OH , C_2H_4 , концентрации которых с повышением температуры растут.

Из зависимости скорости расходования $\text{C}_2\text{H}_5\text{CHO}$ от температуры оценена эффективная энергия активации—19,1 ккал/моль.

В настоящей работе изучено также влияние концентрации пропилового альдегида на процесс его окисления. Опыты проводились со смесью, содержащей 1,2 и 4% $\text{C}_2\text{H}_5\text{CHO}$ при 291°.

Рис. 4. Кинетические кривые расходования $\text{C}_2\text{H}_5\text{CHO}$ (1) и накопления перекисных радикалов (2), RCO_2H (3), RO_2H (4), CO (5), CO_2 (6), CH_3CHO (7), CH_3OH (8), $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ (9) для смеси 4% $\text{C}_2\text{H}_5\text{CHO}$ и 96% воздуха при $t = 291^\circ\text{C}$.

На рис. 4 приведены кинетические кривые расходования $\text{C}_2\text{H}_5\text{CHO}$ и накопления продуктов при содержании в смеси 4% $\text{C}_2\text{H}_5\text{CHO}$ и 96% воздуха. Из рис. 4. видно, что с повышением концентрации альдегида RCO_2H достигает своей максимальной концентрации при меньших τ_k .

Абсолютные концентрации перекисных радикалов и RCO_2H увеличиваются, в то время как изменение концентрации исходного альдегида почти не влияет на концентрацию RO_2H .

Уже при 291° с повышением концентрации альдегида наблюдается образование CH_3OH , C_2H_4 .

Из зависимости максимальной скорости расходования $\text{C}_2\text{H}_5\text{CHO}$ от исходной концентрации альдегида был определен порядок реакции по альдегиду—1,6.

Из описанных выше данных следует, что многообразие продуктов и радикалов может быть связано как с гомогенными, так и с гетерогенными реакциями

ՊՐՈՊԻՈՆԱԼԴԵՆԻՏԻ ԹԵՐՄԻԿ ՕՔՍԻԴԱՑՄԱՆ ԿԻՆԵՏԻԿԱ. I

Է. Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ, Գ. Ա. ՍԱՉՅԱՆ և Ա. Բ. ՆԱԼԲԱՆԴԻԱՆ

Ուսումնասիրված է պրոպիոնալդեհիդի թերմիկ օքսիդացման ռեակցիան բորաթթվով մշակած անոթում $259-358^{\circ}$ -ում: Պրոդուկտներում հայտնաբերվել են RCO_3H և RO_2H տիպի պերօքսիդներ: Գրանցվել է պերօքսիդային ռադիկալների էՊՆ ազդանշանը: Ծնթադրվում է, որ պրոդուկտների մեծ մասը առաջացումը կապված է RCO_3 և RO_2 ռադիկալների քայքայման հետ:

THE KINETICS OF PROPIONALDEHYDE OXIDATION. I

E. A. HOVHANISSIAN, G. A. SACHIAN and A. B. NALBANDIAN

Thermal oxidation of propionaldehyde in a reaction vessel, coated by boric acid has been studied by EPR method.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. E. W. R. Steacie, W. H. Hatcher, S. Rosenberg, J. Phys. Chem., **38**, 1189 (1934).
2. A. Combe, M. Niclaude, M. Letort, Rev. Inst. Fer. Petrole, **10**, 786 (1955).
3. G. Skirrow, B. P. Whit, Combustion and Flame, **1968**, 269—277.
4. Կ. Գարիբյան, Գ. Լ. Գրիգորյան, Ա. Ա. Մանտաշյան, Ա. Բ. Նալբանդյան, ԴԱՆ ՍՍՍՐ, **176**, 866 (1967); Կ. Գարիբյան, Ա. Ա. Մանտաշյան, Ա. Բ. Նալբանդյան, ԴԱՆ ՍՍՍՐ, **186**, 5 (1969); Գ. Ա. Սաչյան, Ի. Կ. Տախնազարյան, Ա. Բ. Նալբանդյան, ԴԱՆ ՍՍՍՐ, **185**, 647 (1969); Գ. Ա. Սաչյան, Ի. Կ. Տախնազարյան, Ա. Բ. Նալբանդյան; Արմ. քիմ. ժ., **22**, 371 (1969).
5. Բ. Վ. Սարգսյան, Բ. Կ. Սարգսյան, ԶԱԽ, **29**, 604 (1974).