УДК 542.921+547.33'34+547.435

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ АМИНОВ И АММОНИЕВЫХ
 СОЕДИНЕНИЙ

СХХІ. СИНТЕЗ ЭФИРОВ 2-ДИАЛКИЛАМИНО-2,4-ПЕНТАДИЕНОВЫХ КИСЛОТ

С. Т. КОЧАРЯН, С. М. ОГАНДЖАНЯН и А. Т. БАБАЯН

Институт органической химии АН Армянской ССР, Ереван

Поступило 11 XII 1975

Стивенсовской перегруппировкой аммониевых солей, содержащих наряду с карбалкоксиметильной группы пропаргильного или потенциально пропаргильного типа, синтезрован ряд эфиров замещенных 2-диалкиламино-2,4-пентадиеновых кислот. Гидролизом последних получены соответствующие эфиры 3-замещенной 3-этилиденпировиноградной кислоты.

Табл. 3, библиограф. ссылки 3.

Нами была изучена стивенсовская перегруппировка аммониевых солей, содержащих наряду с карбалкоксиметильной группы аллильного или бензильного типа [1—2]. В кратком сообщении [3] докладывалось, что в качестве β,γ-непредельных можно использовать также группы пропаргильного типа.

Настоящая работа посвящена синтезу эфиров 2-диалкиламино-2,4-пентадиеновых кислот, осуществляемому стивенсовской перегруппировкой аммониевых солей, содержащих наряду с карбалкоксиметильной группы пропаргильного или потенциально пропаргильного типа. Результаты перегруппировки солей I—X приведены в табл. 1. Как и следовало ожидать, во всех случаях карбалкоксиметильная группа участвует в перегруппировке в качестве принимающей.

Результаты стивенсовской

Соединение	Исходная соль				Т. пл., °C	$\begin{array}{c} R_2NC= \\ \\ CCH=CH_2 \\ \\ COOR' \end{array}$	Выход, %	Т. кип., °C/мм
	R ₁	X	R'	hl				
I	(CH ₃) ₂	C≡CH	CH ₃	Br	127–128	H (Ia)*	73	67–71, 10
II	.	C≡CCH ₃	.	Cl	132–133	CH ₃ (IIa)	83	77–79, 10
III	.	$\begin{array}{c} Cl \\ \\ CH=CCH_3 \end{array}$	.	Cl	148–149	. (IIa)	87	80–81, 11
IV	.	C≡CCH ₃	C ₂ H ₅	Cl	117–119	. (IIIa)	91	82–83, 7
V	.	$\begin{array}{c} Cl \\ \\ CH=CCH_3 \end{array}$	.	Cl	123–125	. (IIIa)	89	69–70, 3
VI	(C ₂ H ₅) ₂	C≡CCH ₃	.	Br	112–113	. (IVa)	80	84–86, 5
VII	.	$\begin{array}{c} Cl \\ \\ CH=CCH_3 \end{array}$	.	Br	65–66	. (IVa)	70	74–76, 3
VIII	(CH ₃) ₂	.	CH ₃	Cl	149–150	. (Va)	80	90–92, 3
IX	(CH ₃) ₂	C≡CCH=CH ₂	.	Cl	108–110	CH=CH ₂ (VIa)	70	83–85, 8
X	.	C≡CC ₆ H ₅	.	Cl	120–122	[C ₆ H ₅ (VIIa)] полимер	90	—

* Находится в смеси с (CH₃)₂NCHCH₂C≡CH (Iб)

Как видно из схемы, при перегруппировке солей реакция не останавливается на стадии образования соединения с алленовой группировкой, а благодаря протонной подвижности α-водородного атома приводит к образованию изомерного продукта с сопряженными двойными связями. Миграция β,γ-непредельной группы сопровождается аллильной изомеризацией. В случае соли I получают два изомерных соединения, содержащих концевую этинильную (Iб) и сопряженную диеновую (Iа) группы.

Таблица Г

п-регруппировки солей I—X

n _D ²⁰	Найдено, %			Вычислено, %			ИК спектр, см ⁻¹	2,4-Динитрофенил- гидразон, т. пл., °С
	С	Н	Ν	С	Н	Ν		
1,4915	61,95	8,49	9,37	61,93	8,39	9,03	3330, 3100, 2135, 1735 1625, 1590	—
1,4981	63,95	9,10	7,90	63,90	8,87	8,28	3090, 1730, 1620, 1585	148—149
1,4380	63,94	9,07	7,90	—	—	—	3087, 1730, 1620, 1583	148—149
1,4920	65,46	9,39	7,60	65,54	9,29	7,65	3095, 1725, 1630, 1585	126—128
1,4923	65,47	9,36	7,53	—	—	—	3095, 1725, 1630, 1583	126—128
1,4800	68,26	10,05	6,87	63,25	9,95	6,63	3080, 1720, 1625, 1582	126—128
1,4900	68,26	10,08	6,85	—	—	—	3086, 1720, 1620, 1583	126—128
1,5170	68,45	9,23	6,97	63,85	9,04	6,70	3096, 1718, 1624, 1593	148—149
1,5275	66,10	7,92	8,20	66,29	8,28	7,73	3090, 1715, 1605, 1575	129—130
—	72,21	6,54	7,00	72,72	7,31	6,05	—	—

По-видимому, образование Iб в условиях реакции обусловлено ацетилен-ацетиленидным равновесием.

Образование продукта Ia может происходить либо за счет протонной изомеризации Iб, либо в результате 3,2-перегруппировки соли I.

Контрольным опытом показано, что в условиях перегруппировки соли I изомеризация чистого ацетиленового изомера Iб в диеновый Ia не происходит. Следовательно, продукт Ia получается по направлению а.

Таблица 2

Влияние температуры и растворителя на относительные количества продуктов Ia и Iб

Растворитель	Температура, °С	Продолжительность, час	Соотношение продуктов, %		Общий выход, %
			Iб	Ia	
Эфир	10—13	48	20	80	51
	20—23	1	30	70	73
	34—37	0,3	68	32	66
Бензол	10—13	48	33	67	60
	20—23	1	48	52	68
	75—78	0,3	85	15	63

Данные табл. 2 показывают, что повышение температуры способствует увеличению относительного количества Iб в смеси. При переходе от эфирного раствора к бензольному количество Iб увеличивается. Эти данные согласуются с данными, полученными нами при изучении стивенсовской перегруппировки хлористого диметилбензилкарбометоксиметиламмония в бензоле при различных температурах [2].

Согласно данным табл. 1, соли, содержащие 2-бутильную (II,IV,VI) и 3-хлор-2-бутильную (III,V,VII) группы, при взаимодействии с соответствующими спиртами натрия образуют один и тот же продукт. Образование последнего из солей с 3-хлор-2-бутильной группой может происходить как в результате непосредственного участия этой группы в перегруппировке (а), так и после предварительного дегидрохлорирования (б).

При сопоставлении результатов перегруппировки солей II—VIII видно, что алкильные группы у азота и в сложноэфирной группировке заметного влияния на ход реакции не оказывают.

Продукты перегруппировки солей II—X с пикриновой кислотой образуют пикрат соответствующего диалкиламина, а с 2,4-динитрофенилгидразином—гидразон эфира соответствующей кетокислоты.

Соль X также вступает в перегруппировку. Однако продукт перегруппировки не удалось выделить, т. к. при перегонке он быстро полимеризуется. Поэтому продукт стивенсовской перегруппировки соли X в виде эфирного раствора сразу после получения подвергался солянокислому гидролизу. В результате был получен метиловый эфир фенолэтилденпировиноградной кислоты.

Обработка продуктов перегруппировки солей II—VII разбавленной соляной кислотой приводит к кетоэфирам аналогичного строения (табл. 3).

Таблица 3

Результаты солянокислого гидролиза продуктов стивенсовской перегруппировки Ia—IVa и Xa

Исходное соединение	Полученный кетоэфир RO		Выход, %	Т. кип., °С/мм	n _D ²⁰	Найдено, %		Вычислено, %		ИК спектр, см ⁻¹
	CH ₃ CH=CC(=O)OR'					C	H	C	H	
	R	R'								
Iб	[полимер]		80	—	—	55,71	7,10	56,24	6,24	—
IIa	CH ₃	CH ₃	75	78—81/8	1,4565	59,05	7,40	59,15	7,04	1750, 1681 1653
IIIa (IVa)	CH ₃	C ₂ H ₅	87 (68)	67—68/2	1,4510	61,41	7,70	61,53	7,68	1745, 1680 1650
VIIa	C ₆ H ₅	CH ₃	70	130—131/4	1,5370	70,23	5,82	70,58	5,88	3090, 1750, 1685, 1630, 360, 340

Из кетоэфиров неустойчивым оказался только продукт, полученный из аминоэфира Iб, который во время перегонки полимеризовался.

Экспериментальная часть

Получение эфиров замещенных 2-диалкиламино-2,4-пентадиеновых кислот. К 0,1 моля алкоголята натрия в 50—60 мл эфира добавлялось 0,05 моля испытуемой соли. Реакционная колба время от времени встряхивалась и охлаждалась водой. После окончания экзотермической реакции смесь 10—20 мин. нагревалась при 30—35°, затем добавлялась вода. Эфирный слой отделялся, а водный дважды экстрагировался эфиром. Эфирные вытяжки сушились над сульфатом магния и перегонялись (табл. 1).

ТСХ аминов проведена на нейтральной окиси алюминия с использованием системы растворителей бензол: эфир=3:1, ГЖХ—на «Хром—31» (колонка—апиезон 5%, твин 10% на целите, скорость He 60—80 мл/мин, $l=1,2$ м, $d=6$ мм).

Взаимодействие смеси метиловых эфиров 2-диалкиламино-4-пентиновой кислоты (Iб) и 2-диметиламино-2,4-пентадиеновой кислоты (Iа) с соляной кислотой. К смеси 6,22 г изомерных эфиров Iб и Iа с процентным соотношением 30:70 при сильном перемешивании прикапывалось 17,5 мл 2,3 н раствора соляной кислоты. Реакционная смесь перемешивалась еще 15—20 мин., верхний эфирный слой отделялся, нижний дважды экстрагировался эфиром. Эфирные вытяжки сушились над сульфатом магния и перегонялись. После отгонки эфира остаток (3г) во время перегонки заполимеризовался (табл. 3). К водной части добавлялись эфир и поташ. Перегонкой эфирного экстракта получено 1,3 г (70%) непрореагировавшего метилового эфира 2-диметиламино-4-пентиновой кислоты, т. кип. 62—63°/4 мм, n_D^{20} 1,4520. Найдено %: С 61,67; Н 8,10; N 9,28. $C_8H_{13}NO_2$. Вычислено %: С 61,93; Н 8,39; N 9,03. ИК спектр, ν , cm^{-1} : 1755, 2125, 3320.

Получение кетозэфиров. К 0,032 моля эфира 2-диалкиламино-3-метил(фенил)-2,4-пентадиеновой кислоты в 15 мл эфира при сильном перемешивании по каплям добавлялось эквимолярное количество 1,5 н раствора соляной кислоты. Реакционная смесь перемешивалась еще 0,5 часа. Эфирный слой отделялся, нижний дважды экстрагировался эфиром. Эфирные вытяжки высушивались над сульфатом магния и перегонялись (табл. 3).

Для некоторых соединений приводятся спектры ПМР.

Смесь метиловых эфиров 2-диметиламино-2,4-пентадиеновой (Iа) и 2-диметиламино-4-пентиновой (Iб) кислоты. Для (Iа): $\delta_{(CH_2)_2N}$ 2,43 (синглет), δ_{CH_2O} 3,52 (синглет), δ_{CH_2-} 4,9—5,4 (мультиплет). Для (Iб): $\delta_{(CH_2)_2N}$ 2,07 (синглет), δ_{CHN} , δ_{CH-} и δ_{CH_2} (мультиплет) в области от 2,0 до 3,5 м. д., δ_{CH_2O} 3,50 (синглет).

Метиловый эфир 2-диметиламино-3-метил-2,4-пентадиеновой кислоты (IIа): δ_{CH_2C} 1,78 (синглет), $\delta_{(CH_2)_2N}$ 2,40 (синглет), δ_{CH_2O} 3,63 (синглет), δ_{CH_2-} 4,70—5,4 (мультиплет), δ_{CH-} 6,2—6,9 (мультиплет).

Этиловый эфир 2-диметиламино-3-метил-2,4-пентадиеновой кислоты (IIIа): $\delta_{CH_2CH_2}$ 1,08 (триплет), δ_{CH_2C} 1,63 и 1,70 (два синглета). Отношение интенсивностей 2:3, $\delta_{(CH_2)_2N}$ 2,36 (синглет), δ_{CH_2O} 4,12

(квадруплет), δ_{CH_2} 4,8—5,5 (мультиплет), δ_{CH} 6,5—7,4 (мультиплет), $J_{\text{CH}_2, \text{CH}}$ 7,3 Hz.

Метиловый эфир 2-диэтиламино-3-метил-2,4-пентадиеновой кислоты (IVa): $\delta_{\text{CH}_2, \text{C}}$ 1,85 и 2,7 (два синглета), $\delta_{\text{CH}_2, \text{CH}_2}$ 2 (мультиплет), δ_{OCH_3} 3,72 и 3,85 (два синглета), δ_{CH_2} 4,7—5,6 (мультиплет), δ_{CH} 6,0—7,1 (мультиплет).

Метиловый эфир 2-диметиламино-3-винил-2,4-пентадиеновой кислоты (VIa): $\delta_{(\text{CH}_2)_N}$ 2,48 (синглет), $\delta_{\text{CH}_2, \text{O}}$ 3,57 (синглет), δ_{CH_2} 4,8—5,4 (мультиплет), δ_{CH} 6, —7,0 (мультиплет).

Этиловый эфир 3-метил-3-этилиденпировиноградной кислоты: $\delta_{\text{CH}_2, \text{CH}}$ 0,94 (триплет), $\delta_{\text{CH}_2, \text{C}}$ 1,43 (синглет), $\delta_{\text{CH}_2, \text{CH}}$ 1,55 (дублет), δ_{CH_2} 4,02 (квадруплет), δ_{CH} 6,48 (квадруплет), $J_{\text{CH}_2, \text{CH}}$ 7,3 Hz, $J_{\text{CH}_2, \text{CH}}$ 7,3 Hz.

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՄԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՄՈՆԻՈՒՄԱՅԻՆ
ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ

CXXI. 2-ԴԻԱԿԻԼԱՄԻՆՈ-2,4-ՊԵՆՏԱԴԻԵՆԱՅԻՆ ԹԹՎԻ ԷՍԹԵՐՆԵՐԻ ՍԻՆԹԵԶ

Ս. Տ. ԲՈՉԱՐՅԱՆ, Ս. Մ. ՕՀԱՆՋԱՆՅԱՆ Ե Ա. Բ. ԲԱԲԱՅԱՆ

Ուսումնասիրված է կարբալկօքսիմեթիլ խմբի հետ մեկտեղ պրոպարգիլային կամ պոտենցիալ պրոպարգիլային խումբ պարունակող ամոնիումային աղերի ստիվենսյան վերախմբավորման ռեակցիան նատրիումի համապատասխան ալկոհոլատների եթերային սուսպենզիաների ազդեցությամբ տակ: Ցույց է տրված, որ այդ սխեմաներում վերախմբավորումն ընթանում է միզրվող խմբի ալիլային իզոմերիզացիայով, առաջացնելով տեղակալված 2-դիալկիլամինո-2,4-պենտադիենային թթվի էսթերներ: I աղի դեպքում ստացվում է նաև 1,2-վերախմբավորման պրոդուկտ, որի հարաբերական քանակությունը խառնուրդում խիստ մեծանում է ջերմաստիճանը բարձրացնելիս:

Ցույց է տրված նաև, որ ստիվենսյան վերախմբավորման պրոդուկտների աղաթթվային հիդրոլիզը բերում է համապատասխան կետոթթուների էսթերների առաջացմանը:

INVESTIGATIONS IN THE FIELD OF AMINES AND
AMMONIUM COMPOUNDS

CXXI. SYNTHESIS OF 2-DIALKYLAMINO-2,4-PENTADIENYL CARBOXYLATES

S. T. KOCHARIAN, S. M. OHANJANIAN and A. T. BABAYAN

It has been shown that in an ethereal solution of sodium alkoxide the Stevens rearrangement reaction of ammonium salts containing propargyl, 2-butynyl, 3-vinylpropargyl, 3-phenylpropargyl or 3-chloro-1-butenyl groups together with a carbalkoxymethyl group leads to the formation of α -dialkylamino-2,4-pentadienylcarboxylates.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Ս. Կոչարյան, Ս. Մ. Օհանջանյան, Ա. Կ. Բաբայան, *Արմ. քիմ. ժ.*, 29, 42 (1976).
2. Ա. Կ. Բաբայան, Ս. Կոչարյան, Ս. Մ. Օհանջանյան, *Արմ. քիմ. ժ.*, 29, (1976).
3. Ա. Կ. Բաբայան, Ս. Կոչարյան, Ս. Մ. Օհանջանյան, *ԺԱՆ ԱՆ Արմ.ՍՍՀ*, 58, 100 (1974).