ОБЩАЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

УДК 541.124.2+547.261

ИЗУЧЕНИЕ СТАДИИ ЗАРОЖДЕНИЯ ЦЕПИ ПРИ ОКИСЛЕНИИ
 МЕТАНОЛА

К. Г. ГАЗАРЯН, Т. А. ГАРИБЯН и А. Б. НАЛБАНДЯН

Институт химической физики АН Армянской ССР, Ереван

Поступило 23 VI 1975

Изучена стадия зарождения цепи в реакции окисления метанола в температурном интервале 500—730°C. Показано, что при 500—620° зарождение протекает по гетерогенному, а при 620—730° — преимущественно по гомогенному механизму. При низких температурах идет реакция $\text{CH}_3\text{OH} + \text{O}_2 \rightarrow \dot{\text{C}}\text{H}_2\text{OH} + \dot{\text{H}}\text{O}_2$, при высоких — наряду с ней также реакция $\text{CH}_3\text{OH} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CH}_3\dot{\text{O}} + \dot{\text{H}}\text{O}_2$. Вклад последней с ростом температуры возрастает.

Рис. 3, библиографических ссылок 6.

С помощью кинетического метода вымораживания радикалов в сочетании с ЭПР спектрометром [1, 2] нами изучалась стадия зарождения цепи при окислении метилового спирта. Исходя из анализа литературных данных, в работе [3] приведена схема окисления метанола, где в качестве реакции инициирования предлагается реакция

Экспериментальная часть

В настоящей работе для изучения стадии зарождения цепи смесь, содержащая метанол и кислород в одинаковых количествах, пропускалась через обогреваемую кварцевую трубку диаметром 8 мм. Образовавшиеся радикалы вымораживались из зоны реакции на охлаждаемой жидким азотом поверхности и регистрировались ЭПР спектрометром. Реагирующая смесь готовилась в колбах. Исследования проводились при низких давлениях (0,5—0,15 тор) и больших линейных скоростях потока, что исключало развитие цепей; область изучаемых температур 500—730°C. Реактор предварительно промывался плавиковой кислотой для уменьшения гетерогенной рекомбинации радикалов.

Обсуждение результатов

На рис. 1 приведена кинетика накопления радикалов для 730 и 680°C при давлении 0,15 тор в зоне реакции. Экспериментальные данные по скоростям накопления радикалов в зависимости от температуры в координатах Аррениуса приведены на рис. 2, из которого видно, что точки ложатся на две прямые. Энергии активации, определенные из наклонов этих прямых, оказываются равными $E_{эф} = 6 \div 8$ ккал/моль в интервале 500—620° и 47 ккал/моль в области высоких температур. Аналогичная закономерность была установлена при изучении стадии зарождения цепей реакций окисления водорода, предельных углеводородов и распада некоторых галоидалкилов [4, 5]. Такое явление было объяснено наличием двух механизмов зарождения цепи: высокотемпературного — гомогенного, и низкотемпературного — гетерогенного. Таким образом, при низких температурах в реакции окисления метанола зарождение цепи осуществляется по гетерогенному, а при высоких — по гомогенному механизму. Увеличение отношения S/V с помощью заполнения реактора кварцевой насадкой привело к росту интенсивности сигнала в низкотемпературной области и к падению в высокотемпературной. Однако в связи с плохой воспроизводимостью кинетические измерения сделать не удалось.

Для исследования влияния материала поверхности реактора на стадию зарождения цепи реактор был покрыт пленкой серебра по методу изготовления промышленных катализаторов.

На рис. 2 для сравнения приводятся температурные зависимости накопления радикалов в координатах Аррениуса в реакторах, обработанных HF и $AgNO_3$. Как видно из рисунка, область гомогенного зарождения параллельно смещается в сторону низких температур, что, возможно, связано с уменьшением гибели радикалов на поверхности, обработанной $AgNO_3$.

Нами было замечено, что спектр вымороженных радикалов при высоких температурах идентичен суммарному спектру перекисных радикалов [6]. С понижением температуры спектр становился более похожим на спектр радикала HO_2 . Кроме того, при оценке $E_{пст}$ с учетом гибели радикалов в области высоких температур оказалось, что она несколько выше эндотермики процесса (1). Исходя из кинетических данных и рассмотрения спектров нами было сделано предположение, что при более высоких температурах в зарождение цепи наряду с реакцией (1) вносит свой вклад также реакция

С повышением температуры этот вклад должен расти.

Для проверки этого предположения были сделаны эксперименты по окислению дейтерозамещенных соединений CD_3OH и CH_3OD . Известно, что спектры радикалов HO_2 и DO_2 отличаются по ширине и числу расщеплений. Спектр радикала DO_2 уже спектра HO_2 . Следовательно, если

Рис. 1. Кинетика накопления перекисных радикалов при: 1 — 680, 2 — 730°C.

Рис. 2. Температурная зависимость скорости накопления радикалов в интервале 500–730°C при $P = 0,15$ тор в координатах Аррениуса.

1 — реактор, промытый HF, 2 — реактор, обработанный AgNO_3 .

бы отрыв атома Н происходил только от группы CH_3 , то при окислении CH_3OH и CH_3OD должен был быть получен идентичный спектр (в одинаковых условиях эксперимента). Однако, как показал опыт, все три спектра перекисных радикалов, полученные при окислении CH_3OH , CD_3OH и CH_3OD , отличаются друг от друга (рис. 3). Значит, отрыв ато-

Рис. 3. Спектры радикалов, полученные при окислении:
а — CH_3OH , б — CD_3OH , в — CH_3OD .

ма Н при высоких температурах происходит как от метильной, так и от гидроксильной группы. Это подтверждается кинетическими данными: $E_{\text{актв}}$ несколько больше эндотермики процесса (1), но меньше эндотермики процесса (2), $E_{\text{ист}} = 56 \text{ ккал/моль}$.

ՇՂԹԱՅԻ ՀԱՐՈՒՑՄԱՆ ԱԿՏԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄԸ ՄԵԹԱՆՈՒՆ ՕՔՍԻԴԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ

Կ. Գ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ, Թ. Ա. ՂԱՐԻԲՅԱՆ Ե Ա. Բ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ

Ուսումնասիրված է մեթանոլի օքսիդացման ռեակցիայի շղթայի հարուցման ակտը՝ շերմաստիճանային լայն տիրույթում: Ցույց է տրված, որ ցածր շերմաստիճաններում հարուցումն ընթանում է հետերոգեն, իսկ բարձրում՝ գերակշռում է հոմոգեն մեխանիզմը: Ցածր շերմաստիճաններում շղթ-

Թան հարուցվում է համաձայն $\text{CH}_3\text{OH} + \text{O}_2 \rightarrow \dot{\text{C}}\text{H}_2\text{OH} + \text{HO}_2$ ռեակցիայի, իսկ բարձրում համատեղ ընթանում է նաև $\text{CH}_3\text{OH} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CH}_2\dot{\text{O}} + \text{HO}_2$ ռեակցիան: Զերմաստիճանը բարձրացնելիս վերջինս գերակշռող է դառնում:

INVESTIGATION OF THE CHAIN INITIATION STAGE DURING METHANOL OXIDATION

K. G. GHAZARIAN, T. A. GHARIBIAN and A. B. NALBANDIAN

The chain initiation stage during methanol oxidation has been investigated in a wide temperature range. It has been shown that the initiation proceeds by a heterogeneous mechanism at low temperatures and preferably by a homogeneous one at high temperatures.

ЛИТЕРАТУРА

1. Т. А. Гарибян, Г. Л. Григорян, А. А. Манташян, А. Б. Налбандян, ДАН СССР, 177 (1), 149 (1967).
2. Т. А. Гарибян, Г. Л. Григорян, А. А. Манташян, А. Б. Налбандян, ДАН СССР, 178 (4), 866 (1967).
3. В. А. Бунев, Б. М. Меламед, Р. С. Тюльпанов, В. М. Хачатурян, Физика горения и взрывов, 5 (1), 139 (1969).
4. Т. А. Гарибян, А. А. Манташян, А. Б. Налбандян, ДАН СССР, 186 (5), 1114 (1969).
5. Т. А. Гарибян, Р. Р. Григорян, А. А. Манташян, А. Б. Налбандян, Арм. хим. ж., 23, 95 (1972).
6. Т. А. Гарибян, А. А. Манташян, А. Б. Налбандян, Арм. хим. ж., 24, 304 (1971).