ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АЛКИЛ- α -ХЛОРАЛКИЛОВЫХ ЭФИРОВ С ТЕТРА-*n*-БУТИЛДИБОРАНОМ

Г. Б. БАГДАСАРЯН, Л. Ш. АИРИЯН и М. Г. ИНДЖИҚЯН

Институт органической химии АН Армянской ССР, Ереван

Поступило 22 XI 1976

Показано, что алкилхлорметиловые эфиры при нагревании с тетра-*n*-бутилдибораном образуют продукт восстановления—метилалкиловый эфир и хлор(ди-*n*-бутил)боран. В случае алкил- α -хлоралкиловых эфиров реакция с саморазогреванием протекает уже при комнатной температуре.

Табл. 1, библиограф. ссылки 18.

Несмотря на большое число работ, посвященных α -хлоралкиловым эфирам, непосредственное взаимодействие их с боранами не изучалось.

Имеется ряд исследований, посвященных реакциям боринатов и триалкилборанов с метилдихлорметиловым эфиром в присутствии оснований—алкоголятов или метиллития [1—5]. Все эти превращения происходят через промежуточное образование из хлороэфиров карбенов или карбанионов.

Изучено также поведение метилхлорметилового эфира по отношению к треххлористому бору. Джерардом с сотр. [6] было показано, что при этом получается боркислородный комплекс, разлагающийся при пиролизе с выделением хлористого метила.

Джерард и др. [7] установили, что дикротиловый эфир уже при -80° также образует комплекс с треххлористым бором, который при нагревании разлагается по карбкатионному механизму с образованием хлористого кротила и дихлоркротилборината.

Брауном с сотр. и нами было показано, что совершенно иначе реагируют кротиловые эфиры с боранами, образуя в случае диборана [8] и тетра-*n*-бутилдиборана [9] продукты гидроборирования-расщепления, а в случае три-*n*-бутилборана—пералкилирования-расщепления [10].

Исходя из сказанного нам казалось интересным изучить поведение алкил- α -хлоралкиловых эфиров по отношению к тетра-*n*-бутилдиборану.

Об одном примере такого взаимодействия нами недавно было кратко сообщено. Оказалось, что бутилхлорметиловый эфир [11] при нагревании с тетра-*n*-бутилдибораном при 150° образует метилбутиловый эфир и хлор(ди-*n*-бутил)боран.

Настоящая работа, являющаяся продолжением исследований в этой области, посвящена взаимодействию эфиров I—IX с тетра-*n*-бутилдибораном (табл.).

Как видно из таблицы, легкость реагирования с тетра-*n*-бутилдидбораном растет при переходе от этилхлорметилового эфира [1] к *n*-пропильному аналогу II. Если в первом случае 40-часовое нагревание эфира с половинным мольным количеством тетра-*n*-бутилдидборана приводит к образованию $\sim 40\%$ продукта восстановления—метилэтилового эфира, то во втором уже в течение 26 час. получается 67% метилпропилового эфира.

Еще большее облегчающее действие оказывает разветвление в α -положении связанного с кислородом радикала. Так, уже при 8-часовом взаимодействии тетра-*n*-бутилдидборана с *изо*-пропилхлорметилэфиром (III) было получено $\sim 61\%$ продукта восстановления.

На примере соединений IV—V установлено заметное влияние температуры на легкость протекания реакции. Так, выход продукта восстановления IV при 100° в течение 26 час. составляет 57%, а при 130° —18 час. и 150° —8 час.—69%. Картина не меняется при переходе к V.

Для образования метилалкиловых эфиров из алкилхлорметилового эфира под действием тетра-*n*-бутилдидборана могут быть предложены схемы (а) и (б), включающие в себя координацию бора с молекулой хлорэфира за счет атома хлора.

R = C₂H₅ (I), *n*-C₃H₇ (II), *l*-C₃H₇ (III), *n*-C₅H₁₁ (IV); *l*-C₃H₇ (V), C₆H₁₃ (VI);
 R' = H (I—VI), R = C₂H₅, R' = C₃H₇ (VII); R = C₄H₉, R' = CH₃ (VIII);
 R = C₃H₇, R' = C₂H₅ (IX).

Схема (а) включает в себя одновременный с координацией гидридный перенос по четырехчленному циклическому механизму. Согласно же схеме (б), получившийся комплекс диссоциирует по связи C—Cl с образованием мезомерного алкоксиметиленового катиона. Последний отрывает гидридный ион от получающегося при диссоциации боренивого аниона.

Как видно из приведенных схем, независимо от пути протекания реакции она должна облегчаться с увеличением подвижности атома хлора в молекуле хлорэфира. В соответствии с этим находятся приведенные выше данные по реагированию с тетра-*n*-бутилдидбораном соединений I—III.

С приведенными схемами согласуется и исключительная легкость взаимодействия с тетра-*n*-бутилдидбораном вторичных хлорэфиров VII—IX.

Реакция этил- α -хлорбутилового эфира (VII) с тетра-*n*-бутилдидбораном протекает с саморазогреванием. Температура смеси поднимается до 98° . После 25—30 мин. стояния перегонкой получено 81% этил-

бутилового эфира. Аналогичная картина наблюдается и в случае бутил- α -хлорэтилового эфира с атомом хлора в более короткой цепи.

Легкость реагирования вторичных хлорозэфиров с тетра-*n*-бутилдибораном позволяет рекомендовать эту реакцию в качестве удобного препаративного пути получения хлор(ди-*n*-бутил)борана.

Нам не удалось ввести в реакцию с тетра-*n*-бутилдибораном при 130° трет. бутилхлорид. Не увенчалась успехом и попытка осуществить взаимодействие между *изо*-амилхлорметиловым эфиром и три-*n*-бутилбораном при 150°.

Экспериментальная часть

Строение полученных диалкиловых эфиров подтверждено ГЖХ (сравнением с известными образцами), а хлор(ди-*n*-бутил)борана—сравнением физических констант с литературными и определением молекулярного веса титрованием.

Опыты проводили под аргоном.

1. *Взаимодействие изо-амилхлорметилового эфира (V) с тетра-*n*-бутилдибораном.* Смесь 6,0 г (0,0238 моля) тетра-*n*-бутилдиборана и 6,5 г (0,0477 моля) *изо*-амилхлорметилового эфира нагревали при температуре бани 150° 8 час. По мере накопления метил-*изо*-амилового эфира температура смеси упала от 148 до 122,5°. Определением активного водорода найдено 6% тетра-*n*-бутилдиборана.

Перегонкой в вакууме в присутствии змеевикового приемника, охлаждаемого смесью CO₂-ацетон, получено 4,9 г (64%) хлор(ди-*n*-бутил)борана с т. кип. 72—73°/18 мм, n_D^{20} 1,4220 [12]. Найдено %: С 59,45; Н 11,19; В 6,51; Cl 21,1. C₈H₁₈BCl. Вычислено %: С 59,81; Н 11,21; В 6,85; Cl 22,1. Найдено $M_{\text{по титр.}}$ 160. Вычислено M 160,5.

Обратно получено 1,3 г (20%) исходного *изо*-амилхлорметилового эфира.

Перегонкой содержимого змеевикового приемника выделено 3,5 г (71,8%) метил-*изо*-амилового эфира с т. кип. 85—87°/мм, n_D^{20} 1,3850 [16].

Остальные опыты с алкилхлорметиловыми эфирами проведены аналогично этому (табл.).

2. *Взаимодействие этил- α -хлорбутилового эфира (VII) с тетра-*n*-бутилдибораном.* К 5,5 г (0,0216 моля) тетра-*n*-бутилдиборана при комнатной температуре в течение 10 мин. прибавлено 5,9 г (0,0432 моля) этил- α -хлорбутилового эфира. Спустя 10 мин. наблюдается сильное саморазогревание смеси (до 98°). После 25—30-минутного стояния определением активного водорода в реакционной смеси найдено 6,8% тетра-*n*-бутилдиборана.

Перегонкой выделено 5,1 г (73,5%) хлор(ди-*n*-бутил)борана и 0,8 г (13,6%) исходного этил- α -хлорбутилового эфира.

Перегонкой содержимого змеевикового приемника получено 3,6 г (81,8%) этилбутилового эфира с т. кип. 86—87°/650 мм, n_D^{20} 1,3810.

Взаимодействие тетра-*n*-бутилдиборана с хлорозфирами ROCHR'
 $\begin{matrix} \text{Cl} \\ | \\ \text{C} \end{matrix}$

Соединение	R	R'	Условия опыта		ROCH ₂ R'				Выход (C ₄ H ₉) ₂ BCl, %	Вернувшийся эфир, %
					выход, %	т. кип., °C/650 мм	n _D ²⁰	температура		
I	C ₂ H ₅	H	100°	40 ч.	43,5	—	—	—	38,0	—
II	<i>n</i> -C ₃ H ₇	H	100°	26 ч.	67,0	35—36	1,3620	13	61,4	31,0
III	<i>нзо</i> -C ₃ H ₇	H	100°	8 ч.	61,5	28—30	1,3600	14	56,0	27,7
IV	<i>n</i> -C ₅ H ₁₁	H	100°	26 ч.	57,2	93—94	1,3875	15	52,1	16,6
			130°	18 ч.	69,0				63,0	15,6
			150°	8 ч.	73,6				68,0	20,0
V	<i>нзо</i> -C ₅ H ₁₁	H	100°	40 ч.	59,0	85—87	1,3850	16	55,0	18,0
			130°	10 ч.	65,0				60,0	14,6
			150°	8 ч.	71,8				64,0	20,0
VI	C ₆ H ₁₃	H	150°	8 ч.	80,0	121—123	1,3980	15	75,7	9,0
VII	C ₂ H ₅	C ₃ H ₇			81,5				73,6	13,6
VIII	C ₄ H ₉	CH ₃	комн.	45 мин.	83,9	86—87	1,3810	17	73,0	7,7
IX	C ₃ H ₇	C ₂ H ₅			83,3	84—85	1,3800	18	73,5	15,0

Остальные опыты с алкил- α -хлоралкиловыми эфирами проводили аналогично этому (табл.).

ԱԿԻԼ- α -ՔԼՈՐԱԿԻԼ ԵԹԵՐՆԵՐԻ ՓՈՆԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԵՏՐԱ-Ն-ԲՈՒՏԻԼԴԻԲՈՐԱՆԻ ՀԵՏ

Հ. Բ. ԲԱԳԴԱՍՏԱՐՅԱՆ, Լ. Շ. ՀԱՅՐՅԱՆ և Մ. Հ. ԻՆՃԻԿՅԱՆ

Ցույց է տրված, որ ակիլքլորմեթիլ եթերները տաքացման պայմաններում տետրա-*n*-բուտիլդիբորանի հետ փոխազդելիս ենթարկվում են վերականգնման, առաջացնելով համապատասխան մեթիլակիլ եթեր և քլոր-(դի-*n*-բուտիլ)բորան: Նույն արդյունքն է ստացվում նաև ակիլ- α -քլորակիլ եթերների և տետրա-*n*-բուտիլդիբորանի փոխազդեցության ժամանակ: Սակայն, ի տարբերություն ակիլքլորմեթիլ եթերների, ակիլ- α -քլորակիլ եթերների փոխազդեցությունն ընթանում է արդեն սենյակային ջերմաստիճանում և ուղեկցվում է ջերմության անջատմամբ:

THE INTERACTION OF ALKYL- α -CHLOROALKYL ETHERS WITH TETRA-*n*-BUTYLDIBORANE

H. B. BAGHDASSARIAN, L. Sh. HAYRIAN and M. H. INJIKIAN

It has been shown that the interaction of alkylchloromethyl ethers with tetra-*n*-butyldiborane with heating leads to the reduction of the

formers yielding the corresponding methylalkylether and chloro(di-*n*-butyl)borane. The same result is also obtained when alkyl- α -chloroalkyl ethers are interacted with tetra-*n*-butyldiborane with the difference that in the latter case reaction takes place at room temperature and with evolution of heat.

Л И Т Е Р Т У Р А

1. *H. C. Brown, B. A. Carlson, J. Org. Chem.*, **38**, 2422 (1973).
2. *H. C. Brown, B. A. Carlson, J. Organometal. chem.*, **54**, 61 (1973).
3. *H. C. Brown, J.-J. Katz, B. A. Carlson, J. Org. chem.*, **38**, 3968 (1973).
4. *B. A. Carlson, J.-J. Katz, H. C. Brown, J. Organometal. chem.*, **67**, C-39 (1974).
5. *A. Suzuki, S. Nozawa, M. Miyaura, M. Itoh, Tetrah. Lett.*, **1969**, 2955.
6. *J. D. Edwards, W. Gerrard, M. F. Lappert, J. Chem. Soc.*, **1957**, 377.
7. *W. Gerrard, M. F. Lappert, H. B. Sitwer, J. Chem. Soc.*, **1957**, 1647.
8. *H. C. Brown, R. M. Callivan, Jr., J. Am. Chem. Soc.*, **90**, 2906 (1968).
9. *Г. Б. Багдасарян, С. М. Маркарян, М. Г. Инджикян, Арм. хим. ж.*, **28**, 120 (1975).
10. *Г. Б. Багдасарян, С. М. Маркарян, М. Г. Инджикян, Арм. хим. ж.*, **28**, 116 (1975).
11. *Г. Б. Багдасарян, С. М. Маркарян, Л. Ш. Айриян, М. Г. Инджикян, Арм. хим. ж.*, **27**, 809 (1974).
12. *В. Джерард, Химия органических соединений бора, Изд. «Химия», М., 1966, стр. 104.*
13. *Словарь орг. соед., ИЛ, М., 1949, т. 2, стр. 800.*
14. *Словарь орг. соед., ИЛ, М., 1949, т. 2, стр. 756.*
15. *A. Vogel, J. Chem. Soc.*, **1948**, 618.
16. *Словарь орг., ИЛ, М., 1949, т. 2, стр. 748.*
17. *Norris, Rigby, J. Am. Chem. Soc.*, **54**, 2097 (1932).
18. *A. Vogel, J. Chem. Soc.*, **1948**, 619.