КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК (547.333+547.745):678—13

ПОЛИПРИСОЕДИНЕНИЕ *m*- и *p*-ДИИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛОВ
 К *N,N*-ДИЭТИЛАМИДАМ КИСЛОТ И *N*-МЕТИЛПИРРОЛИДОНУ

А. Ц. МАЛХАСЯН, Г. Г. СУКИАСЯН, С. Ы. САЯДЯН и Г. Т. МАРТИРОСЯН

Ереванский государственный медицинский институт

Поступило 3 XII 1976

При изучении алкилирования *N,N*-диэтиламидов уксусной, пропионовой, масляной кислот и *N*-метилпирролидона *m*- и *p*-дизопрпенилбензолами (ДИБ) в присутствии каталитических количеств натрия [1] нами было замечено, что наряду с α -С-алкилированными продуктами в ощутимых количествах образуются олигомеры с характеристической вязкостью 0,023—0,061. Учитывая наличие двух подвижных атомов водорода в молекулах амидов и двух активных кратных связей в молекулах изомерных ДИБ, можно было предположить, что в условиях реакции имеет место полиприсоединение по схеме.

R = H, CH₃, C₂H₅;

В подтверждение этому показано, что в отличие от гомополимеров *m*- и *p*-ДИБ полученные олигомеры хорошо растворяются в органических растворителях. В ИК спектрах обнаружена полоса поглощения, характерная для карбонильной группы, и отсутствуют полосы поглощений, присущие концевой винильной группе. Приведенное строение олигомеров подтверждается также элементным анализом.

С целью увеличения выходов олигомеров процесс проведен в апротонном биполярном растворителе — гексаметилфосфортриамиде (ГМФТА). Как видно из таблицы, при этом выход олигомера увеличивается приблизительно в 1,5 раза.

Таблица

Исходный амид	Изомерный ДИБ	Растворитель, объем, мл	Выход, %	Агрегатное состояние (т. размягчения, °С)	$[\eta]_{\text{бензол}}^{20}$	N, %	
						найдено	вычислено
$\text{CH}_3\text{CON}(\text{C}_2\text{H}_5)_2$	м-	бензол, 20	60	вязкое	0,041	5,19	5,13
	м-	ГМФТА, 10	86	вязкое	0,060	5,11	5,13
	п-	ГМФТА, 10	88	вязкое	0,061	5,10	5,13
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CON}(\text{C}_2\text{H}_5)_2$	м-	бензол, 20	62	твердое (110—113)	0,042	4,94	4,88
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CON}(\text{C}_2\text{H}_5)_2$	м-	бензол, 20	65	твердое (110—115)	0,040	4,21	4,65
м-	ГМФТА, 10	90	вязкое	0,023	5,42	5,48
	п-	ГМФТА, 10	93	вязкое	0,025	5,37	5,48

По предварительным данным, полученные олигомеры являются весьма эффективными стабилизаторами для хлоропреновых латексов.

Экспериментальная часть

Смесь 0,05 моля амида, 0,05 моля м- или п-ДИБ, 0,02 г натрия, 10—20 мл растворителя перемешивали при 80°. Через полчаса температура реакционной смеси самопроизвольно поднялась до 120—125°. После прекращения саморазогревания смесь декантировали с натрия и олигомер осаждали водой. Полученный олигомер многократно промывали дистиллированной водой до нейтральной реакции и высушили в вакуум-эксикаторе при 30° в среде очищенного сухого азота до постоянного веса. ИК спектры олигомеров, $\nu, \text{см}^{-1}$: 1650 (>C=O в

$\text{RCH}_2\text{CON}(\text{C}_2\text{H}_5)_2$) и 1690 (>C=O в).

ЛИТЕРАТУРА

1. А. Ц. Малхасян, Г. Г. Сукиасян, Г. Т. Мартиросян, Арм. хим. ж., 29, 537 (1976).