

В аналогичных условиях 3-метил-2,5-дигидротиофен-1,1-диоксид не алкилируется стиолом, а N,N-диэтил-*n*-толуолсульфамид подвергается гидролизу.

Обработку реакционных смесей проводили стандартным способом: нейтрализовали соляной кислотой, экстрагировали хлороформом в вакууме аналогично [1, 4] и идентифицировали по ГЖХ с заведомыми образцами.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Г. Т. Мартиросян, А. Ц. Малхасян, Э. М. Асатрян, И. П. Белецкая, ЖОрХ, 14, 15 (1978).
2. Б. А. Трофимов. Тезисы докладов VI Всесоюз. научн. конференции по химии ацетилена и его производных, Баку, 1979, стр. 3.
3. M. Larcheveque, P. Mulot, Can. J. Chem., 57, 17 (1979).
4. А. Ц. Малхасян, Э. М. Асатрян, С. М. Миракян, Г. Т. Мартиросян, Арм. хим. ж., 32, 465 (1979).

Э. М. АСАТРЯН,
А. Ц. МАЛХАСЯН,
С. М. МИРАКЯН,
Г. Т. МАРТИРОСЯН

Научно-производственное объединение
„Наирит“, Ереван

Поступило 4 I 1980

