СИНТЕЗ И НЕКОТОРЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ГЛИЦИДОЭФИРОВ
И ГЛИЦИДОНИТРИЛОВ, СОДЕРЖАЩИХ
ТЕТРАГИДРОПИРАНОВОЕ КОЛЬЦО

Р. А. КУРОЯН, Н. С. АРУТЮНЯН и С. А. ВАРТАНЯН

Институт тонкой органической химии им. А. Л. Миджояна
АН Армянской ССР, Ереван

Поступило 10 IX 1979

Конденсацией альдегидов I, II с хлоруксусным эфиром и хлорацетонитрилом получены глицидозэфиры и глицидонитрилы, соответственно, переходящие в условиях гидридного восстановления в 1,3-диоли и γ -аминоспирты тетрагидропиранового ряда. Реакция глицидозэфиров с аммиаком при соотношении 1 : 1 приводит к получению глицидоамида, а с гидразингидратом — оксипиразолидона. При взаимодействии глицидозэфиров и глицидонитрилов с хлористым водородом оксипирановое кольцо раскрывается у β -углеродного атома по отношению к карбонильной и нитрильной группам.

Табл. 1, библиограф. ссылок 6.

Ранее нами исследовано поведение O, S, N-содержащих гетероциклических спироциклических глицидных эфиров [1, 2] и нитрилов [3] в условиях гидридного восстановления и при взаимодействии с аминами, хлористым водородом и т. д. В настоящем сообщении приводятся данные изучения поведения неконденсированных глицидных эфиров и нитрилов с тетрагидропирановым кольцом.

Синтез глицидного эфира III осуществлен взаимодействием альдегида I с хлоруксусным эфиром по ранее разработанному нами методу [4]. Глицидонитрилы V, VI получены взаимодействием I, II с хлорацетонитрилом в присутствии алкоголята натрия по [3]. Установлено, что в данном случае наряду с глицидонитрилом образуются также некоторые количества соответствующих иминоэфиров (по данным ГЖХ, 5 : 1). Доказательством такого течения реакции является, в частности, наличие в ИК-спектре характерного поглощения нитрильной (2250 см^{-1}) и иминоэфирной (1680 см^{-1}) групп. При гидрировании глицидозэфиров III, IV и глицидонитрилов V, VI LiAlH_4 с высокими выходами получены диолы VII, VIII и аминосспирты IX, X, структура которых установлена встречным синтезом. Так, восстановление эфира β -окси- β -(2,2-диметил-4-тетрагидропиранил)пропионовой кислоты LiAlH_4 дает тот же диол VII, получаемый также дезаминированием аминосспирта IX, который образуется при восстановлении β -оксинитрила XI LiAlH_4 . Реакция глици-

доэфиров с аммиаком при соотношении 1:1 приводит к амидам XII, XIII, а при реакции с гидразингидратом после замещения происходит внутримолекулярное взаимодействие гидразида с β -углеродным атомом оксиранового кольца с образованием оксипиразолидонов XIV и XV. Из глицидоэфиров III, IV получены также некоторые аминоэфиры XVI—XXI.

Установлено, что III, IV и V, VI с хлористым водородом образуют β -хлор- α -оксиэфиры XXVII, XXVIII и β -хлор- α -оксинитрилы XXX, XXXI.

Структура полученных веществ доказана встречным синтезом. Так, декарбоксилированием глицидной кислоты XXIV в жестких условиях получен альдегид XXV, синтезированный также из альдегидов I, II через соответствующие непредельные эфиры XXII, XXIII. Хлорированием аль-

дегида XXV получен α -хлоральдегид XXIX, циангидрин которого идентичен циангидрину XXX, полученному из V. Этерификация циангидринов XXX, XXXI, полученных взаимодействием V, VI с хлористым водородом в этиловом спирте, дает β -хлор- α -оксиэфиры XXVII, XXVIII.

Таким образом, при гидридном восстановлении глицидоэфиров и глицидонитрилов как спиро- [1, 3], так и неконденсированных O, S, N-содержащих гетероциклов во всех случаях сначала гидрируется карбоксильная группа, затем происходит раскрытие оксиранового кольца со стороны образовавшейся гидроксильной группы. В остальных случаях, т. е. при взаимодействии с аммиаком, аминами, хлористым водородом,

гидразингидратом, глицидные эфиры и нитрилы ведут себя, как эфиры α,β -ненасыщенных кислот и их нитрилы.

Исследование биологических свойств показало, что некоторые из синтезированных соединений (XVI—XXI) обладают слабо выраженными коронарорасширяющим и противовоспалительным свойствами и не обладают анальгезирующим, психотропным, антибактериальным действием.

Экспериментальная часть

ИК спектры получены на приборе UR-20, хроматографический анализ проведен по методу [5].

Этиловый эфир β -(2,2-диметил-4-тетрагидропиранил)глицидной кислоты (III). При охлаждении ледяной водой к 11,5 г (0,5 г-ат) мелкодробленного натрия в 150 мл толуола прикапывают смесь 71,1 г (0,5 моля) 2,2-диметил-4-формилтетрагидропирана (I) и 61,2 г (0,5 моля) этилового эфира монохлоруксусной кислоты с такой скоростью, чтобы температура не превышала 20°. Реакционную массу перемешивают еще 2 часа, добавляют 20 мл воды, отделяют органический слой, водный дважды экстрагируют эфиром. Эфирные вытяжки сушат над сульфатом магния, отгоняют растворитель, остаток перегоняют в вакууме. Получают 86,5 г (75%) эфира глицидной кислоты III. Т. кип. 120—122°/2 мм, n_D^{20} 1,4620, d_4^{20} 1,0590. Найдено %: С 63,19; Н 8,90. $C_{12}H_{20}O_4$. Вычислено %: С 63,13; Н 8,83.

β -(2,2-Диметил-4-тетрагидропиранил)глицидонитрил (V). К алкоголяту натрия, полученному из 50 мл абс. этанола и 2,3 г (0,1 г-ат) натрия, медленно добавляют смесь 14,2 г (0,1 моля) 2,2-диметил-4-формилтетрагидропирана и 7,5 г (0,1 моля) хлорацетонитрила, поддерживая температуру в пределах 20—25°. Перемешивание продолжают еще 4 часа, отгоняют спирт, оставшуюся массу растворяют в небольшом количестве воды, экстрагируют эфиром, сушат над сернокислым магнием и после отгонки эфира остаток перегоняют в вакууме. Получают смесь нитрила (V) и иминоэфира глицидной кислоты. Общий выход, рассчитанный на израсходованный 2,2-диметил-4-формилтетрагидропиран, составляет 40,2%. По ГЖХ анализу соотношение нитрил—иминоэфир равно 5 : 1. Т. кип. 112—116°/3 мм.

β -(2-Метил-2-этил-4-тетрагидропиранил)глицидонитрил (VI). Аналогично из 31,2 г (0,2 моля) 2-метил-2-этил-4-формилтетрагидропирана, 4,8 г (0,2 г-ат) натрия и 100 мл этанола получают 19,8 г смеси глицидонитрила VI и иминоэфира глицидной кислоты в соотношении 5 : 1. Общий выход, рассчитанный на израсходованный 2-метил-2-этил-4-формилтетрагидропиран, 50,7%. Т. кип. 106—110°/1 мм.

β -Окси- β -(2,2-диметил-4-тетрагидропиранил)пропионитрил (XI). К 7,8 г (0,12 моля) цинковой фольги добавляют 10—15 мл раствора, полученного из 14,2 г (0,1 моля) 2,2-диметил-4-формилтетрагидропирана, 8,3 г (0,11 моля) хлорацетонитрила, 20 мл абс. бензола и 5—7 мл сухо-

го эфира. Содержимое колбы нагревают до начала реакции, затем при-капывают остальную часть раствора с такой скоростью, чтобы жидкость слабо кипела. Кипячение продолжают еще 1,5 часа при 60—65°. Реакци-онную смесь гидролизуют 10% серной кислотой до кислой реакции, эк-страгируют эфиром, промывают водой, сушат над сульфатом магния и после отгонки растворителя остаток перегоняют в вакууме. Получают 5,2 г (28,4%) оксинитрила XI. Т. кип. 136—139°/3 мм, n_D^{20} 1,4780, d_4^{20} 1,0398. Найдено %: С 65,59; Н 9,38; N 7,70. $C_{10}H_{17}NO_2$. Вычислено %: С 65,54; Н 9,35; N 7,64.

1-Окси-1-(2,2-диметил-4-тетрагидропиранил)-γ-аминопропан (IX).

а) К охлажденному в бане со льдом раствору 2 г (0,053 моля) алюмогид-рида лития (АГЛ) в 40 мл сухого эфира по каплям прибавляют раствор 3,6 г (0,02 моля) глицидонитрила V в 10 мл сухого эфира. По оконча-нии реакции при интенсивном перемешивании, продолжая охлаждение реакционной массы, последовательно прибавляют 1,8 мл воды, 1,3 мл 20% раствора едкого натра и 6,2 мл воды. Эфирный раствор сливают с осадка, последний несколько раз промывают эфиром, эфирные раство-ры объединяют и сушат над сульфатом магния. После отгонки эфира остаток перегоняют в вакууме. Получают 2,4 г (64,8%) аминоспирта IX. Т. кип. 135—138°/3 мм, n_D^{20} 1,4810. Найдено %: С 64,21; Н 11,23; N 7,55. $C_{10}H_{21}NO_2$. Вычислено %: С 64,13; Н 11,29; N 7,47. Оксалат, т. пл. 68°. Найдено %: N 4,98. $C_{12}H_{23}NO_6$. Вычислено %: N 5,05.

б) Аналогично из 3 г (0,016 моля) оксинитрила XI и 2 г (0,053 моля) алюмогидрида лития получают 2,5 г (83,3%) аминопропанола IX. Т. кип. 130—133°/2 мм, n_D^{20} 1,4800. Найдено %: С 64,02; Н 11,20; N 7,38. $C_{10}H_{21}NO_2$. Вычислено %: С 64,13; Н 11,29; N 7,47.

1-Окси-1-(2-метил-2-этил-4-тетрагидропиранил)-γ-аминопропан (X).

Аналогично из 5 г (0,025 моля) глицидонитрила VI и 2,5 г (0,06 моля) АГЛ получают 4,7 г (92,1%) аминопропанола X. Т. кип. 152—154°/2 мм, n_D^{20} 1,4920. Найдено %: С 65,58; Н 11,60; N 6,98. $C_{11}H_{23}NO_2$. Вычисле-но %: С 65,63; Н 11,51; N 6,95. Оксалат, т. пл. 91°. Найдено %: N 4,87. $C_{13}H_{25}NO_6$. Вычислено %: N 4,80.

1-(2,2-Диметил-4-тетрагидропиранил)пропандиол-1,3 (VII). а) Ана-логично из 1,3 г (0,034 моля) АГЛ и 5,5 г (0,024 моля) глицидоэфира III получают 3,2 г (71,5%) пропандиола VII. Т. кип. 148—150°/2 мм, n_D^{20} 1,4830. Найдено %: С 63,84; Н 10,81. $C_{10}H_{20}O_3$. Вычислено %: С 63,79; Н 10,70.

б) Аналогично из 5,6 г (0,024 моля) этилового эфира β-окси-β-(2,2-диметил-4-тетрагидропиранил)пропионово́й кислоты и 0,8 г (0,02 моля) АГЛ получают 4,1 г (91,1%) диола VII. Т. кип. 150°/2 мм, n_D^{20} 1,4825. Найдено %: С 63,86; Н 11,18. $C_{10}H_{20}O_3$. Вычислено %: С 63,79; Н 10,70.

в) К смеси 3,7 г (0,02 моля) аминопропанола IX, 1,3 мл уксусной кис-лоты и 14 мл воды при комнатной температуре и энергичном переме-шивании медленно добавляют раствор, приготовленный из 1,6 г азотис-токислого натрия и 7 мл воды, затем нагревают 30 мин. на водяной ба-не, охлаждают, нейтрализуют раствором соды, экстрагируют эфиром.

сушат над сульфатом магния и после отгонки эфира остаток перегоняют в вакууме. Получают 1,4 г (38%) диола VII. Т. кип. 166—168°/4 мм, n_D^{20} 1,4835. Найдено %: С 63,67; Н 10,61. $C_{10}H_{20}O_3$. Вычислено %: С 63,79; Н 10,70.

1-(2-Метил-2-этил-4-тетрагидропиранил)пропандиол-1,3 (VIII). Аналогично получению VII (опыт б) из 3,7 г (0,024 моля) этилового эфира β -окси- β -(2-метил-2-этил-4-тетрагидропиранил)пропионовой кислоты и 0,8 г (0,02 моля) АГЛ получают 2,4 г (85%) диола VIII. Т. кип. 165°/2 мм, n_D^{20} 1,4870. Найдено %: С 63,80; Н 10,63. $C_{11}H_{22}O_3$. Вычислено %: С 65,31; Н 10,96.

Амид β -(2,2-диметил-4-тетрагидропиранил)глицидной кислоты (XII). В ампулу помещают 3,4 г (0,015 моля) глицидоэфира III и 1 г (0,015 моля) 25% водного аммиака, запаивают и оставляют до тех пор, пока реакционная масса становится гомогенной (около 48 час.). После удаления непрореагировавшего аммиака и воды остается вязкий остаток, кристаллизующийся в течение нескольких часов. Получают 1,6 г (55,1%) амида XII. Т. пл. 120°. Найдено %: С 60,33; Н 8,63; N 7,11. $C_{10}H_{17}NO_3$. Вычислено %: С 60,28; Н 8,60; N 7,03.

Амид β -(2-метил-2-этил-4-тетрагидропиранил)глицидной кислоты (XIII). Аналогично из 5 г (0,02 моля) глицидоэфира IV получают 1,8 г (42,6%) амида XIII, т. пл. 129°. Найдено %: С 61,87; Н 9,03; N 6,61. $C_{11}H_{19}NO_3$. Вычислено %: С 61,94; Н 8,97; N 6,56.

5-(2,2-Диметил-4-тетрагидропиранил)-4-оксипиразолидон-3 (XIV). Смесь 4,5 г (0,02 моля) глицидоэфира III и 1 г (0,02 моля) гидразингидрата нагревают в колбе с обратным холодильником при 100—110° 30 мин. Получают 2,9 г (70,4%) пиразолидона XIV. Т. пл. 144° (этанол). Найдено %: С 56,12; Н 8,38; N 13,13. $C_{10}H_{18}N_2O_3$. Вычислено %: С 56,05; Н 8,46; N 13,07.

5-(2-Метил-2-этил-4-тетрагидропиранил)-4-оксипиразолидон-3 (XV). Аналогично из 4,8 г (0,02 моля) глицидоэфира IV и 1 г (0,02 моля) гидразингидрата получают 2,5 г (55,5%) пиразолидона XV. Вязкая масса, не кристаллизуется при стоянии. Найдено %: С 57,79; Н 8,78; N 12,32. $C_{11}H_{20}N_2O_3$. Вычислено %: С 57,87; Н 8,83; N 12,27. Структура полученных оксипиразолидонов (XIV—XV) подтверждена методами масс-спектрометрии и ИК спектров, где найдены характерные частоты поглощения $C=O$ (1650 см^{-1}), OH (3540 см^{-1}) и NH ($3200, 3350\text{ см}^{-1}$).

Аминоэфиры β -(2,2-диалкил-4-тетрагидропиранил)глицидных кислот (XVI—XXI). Смесь, приготовленную из 0,02 моля натриевой соли β -(2,2-диалкил-4-тетрагидропиранил)глицидной кислоты, полученной по методу [6], 0,022 моля γ -диалкиламинопропилхлорида и 30 мл диметилформамида при перемешивании нагревают 8 час. при 100—110°. Отгоняют растворитель, экстрагируют эфиром, промывают водой, сушат над сульфатом магния. После отгонки эфира остаток перегоняют в вакууме. Выходы и константы аминоэфиров XVI—XXI приведены в таблице.

1-Бутоксид-2-(2,2-диметил-4-тетрагидропиранил)этилен (XXII). К 19,3 г (0,05 моля) измельченного хлористого бутоксиэтилтрифенилфос-

фония в 100 мл абс. эфира при перемешивании в токе азота прикапывают 0,05 моля свежеприготовленного эфирного раствора фениллития при $-30 \div -10^\circ$. Через 20—25 мин. к темно-красному раствору карбэтоксиметилентрифенилфосфорана добавляют 7,1 г (0,05 моля) 2,2-диметил-4-формилтетрагидропирана в 20 мл эфира, температуру доводят до -30° . После 18 час. перемешивания эфирный раствор отделяют от осадка, промывают водой, сушат над сернокислым магнием и после отгонки эфира остаток перегоняют в вакууме. Получают 5,6 г (52,8%) эфира XXII. Т. кип. $113-114^\circ/6$ мм, n_D^{20} 1,4700, d_4^{20} 0,9282. Найдено %: С 73,64; Н 11,45. $C_{13}H_{24}O_2$. Вычислено %: С 73,53; Н 11,39.

Таблица

Аминоэфиры XVI—XXI

R	R ₁	Выход, %	Т. кип., °С/мм	n_D^{20}	С, %		Н, %		N, %		Т. пл. оксалата (гидрокси- рида), °С
					найде- но	вычис- лено	найде- но	вычис- лено	найде- но	вычис- лено	
CH ₃	(CH ₂) ₃ N(CH ₃) ₂	61	162—164/2	1,4700	63,22	63,13	9,64	9,53	4,81	4,90	61
CH ₃	(CH ₂) ₃ N(C ₂ H ₅) ₂	62	178—180/2	1,4710	65,07	65,14	9,84	9,96	4,58	4,46	57
CH ₃	(CH ₂) ₃ N	53	210—213/3	1,4815	66,51	66,43	9,51	9,60	4,33	4,30	56
CH ₃	(CH ₂) ₃ N	51	215—217/2	1,4830	62,27	62,36	9,06	8,92	4,15	4,27	81
C ₂ H ₅	(CH ₂) ₃ N(CH ₃) ₂	66	168—170/2	1,4720	64,26	64,18	9,83	9,76	4,60	4,67	77
C ₂ H ₅	(CH ₂) ₃ N	61	194—196/1	1,4845	62,29	67,22	9,68	9,79	4,20	4,12	(51)

1-Бутокси-2-(2-метил-2-этил-4-тетрагидропиранил)этилен (XXIII). Аналогично из 15,6 г (0,1 моля) 2-метил-2-этил-4-формилтетрагидропирана, 0,1 моля фениллития и 38,9 г (0,1 моля) хлористого бутакоиметилтрифенилфосфония получают 8,7 г (38,4%) эфира XXIII. Т. кип. $106-110^\circ/2$ мм, n_D^{20} 1,4730, d_4^{20} 0,9210. Найдено %: С 74,16; Н 11,65. $C_{14}H_{26}O_2$. Вычислено %: С 74,28; Н 11,57.

2,2-Диметил-4-тетрагидропиранацетальдегид (XXV). а) Сухую β-(2,2-диметил-4-тетрагидропиранил)глицидную кислоту XXIV, полученную гидролизом 35 г (0,15 моля) глицидоэфира III, без дополнительной очистки подвергают декарбоксилированию в 100 мл хинолина в присутствии 1 г порошка меди при $120-170^\circ$ (около 4 час). Реакционную смесь охлаждают, подкисляют 15% соляной кислотой до кислой реакции и подвергают перегонке с водяным паром, затем дистиллят насыщают поваренной солью, экстрагируют эфиром, сушат над сернокислым магнием и после отгонки эфира остаток перегоняют в вакууме. Получают 7,3 г (30,7%) альдегида XXV. Т. кип. $68-70^\circ/2$ мм, n_D^{20} 1,4600, d_4^{20} 0,9865.

Найдено %: С 68,90; Н 10,48. $C_9H_{16}O_2$. Вычислено %: С 69,19; Н 10,32.
2,4-Динитрофенилидразон (ДНФГ) (спирт). т. пл. 141°. Найдено %:
N 16,69. $C_{15}H_{20}N_4O_5$. Вычислено %: N 16,65.

б) Смесь 21,2 г (0,1 моля) бутоксиэтилена XXII и 300 мл 0,4 н сер-
ной кислоты перемешивают 10 час. при 30—35°. Раствор нейтрализуют
поташом при охлаждении льдом, экстрагируют эфиром. После удале-
ния эфира остаток перегоняют в вакууме. Получают 7,5 г (48,1%) аце-
тальдегида XXV. Т. кип. 74—78°/3 мм, n_D^{20} 1,4610, d_4^{20} 0,9865. Найдено %:
С 68,96; Н 10,44. $C_9H_{16}O_2$. Вычислено %: С 69,19; Н 10,32. Хроматограм-
мы полученных альдегидов идентичны.

2-Метил-2-этил-4-тетрагидропиририлацетальдегид (XXVI). Анало-
гично из 16 г (0,07 моля) бутоксиэтилена XXIII получают 7 г (56,9%)
альдегида XXVI. Т. кип. 82°/3 мм, n_D^{20} 1,4770, d_4^{20} 0,9793. Найдено %:
С 70,38; Н 10,53. $C_{10}H_{18}O_2$. Вычислено %: С 70,54; Н 10,65. 2,4-ДНФГ
(спирт), т. пл. 131°. Найдено %: N 16,41. $C_{16}H_{22}N_4O_5$. Вычислено %:
N 15,99.

Этиловый эфир α -окси- β -хлор- β -(2,2-диметил-4-тетрагидропиририл)-
пропионовой кислоты (XXVII). а) Смесь 7,2 г (0,04 моля) глицидонитри-
ла V и 50 мл абс. этанола при 5—10° насыщают сухим хлористым водо-
родом, затем отгоняют этанол, остаток растворяют в 15 мл воды, экстра-
гируют эфиром, сушат над сернокислым магнием и после отгонки эфи-
ра остаток перегоняют в вакууме. Получают 7 г (84,5%) эфира оксипро-
пионовой кислоты XXVII. Т. кип. 150—153°/3 мм, n_D^{20} 1,4795. Найдено %:
С 54,33; Н 7,82; Cl 13,28. $C_{12}H_{21}ClO_4$. Вычислено %: С 54,44; Н 7,99;
Cl 13,39.

б) Через раствор 8,8 г (0,04 моля) оксинитрила XXX в 20 мл абс.
этанола при 0—5° пропускают сухой хлористый водород до насыщения,
затем отгоняют спирт, остаток растворяют в 16 мл воды, экстрагируют
эфиром, сушат над сульфатом магния и после отгонки эфира остаток
перегоняют в вакууме. Получают 6,4 г (61,1%) эфира оксипропионовой
кислоты XXVII. Т. кип. 142—145°/2 мм, n_D^{20} 1,4790. Найдено %: С 54,57;
Н 8,12; Cl 13,46. $C_{12}H_{21}ClO_4$. Вычислено %: С 54,54; Н 7,99; Cl 13,39.

в) Аналогично опыту а) из 22,8 г (0,1 моля) глицидоэфира III полу-
чают 21,1 г (85%) эфира оксипропионовой кислоты XXVII. Т. кип. 132—
134°/1 мм, n_D^{20} 1,4785. Найдено %: С 54,52; Н 7,91; Cl 13,46. $C_{12}H_{21}ClO_4$.
Вычислено %: С 54,44; Н 7,99; Cl 13,39.

Хроматограммы полученных этиловых эфиров α -окси- β -хлор- β -(2,2-
диметил-4-тетрагидропиририл)пропионовых кислот идентичны.

Этиловый эфир α -окси- β -хлор- β -(2-метил-2-этил-4-тетрагидропири-
рил)пропионовой кислоты (XXVIII). Аналогично получению XXVI
(опыт а) из 12,1 г (0,05 моля) этилового эфира β -(2-метил-2-этил-4-тет-
рагидропиририл)глицидной кислоты получают 12,5 г (90%) эфира α -ок-
сипропионовой кислоты XXVIII. Т. кип. 157—160°/3 мм, n_D^{20} 1,4800. Най-
дено %: С 56,18; Н 8,22; Cl 12,63. $C_{13}H_{23}ClO_4$. Вычислено %: С 56,00;
Н 8,31; Cl 12,71.

α -Хлор- α -(2,2-диметил-4-тетрагидропиранил)ацетальдегид (XXIX).

а) Через смесь 10,3 г (0,066 моля) альдегида XXV в 50 мл четыреххлористого углерода при 5—10° в течение 2 час. пропускают несколько больше рассчитанного количества хлора. После отгонки растворителя остаток перегоняют в вакууме. Получают 7,5 г (60%) α -хлоральдегида XXIX. Т. кип. 102—103°/2 мм, n_D^{20} 1,4740, d_4^{20} 1,0765. Найдено %: С 56,82; Н 7,78; Cl 18,67. $C_9H_{15}ClO_2$. Вычислено %: С 56,69; Н 7,92; Cl 18,59. 2,4-ДНФГ, т. пл. 230°. Найдено %: N 15,13. $C_{15}H_{19}N_4ClO_5$. Вычислено %: N 15,02.

б) Смесь 10,9 г (0,05 моля) оксинитрила XXX и 0,05 моля 15% раствора поташа нагревают 1 час при 40°, экстрагируют эфиром, промывают водой, сушат над серноокислым магнием и после отгонки эфира остаток перегоняют в вакууме. Получают 4,1 г (43,3%) хлорацетальдегида XXIX. Т. кип. 100°/2 мм, n_D^{20} 1,4760. Найдено %: С 56,60; Н 8,00; Cl 18,47. $C_9H_{15}ClO_2$. Вычислено %: С 56,69; Н 7,92; Cl 18,59. По ГЖХ, полученные продукты идентичны.

α -Окси- β -хлор- β -(2,2-диметил-4-тетрагидропиранил)пропионитрил (XXX).

а) Через раствор 7,2 г (0,04 моля) глицидонитрила V в 50 мл сухого эфира при 5—10° в течение 1,5 часа пропускают ток хлористого водорода. Смесь охлаждают ниже 0°, нейтрализуют 10% раствором поташа, экстрагируют эфиром, промывают водой и сушат над сульфатом магния. После отгонки эфира остаток перегоняют в вакууме. Получают 4,8 г (55,8%) оксинитрила XXX. Т. кип. 134—137°/3 мм, n_D^{20} 1,4875. Найдено %: С 55,28; Н 7,51; N 6,34; Cl 16,20. $C_{10}H_{16}NClO_2$. Вычислено %: С 55,17; Н 7,40; N 6,43; Cl 16,28.

б) К смеси 4,4 г (0,02 моля) α -хлор- α -(2,2-диметил-4-тетрагидропиранил)ацетальдегида XXIX и 10 мл 40% раствора бисульфита натрия, охлажденной до 0°, при перемешивании медленно прибавляют раствор 2 г (0,03 моля) цианистого калия в 10 мл воды, поддерживая температуру реакционной смеси в пределах 0—5°. Перемешивание продолжают еще 1 час, реакционную смесь насыщают поваренной солью и трижды экстрагируют эфиром. Эфирные вытяжки соединяют и сушат над сульфатом магния. После отгонки эфира остаток перегоняют в вакууме. Получают 3,6 г (72%) оксинитрила XXX. Т. кип. 133°/3 мм, n_D^{20} 1,4870. Найдено %: С 55,08; Н 7,53; N 6,51; Cl 16,36. $C_{10}H_{16}NClO_2$. Вычислено %: С 55,17; Н 7,40; N 6,43; Cl 16,28. Хроматограммы оксинитрилов, полученных обоими методами, идентичны.

α -Окси- β -хлор- β -(2-метил-2-этил-4-тетрагидропиранил)пропионитрил (XXXI).

Аналогично получению XVIII (опыт а) из 7,8 г (0,04 моля) глицидонитрила VI получают 5,1 г (54,2%) оксинитрила XXXI. Т. кип. 146—149°/2 мм, n_D^{20} 1,4945. Найдено %: С 57,12; Н 7,73; N 6,11; Cl 15,15. $C_{11}H_{18}NClO_2$. Вычислено %: С 57,01; Н 7,82; N 6,04; Cl 15,30.

ՏԵՏՐԱՀԻԴՐՈՊԻՐԱՆԱՅԻՆ ՇԱՐՔԻ ԳԼԻՑԻԴԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐԻ
ԵՎ ՆԻՏՐԻԼՆԵՐԻ ՍԻՆԹԵԶԸ ԵՎ ՈՐՈՇ ՓՈՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԸ

Թ. Հ. ԿՈՒՌՈՅԱՆ, Ն. Ա. ՉԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ և Ս. Հ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

2,2-Դիմթեիլ-4-ֆորմիլ- և 2-մեթիլ-2-էթիլ-4-ֆորմիլտետրաֆորմալդեհիդրոպիրան-
ները կոնդենսելով ջրորոգացախաթթվի էթիլ էսթերի և ջրորացետոնիտրիլի հետ
համապատասխանաբար ստացվել են գլիցիդային թթուների էսթերներ և նիտ-
րիլներ, որոնք լիթիումի ալյումոհիդրիդով վերականգնելով առաջացնում են
1,3-դիոլներ VII, VIII և γ -ամինոսպիրտներ IX, X:

1:1 հարաբերությամբ վերցրած գլիցիդային թթուների էսթերների և ամո-
նիակի ռեակցիայի հետևանքով առաջանում են ամիդներ XII, XIII, իսկ հիդ-
րազինհիդրատի հետ փոխազդելիս առաջացնում են օքսիպիրազոլիդոններ
XIV, XV:

Ջրորազրածնի հետ փոխազդելիս ինչպես գլիցիդային թթուների էսթեր-
ները, այնպես էլ նիտրիլները առաջացնում են β -ջրոր- α -օքսի ածանցյալներ,
որոնց կառուցվածքը հաստատվել է հանդիպակաց սինթեզով:

SYNTHESIS AND SOME TRANSFORMATIONS OF GLYCIDIC ACID
ESTERS AND NITRILES OF TETRAHYDROPYRAN SERIES

R. H. KUROYAN, N. S. AROUTYUNIAN and S. A. VARTANIAN

Condensation of 2,2-dimethyl-4-formyl- and 2-methyl-2-ethyl-2-for-
myl-tetrahydropyrans with ethyl chloroacetate and chloroacetonitrile led
to the formation of glycidic acid esters and nitriles, respectively, which,
upon reduction with lithium aluminum hydride, gave the 1,3-diols VII
and VIII and the γ -aminoalcohols IX and X.

The glycidic acid esters reacted with ammonia in a ratio of 1:1
producing the amides XII, XIII and with hydrazine hydrate to yield the
oxypyrazolidones XIV and XV.

Both the glycidic acid esters and the nitriles react with hydrogen
chloride to give β -chloro- α -oxy derivatives, the structure of which was
demonstrated by alternative synthesis.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Р. А. Куроян, С. А. Минасян, С. А. Варганян, Арм. хим. ж., 28, 141 (1975).
2. Р. А. Куроян, С. А. Минасян, С. А. Варганян, Арм. хим. ж., 28, 559 (1975).
3. Р. А. Куроян, С. А. Минасян, С. А. Варганян, Арм. хим. ж., 28, 209 (1975).
4. С. А. Варганян, Р. А. Куроян, С. А. Минасян, Арм. хим. ж., 25, 173 (1972).
5. Р. А. Куроян, С. А. Минасян, С. А. Варганян, Арм. хим. ж., 28, 209 (1975).
6. С. А. Варганян, Р. А. Куроян, С. А. Минасян, Арм. хим. ж., 24, 225 (1973).