ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДНЫХ САРКОЗИНА МЕТОДОМ ИК СПЕКТРОСКОПИИ

Л. В. ХАЖАКЯН, А. Г. ДАВТЯН и А. Г. АГАБАБЯН

Институт тонкой органической химии им. А. Л. Мнджояна
 АН Армянской ССР, Ереван

Поступило 10 VIII 1979

Изучены ИК спектры N-[β-(п-алкоксибензоил)этил]глицинов, их этиловых эфиров и гидрохлоридов. Установлено, что свободная аминогруппа присутствует только в молекулах эфиров. В гидрохлоридах кислот кетонный кислород образует межмолекулярную водородную связь с гидроксилом. Показано, что длина радикала R₁ не влияет на внутри- и межмолекулярные взаимодействия.

Рис. 1, табл. 1, библиографические ссылки 5.

Ранее нами был синтезирован и проверен на биологическую активность с целью получения новых лекарственных веществ из серии N-производных глицина (саркозина) ряд N-[β-(п-алкоксибензоил)этил]глицинов и их производных [1].

Строение саркозина изучено Новаком [2], Липпинкоттом [3], Киршенбаумом [4], Ватсоном [5] и другими. Даны характеристики основных частот, высказано предположение о циклическом строении биполярного иона саркозина. Однако производные его мало изучены.

Настоящая статья посвящена изучению строения производных саркозина общей формулы

R₁=CH₃,..., C₅H₁₁, включая *цис*-радикалы; R₂=H, C₂H₅

а также гидрохлоридов как свободных кислот (R₂=H), так и эфиров (R₂=C₂H₅).

В изучаемых соединениях кетогруппа, эфирный карбонил и ароматическое ядро могут влиять на меж- или внутримолекулярные взаимодействия и сместить в молекуле центры, ответственные за биологические свойства.

В спектрах всех соединений есть полосы поглощения, присущие ароматическим ядрам (3030, 1600, 1580 см⁻¹).

При постановке задачи нас интересовали частоты, характерные для групп NH_2 , NH , COO^- , OH , $\text{C}=\text{O}$ (кетона), $\text{C}=\text{O}$ (кислоты). Так как в этих областях спектры гомологов практически идентичны, приводятся данные только для соединений с $\text{R}_1=\text{C}_2\text{H}_5$ (рис. и табл.).

Рис. 1.

Как и следовало ожидать, аминокислоты *a* (табл.) проявляют себя как цвиттер-ионы. Доказательством этого служит отсутствие у этих соединений характерных полос группы OH . Вместо этого появляются частоты, присущие группе NH_2^+ : четкая и сильная полоса $\nu_{\text{NH}_2^+}$ (3085 см^{-1}), $\delta_{\text{NH}_2^+}$ (1625 см^{-1}), как плечо к сильному поглощению COO^- при 1608 см^{-1} и ароматического ядра, а также полоса средней интенсивности $\rho_{\text{NH}_2^+}$ (908 см^{-1}). Вместо полосы поглощения кислотного карбонила обнаружена полоса, характерная для ионизированных карбоксильных групп COO^- (1608 см^{-1}).

Амидная полоса, которая, по всей вероятности, находится около 1475 см^{-1} , не всегда четко выражена и проявляется в виде слабого плеча к основному колебанию вазелинового масла.

Таблица

Данные ИК спектров изучаемых соединений, см^{-1}

$\overset{+}{\text{R}}\text{NH}_2\text{CH}_2\text{COO}^-$ <i>a</i>	$[\text{RNH}_2\text{CH}_2\text{COOH}]^+\text{Cl}^-$ <i>b</i>	$\text{RNHCH}_2\text{COC}_2\text{H}_5$ <i>c</i>	$[\text{RNH}_2\text{CH}_2\text{COC}_2\text{H}_5]^+\text{Cl}^-$ <i>d</i>
3085 $\nu_{\text{NH}_2}^+$	3055 $\nu_{\text{NH}_2}^+$	3445 ν_{NH}	3085 $\nu_{\text{NH}_2}^+$
	2770 ν_{OH}		
	1755 $\nu_{\text{C=O}}$	1755 $\nu_{\text{C=O}}$	1745 $\nu_{\text{C=O}}$
1675 $\nu_{\text{C=O}}$	1662 $\nu_{\text{C=O}}$	1685 $\nu_{\text{C=O}}$	1675 $\nu_{\text{C=O}}$
1625 $\delta_{\text{NH}_2}^+$	1635 $\nu_{\text{NH}_2}^+$		1625 $\delta_{\text{NH}_2}^+$
1608 ν_{COO^-}			
908 $\rho_{\text{NH}_2}^+$	908 $\rho_{\text{NH}_2}^+$		908 $\rho_{\text{NH}_2}^+$

* Все соединения с группой >NH_2^+ имеют слабые частоты в области $2700-2300 \text{ см}^{-1}$. 1 — кислотный, 2 — сложноефирный, 3 — кетонный

Доказательством цвиттерионной структуры этих кислот являются и полосы поглощения $2750, 2620, 2550 \text{ см}^{-1}$. Частота $\nu_{\text{C=O}}$ кетона, проявляющаяся при 1675 см^{-1} , очень близка к описанным в литературе частотам карбонильной группы, сопряженной с ароматическим ядром.

При переходе к гидрохлоридам (*b*) появляются частоты $1755 (\nu_{\text{C=O}}$ кислоты) и $2770 \text{ см}^{-1} (\nu_{\text{OH}})$. Поглощение $\nu_{\text{NH}_2}^+$, по сравнению с цвиттерионной структурой, менее четко выражено, смещено на 30 см^{-1} и появляется при 3055 см^{-1} , $\delta_{\text{NH}_2}^+$ смещается до 1635 см^{-1} , частота кетогруппы снижается до 1662 см^{-1} , что, возможно, связано с межмолекулярным взаимодействием кето- и гидроксильной групп в кристаллах. Длина радикала R_1 не влияет на меж- или внутримолекулярное взаимодействие. В эфирах кислот (*c*) и их гидрохлоридах (*d*), где нет гидроксильных групп и взаимодействие между молекулами за счет $\text{C=O} \cdots \text{HO}$ отсутствует, частота поглощения кетогруппы повышается до 1685 см^{-1} .

Полоса поглощения ν_{NH} (3445 см^{-1}), появляющаяся в спектрах эфиров (*c*), доказывает наличие неассоциированной аминогруппы.

У гидроклоридов эфиров свободная NH группа отсутствует; здесь также обнаруживается ион NH_2^+ с частотами 3085, 1625 и 908 см^{-1} . Полоса поглощения кетогруппы находится вблизи нормального значения — 1675 см^{-1} .

Экспериментальная часть

ИК спектры сняты на приборе UR-20; вещества взяты в виде пасты с вазелиновым маслом. Чистота и индивидуальность полученных соединений проверялись также методами ГЖХ на хроматографе «Хром-4» и тонкослойной хроматографией на закрепленном слое силикагель-гипс.

ՍԱՐԿՈՋԻՆԻ ՄԻ ՇԱՐՔ ԱՇԱՆՑՅԱԼՆԵՐԻ ՌԻՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՎ ՍՊԵԿՏՐԱԼ ԱՆԱԼԻԶԻ ՄԻՋՈՑՈՎ

Լ. Վ. ԽԱՅԿԻԱՆ, Ա. Գ. ԴԱՎԹՅԱՆ և Հ. Գ. ԱՂԱԲԱԲԻԱՆ

Հետազոտված է N-[β-(պ-ալկոքսիբենզոյլ)էթիլ]գլիցինների, նրանց էթիլ էսթերների և հիդրոքլորիդների իվ սպեկտրները:

Ցույց է տրված, որ միայն թթվի էսթերներն ունեն ազատ ամինային խումբ: Մյուս բոլոր խմբերում ազոտը հանդես է գալիս NH_2^+ ձևով: Թթուների հիդրոքլորիդներում կետոնային թթվածինը միջմոլեկուլյար ջրածնային կապ է գոյացնում հիդրոքսիլ խմբի հետ: Հաստատված է, որ R_1 ռադիկալի հրկարությունը չի ազդում ներ- և միջմոլեկուլյար կապի վրա:

STUDY OF A NUMBER SARKOSINE DERIVATIVES BY MEANS OF IR SPECTRAL ANALYSIS

L. V. KHAZHAKIAN, A. G. DAVTIAN and A. G. AGABABIAN

The IR spectra of N-[β-(p-alkoxybenzoyl)ethyl]-glycines, their ethyl esters and hydrochlorides have been investigated. It has been shown that only the esters have a free amine group. In all other groups the nitrogen is in the form of NH_2^+ . The ketonic oxygen in the hydrochlorides of the acids forms an intermolecular hydrogen bond with the hydroxyl group. It has been established that the intra- and intermolecular bonds are not affected by the length of the R_1 radical.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. А. Г. Агаббян, Г. А. Геворгян и др., Хим.-фарм. ж., 9, 73 (1977).
2. A. Novak, M. Cotrait, Ann. Chim., 1, 263 (1966).
3. A. Lelfer, E. R. Lippincott, J. Am. Chem. Soc., 79, 5098 (1957).
4. D. M. Kirschenbaum, Appl. Spectroscopy, 17, 149 (1963).
5. C. C. Watson, Spectrochim. Acta, 16, 1322 (1960).