РЕАКЦИИ НЕПРЕДЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

LXXII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АЛЛЕНИЛАЦЕТИЛЕНОВЫХ ХЛОРИДОВ
 С АМИНАМИ. НОВЫЙ СИНТЕЗ ЕНИНОВЫХ ДИАМИНОВ

А. П. ХРИМЯН, А. В. КАРАПЕТЯН и Ш. О. БАДАНЯН

Институт органической химии АН Армянской ССР, Ереван

Поступило 12 V 1980

Синтезированы различные алленилацетиленовые хлориды из соответствующих спиртов. Показано, что взаимодействие первичных, вторичных и третичных алленилацетиленовых хлоридов с диметиламином и пиперидином приводит к ениновым диаминам. В случае третичных хлоридов предполагается, что реакция протекает с промежуточным образованием винилбутатриеновых аминов, которые, в зависимости от применяемого амина и условий реакции, подвергаются либо нуклеофильному присоединению либо прототропной изомеризации.

Библ. ссылок 3.

С целью разработки метода синтеза ениновых диаминов—потенциально физиологически активных соединений [1], в настоящей работе нами изучено взаимодействие алленилацетиленовых хлоридов II со вторичными аминами.

Синтез хлоридов II осуществлен из соответствующих карбинолов I, полученных, в свою очередь, конденсацией ацетиленовых спиртов с хлористым пропаргилом [2].

а. R¹=R²=H; б. R¹=CH₃, R²=C₂H₅; в. R¹, R²=(CH₂)₅; г. R¹=C₃H₇, R²=H

Показано, что взаимодействие третичного хлорида IIб с диметиламином при -10° и соотношении реагентов 1 : 4 приводит к ениновому

диамину IIIб. Методом ИК спектроскопии зафиксирован промежуточный винилбутатриеновый амин (полоса 2050 см^{-1}). По аналогии с винилацетиленовыми хлоридами [3] можно предположить, что на первой стадии происходит замещение с 1,5-перегруппировкой, с последующим присоединением второй молекулы амина к винилбутатриеновому интермедиату.

Первичный и вторичный алленилацетиленовые хлориды IIа и г в тех же условиях не образуют винилбутатриенового интермедиата, хотя и в конечном итоге приводят к виниловым диаминам III а и г. Здесь, по-видимому, имеет место замещение без переноса реакционного центра с последующим присоединением амина по алленовой группировке.

Интересный путь стабилизации промежуточного неустойчивого винилбутатриенового амина (полоса 2050 см^{-1} в ИК спектре сырой смеси) зафиксирован при реакции 6-хлор-6-метил-1,2-гептадиен-4-ина с диэтиламиноном.

Показано, что осуществление процесса при -10° и соотношении реагентов 1:2 приводит с 40% выходом к 1,5-диметил-1,5-гексадиен-3-инилдиэтиламину IV—продукту катализируемой диэтиламиноном протропной изомеризации промежуточного винилбутатриенового амина. При увеличении мольной доли диэтиламина (соотношение хлорид:амин=1:4) наряду с указанной реакцией удается наблюдать ранее описанный нами вариант превращения интермедиата—нуклеофильное присоединение второй молекулы амина с образованием Va. Однако в отличие от аналогичных реакций с диметиламиноном и пиперидином [1] нам не удалось найти условий, позволяющих выделить Va в чистом виде.

1) $(\text{CH}=\text{C}=\text{CH}_2)$, 2230 ($\text{C}\equiv\text{C}$). ПМР спектр, δ , м. д.: 0,9 т (3H, $J=7$ Гц), 1,55 м (4H). 3,12 с (1H), 4,4 т (1H, $J=6$ Гц), 4,9—5,5 м (3H).

6-Хлор-1,2-нонадиен-4-ин (IIг). 6,3 г (0,033 моля) *n*-толуолсульфохлаорида растворяют в 20 мл ДМФА, содержащего 2,3 г (0,03 моля) сухого пиридина. К полученной смеси в токе азота при 25—28° добавляют раствор 4 г (0,03 моля) Iг в 5 мл ДМФА. Смесь перемешивают 4 ч при 25°, затем прибавляют 5 г безводного LiCl и перемешивают 2 ч при 40—50° в атмосфере азота. Далее к смеси прибавляют 40 мл воды и экстрагируют эфиром. Эфирный слой промывают водой, разб. HCl, водой и высушивают над CaCl₂. После удаления эфира остаток перегоняют в вакууме. Выделено 2,8 г (60,9%) Iг, т. кип. 58—60°/1 мм, n_D^{20} 1,5130. Чистота 93% по ГЖХ. Найдено %: С 70,47; Н 7,27. C₉H₁₁Cl. Вычислено %: С 69,9; Н 7,11. ИК спектр, ν , см⁻¹: 1950, 850 ($\text{CH}=\text{C}=\text{CH}_2$), 2240 ($\text{C}\equiv\text{C}$). ПМР спектр, δ , м. д.: 0,9 т; (3H, $J=7$ Гц), 1,2—2 м (4H), 4,6 м (1H), 4,9—5,5 м (3H).

6-Хлор-1,2-гексадиен-4-ин (IIа). Получают аналогично предыдущему из 0,61 моля Ia действием 0,11 моля *n*-толуолсульфохлаорида в 40 мл ДМФА, содержащего 0,1 моля пиридина, с последующей обработкой смеси 12 г сухого LiCl. Выход 63%, т. кип. 44—45°/2 мм, n_D^{20} 1,5480. Чистота 95% по ГЖХ. ИК спектр, ν , см⁻¹: 1950, 850 ($\text{CH}=\text{C}=\text{CH}_2$), 2250 ($\text{C}\equiv\text{C}$). ПМР спектр, δ , м. д.: 4,25 м (2H), 4,9—5,5 м (3H).

6-Хлор-6-метил-1,2-октадиен-4-ин (IIб). 4,5 г (0,033 моля) карбинола Ib насыщают хлористым водородом (1,2 г) при 0 + —5°. Обработавшуюся воду отделяют, верхний слой промывают водой, высушивают над CaCl₂, перегоняют. Получают 4,1 г (82%) IIб, т. кип. 40—41°/1 мм, n_D^{20} 1,5148. Чистота 95% по ГЖХ. Найдено %: С 70,20; Н 6,78; Cl 22,71. C₉H₁₁Cl. Вычислено %: С 69,90; Н 7,12; Cl 22,97. ИК спектр, ν , см⁻¹: 1940, 850 ($\text{CH}=\text{C}=\text{CH}_2$), 2230 ($\text{C}\equiv\text{C}$). ПМР спектр, δ , м. д.: 1,09 т (3H, $J=7$ Гц), 1,78 с (3H), 1,9 кв (2H, $J=7$ Гц), 4,9—5,5 м (3H).

5-(1-Хлорциклогексил)-1,2-пентадиен-4-ин (IIв). Из 4 г (0,037 моля) карбинола Iv и 1,27 г (0,037 моля) HCl аналогично предыдущему получают 3,4 г (51%) IIв, т. кип. 80—82°/1 мм, n_D^{20} 1,5420. Чистота 96% по ГЖХ. Найдено %: С 73,28; Н 7,19; Cl 19,85. C₁₁H₁₃Cl. Вычислено %: С 73,12; Н 7,20; Cl 19,66. ИК спектр, ν , см⁻¹: 1950, 855 ($\text{CH}=\text{C}=\text{CH}_2$), 2230 ($\text{C}\equiv\text{C}$). ПМР спектр, δ , м. д.: 1,3—1,8 м (6H), 1,8—2,2 м (4H), 4,9—5,5 м (3H, м).

N,N,N',N'-Тетраметил-6-метил-2-октен-4-ин-2,6-диамин (IIIб). К раствору 1,5 г (0,01 моля) хлорида Ib и 7 мл абс. эфира прибавляют при —10° 1,8 г (0,04 моля) диметиламина (DMA). Смесь выдерживают при 0° 1 сутки и еще 1 сутки при 20°. Затем ампулу вскрывают, содержимое фильтруют, осадок промывают абс. эфиром, эфирный слой добавляют к фильтрату. После удаления эфира остаток перегоняют в вакууме. Выделяют 1,1 г (55,5%) IIIб, т. кип. 98°/1 мм.

d_D^{20} 1,5341. Найдено %: С 74,65; Н 11,54; N 13,78. $C_{13}H_{21}N_2$. Вычислено %: С 75,00; Н 11,73; N 13,26. ИК спектр, ν , cm^{-1} : 1610 (CH=C), 2190 (C≡C). ПМР спектр, δ , м. д.: 0,87 т ($\underline{CH}_2-CH_2$, $J=7$ Гц), 1,2 с ($\underline{CH}_3C$), 1,6 кв ($\underline{CH}_2CH_2$, $J=7$ Гц), 1,98 с ($\underline{CH}_2C=$), 2,15 с [$\underline{CN}(\underline{CH}_3)_2$], 2,70 с [$=\underline{CN}(\underline{CH}_3)_2$], 4,07 с (1H).

N,N,N',N'-Тетраметил-4-гексен-2-ин-1,5-диамин (IIIa). Из 1,68 г (0,015 моля) хлорида IIa и 2,7 г (0,06 моля) ДМА в 6 мл абс. эфира аналогично предыдущему получают 1,5 г (60%) IIIa, т. кип. 107°/3 мм, d_D^{20} 1,5390. Найдено %: С 72,79; Н 10,84; N 17,75. $C_{10}H_{21}N_2$. Вычислено %: С 72,29; Н 10,84; N 16,86. ИК спектр, ν , cm^{-1} : 1600, 3060 (CH=C), 2200 (C≡C). ПМР спектр, δ , м. д.: 1,97 с (3H), 2,14 с (6H), 2,70 с (6H), 3,23 (2H, $J=2$ Гц), 4,03 т (1H, $J=2$ Гц).

N,N,N',N'-Тетраметил-2-нонен-4-ин-2,6-диамин (IIIg). Из 1 г (0,0064 моля) хлорида IIg и 1,1 г (0,0256 моля) ДМА в 5 мл абс. эфира аналогично предыдущему выделено 0,2 г (17%) IIIg (основная масса при перегонке осмолилась), т. кип. 58–60°/1 мм, d_D^{20} 1,5270. Найдено %: С 74,45; Н 11,27; N 13,05. $C_{13}H_{21}N_2$. Вычислено %: С 75,00; Н 11,54; N 13,45. ИК спектр, ν , cm^{-1} : 1610, 3050 (CH=C), 2200 (C≡C). ПМР спектр, δ , м. д.: 0,9 м (3H), 1,5 м (4H), 2,03 с (3H), 2,15 с (6H), 2,75 с (6H), 3,2 м (1H), 4,1 д (1H, $J=2$ Гц).

Взаимодействие 6-хлор-6-метил-1,2-гептадиен-4-ина с диэтил-амином (ДЭА). а) Смесь 4,5 г (0,03 моля) хлорида, 10 мл абс. эфира и 4,45 г (0,06 моля) ДЭА заправляют в ампулу при -10° и выдерживают при этой температуре 1 сутки. Затем ампулу вскрывают, содержимое отфильтровывают, осадок промывают абс. эфиром и после удаления эфира остаток перегоняют в вакууме. Выделяют 2,2 г (40%) 1,5-диметил-1,5-гексадиен-3-инилдиэтиламина (IV), т. кип. 115°/1 мм, d_D^{20} 1,5650. Найдено %: С 81,06; Н 11,04; N 8,08. $C_{12}H_{20}N$. Вычислено %: С 81,35; Н 10,73; N 7,90. ИК спектр, ν , cm^{-1} : 1600, 870, 3100 ($\underline{CH}_2=C$), 1610, 3060 (CH=C), 2170 (C≡C). ПМР спектр, δ , м. д.: 1,04 т ($\underline{CH}_2-CH_2$, 6H, $J=7$ Гц), 1,79 м ($\underline{CH}_2=C(\underline{CH}_3)$), 2,0 с ($\underline{CH}_3C=$), 3,12 кв ($\underline{CH}_2CH_2$, 4H, $J=7$ Гц), 4,1 с (CH=), 4,87 м ($\underline{CH}_2=$).

б) Из 3 г (0,021 моля) хлорида и 6 г (0,084 моля) ДЭА в 10 мл абс. эфира аналогично предыдущему выделяют 2,5 г смеси IV и *N,N,N',N'*-тетраэтил-6-метил-2-гептен-4-ин-2,6-диамина Va (в соотношении 1:1 по ПМР), т. кип. 113–122°/1 мм. ИК спектр, ν , cm^{-1} : 870, 1600, 3100 ($\underline{CH}_2=C$), 1610, 3060 (CH=C), 2170 (C≡C). ПМР спектр наряду с сигналами соединения IV содержит также сигналы V: 1,02 т ($\underline{CH}_2CH_2NC$, $J=7$ Гц), 1,10 т ($\underline{CH}_2CH_2NC=$, 6H, $J=7$ Гц), 1,32 с [$\underline{CH}_2)_2C$], 2,07 с ($\underline{CH}_2C=$), 2,62 кв ($\underline{CH}_2CH_2NC$, $J=7$ Гц), 3,19 кв ($\underline{CH}_2CH_2NC=$, $J=7$ Гц), 4,05 с (CH=C).

6-Метил-2-гептен-4-ин-2,6-дипиперидин (V6). К смеси 3 г (0,021 моля) 6-хлор-6-метил-1,2-гептадиен-4-ина и 10 мл абс. эфира добавляют 7,1 г (0,084 моля) пиперидина при -8° . Через день смесь отфильтровывают, соль промывают абсолютным эфиром и эфирный слой добавляют к фильтрату. После удаления растворителя и перегонки остатка в вакууме выделяют 5 г (87%) V6, т. кип. $130^{\circ}/1$ мм, n_D^{20} 1,5520. ИК спектр, ν , $см^{-1}$: 1600 (CH=C), 2200 (C≡C). ПМР спектр, τ , м. д.: 1,30 с (6H), 1,55 м (12H), 1,97 с (3H), 2,52 м (4H), 2,95 м (4H), 4,3 с (1H).

ԶՀԱԳԵՑԱԾ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐ

LXXII. ԱԼԵՆԻԼԱԿԵՏԻԼԵՆԱՅԻՆ ՔԼՈՐԻԴՆԵՐԻ ՓՈՆԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՄԻՆՆԵՐԻ ՀԵՏ: ԵՆԻՆԱՅԻՆ ԴԻԱՄԻՆՆԵՐԻ ՆՈՐ ՍԻՆԹԵԶ

Ա. Պ. ԽՐԻՄՅԱՆ, Ա. Վ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ և Շ. Ն. ԲԱԴԱՆՅԱՆ

Համապատասխան սպիրտներից սինթեզված են տարբեր ալենիլացետիլենային քլորիդներ: Յուրյ է տրված, որ առաջնային, երկրորդային, երրորդային ալենիլացետիլենային քլորիդների և դիմեթիլամինի ու պիպերիդինի փոխազդեցությունից առաջանում են ենինային դիամիններ: Ենթադրվում է, որ երրորդային քլորիդների դեպքում ռեակցիան ընթանում է միջանկյալ վինիլըրուտատրիենային ամինների առաջացմամբ, որոնք կախված ռեակցիայի պայմաններից և օգտագործվող ամինից ենթարկվում են կամ նուկլեոֆիլ միացման, կամ պրոտոտրոպ իզոմերման:

REACTIONS OF UNSATURATED COMPOUNDS

LXXII. INTERACTION BETWEEN ALLENYLACETYLENIC CHLORIDES AND AMINES. A NEW SYNTHESIS OF ENYNIC DIAMINES

A. P. KHRIMIAN, A. V. KARAPETIAN and Sh. O. BADANIAN

Various allenylacetylenic chlorides have been obtained from correspondent alcohols. It has been shown that the reaction of primary, secondary, and tertiary chlorides with dimethylamine and piperidine leads to the formation of enynic diamines. Apparently in the case of tertiary chlorides, vinylbutatrienic amines are formed as intermediates, which further undergo either nucleophilic addition or prototropic isomerization, depending upon the nature of the amine and the reaction conditions.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Н. Ф. Шостаковский, А. В. Богданова, Химия диацетиленов, Изд. «Наука», М., 1971, стр. 345.
2. L. Bradsm, Preparative acetylenic chemistry, Elsevier publishing, company, Amsterdam, 1971, 54.
3. С. А. Вартамян, Ш. О. Баданян, А. В. Мушегян, Изв. АН Арм. ССР, ХН, 16, 547 (1963).