ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

УДК 541.486+541.571.4+66.095.112

РЕАКЦИИ ЭЛЕКТРОФИЛЬНОГО АЦИЛИРОВАНИЯ
 НЕПРЕДЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Ш. О. БАДАНЯН, Г. Г. МЕЛИКЯН, Г. Р. МХИТАРЯН и К. А. АТАНЕСЯН

Институт органической химии АН Армянской ССР, Ереван

Поступило 18 VIII 1981

В в е д е н и е

В конце прошлого столетия Кондаковым был выполнен цикл оригинальных работ по ацилированию алкенов [1] в условиях реакции Фриделя-Крафтса [2]. Впоследствии общий характер реакций ацилирования алкенов действием галогенангидридов карбоновых кислот в присутствии кислот Льюиса был показан в работах Крапивина [3] и Дарзана [4]. В настоящее время электрофильное ацилирование непредельных соединений является одной из интенсивно разрабатываемых областей синтетической органической химии, разнообразные отдельные аспекты которой в последнее десятилетие обсуждались в ряде обзорных статей [5—10]. Предметом настоящего обзора являются реакции ацилирования непредельных соединений в присутствии кислот Льюиса, в которых ацилирующей компонентой являются ангидриды и галогенангидриды алифатических и ароматических карбоновых кислот, а непредельной компонентой—соединения, содержащие изолированные и сопряженные двойные и тройные связи. Целью обзора является представление основного массива экспериментальных данных, оценка области реакций электрофильного ацилирования с точки зрения синтетической органической химии, анализ основных этапов эволюции данного направления и тенденции развития на современном этапе.

При классификации рассматриваемого экспериментального материала в качестве первого признака выбран класс непредельной компоненты (алкены, циклоалкены и т. д.), в качестве второго признака для распределения материала внутри глав—применяемая кислота Льюиса. Из-за особого интереса в отдельные разделы выделены реакции циклизации и ацилирование непредельных соединений ацилиевыми солями.

Ацилирование алкенов

а. Углеводороды. Впервые ацилирование алкенов действием хлор- и бромангидридов уксусной кислоты в присутствии треххлористого алюминия осуществлено Кондаковым [1] и Крапивиным [3]. Ими, а также другими авторами [11—13] показано образование α,β -непредельных кетонов—продуктов присоединения-отщепления ацетилгалогенидов по двойной связи алкенов.

$R, R_1 = H, H; CH_3, H; CH_3, CH_3; C_2H_5, CH_3; C_2H_5, C_2H_5; C_6H_{13}, H; X = Cl, Br$

Ожидаемые продукты присоединения— β -хлоркетоны, были выделены при соответствующем подборе условий [14—16, 36].

Аналогичные β -фторкетоны не удалось выделить при ацилировании алкенов фтористым ацетилом в присутствии треххлористого и трехбромистого алюминия [17]. Продуктами реакций оказались соответствующие β -хлор- и β -бромкетоны.

Чувствительность реакций ацилирования к стерическим затруднениям показана реакцией 3,7,7-триметил-4-октена с хлористым ацетилом, в которой ожидаемые α,β -непредельные кетоны образовывались лишь с малыми выходами [12].

Из галогенангидридов функционально замещенных карбоновых кислот широко исследовались галогенангидриды α -хлор- и β -хлоркарбоновых кислот. Так, взаимодействие хлорангидрида монохлоруксусной кислоты с этиленом приводит к соответствующему α,β -непредельному кетону [13]. Аналогичная реакция хлорангидрида β -хлорпропионовой кислоты с этиленом явилась удобным методом синтеза дивинилкетона, важного в практическом отношении [18, 19]. Замещенные дивинилкетоны образуются также при ацилировании этилсена и пропилена хлорангидридом кротоновой кислоты [19].

Бензоилирование этилена хлорангидридом бензойной кислоты приводит к β -хлорэтилфенилкетону, при дегидрохлорировании которого образуется фенилвинилкетон [20, 21]. Следует отметить, что при проведении реакции в бензоле удается выделить соответствующий продукт присоединения, в то время как в случае сероуглерода сразу образуется продукт дегидрохлорирования.

Двухлористый цинк активен в реакциях ацилирования, как кислота Льюиса при применении в качестве ацилирующей компоненты ангидридов карбоновых кислот [22—24]. Так, взаимодействие 2,4,4-триметил-1-пентена с ангидридами уксусной [22], изомасляной и α,α -диметилпропионовой кислот [23, 24] приводит к соответствующим α,β -непредельным кетонам.

Аналогично протекает ацилирование ангидридами изомасляной и α,α -диметилпропионовой кислот 1-пентена, 2-бутена, 2,3-диметил-2-бутена, 2,4,4-триметил-2-пентена, изобутилена, 2,2,6,6-тетраметил-4-метиленоктана [23, 24].

С синтетической точки зрения интересен тот факт, что в случае смешанного ангидрида уксусной и масляной кислот катионоидным фрагментом является более длинный алкильный радикал.

Недавно было показано [10], что ацилирование алкенов уксусным ангидридом в присутствии двухлористого цинка в соответствующих условиях может быть также удобным методом синтеза β,γ -непредельных кетонов. Так, из 2-этил-1-бутена образуется смесь *цис-транс*-изомеров 4-этил-4-гексен-2-она.

Подобным образом протекает ацилирование 2-метил-2-бутена, 1-пентена, 3-гексена, 2,3,4-триметил-2-пентена [10].

Четыреххлористое олово эффективно в качестве кислоты Льюиса при ацилировании алкенов хлорангидридами карбоновых кислот [25].

Так, ацилирование 2-метил-2-бутена приводит к соответствующим β -хлоркетонам, дегидрохлорированием которых получают α,β -непредельные кетоны.

Ацилирование 2,3-диметил-2-бутена, 2-метил-2-гексена, изобутилена в аналогичных условиях также приводит к соответствующим α,β -непредельным кетонам [25].

Трехфтористый бор, аналогично двухлористому цинку [22], применялся при ацилировании 2,4,4-триметил-1-пентена уксусным ангидридом, приводя к соответствующему α,β -непредельному кетону, содержащему примесь β,γ -изомера [26].

Эффективность различных кислот Льюиса (AlCl₃, ZnCl₂, BF₃·O(C₂H₅)₂, BF₃·H₃PO₄, TiCl₄) детально изучалась при ацилировании стирола хлористым ацетилом [27]. Как оказалось, метил- β -фенилвинилкетон образовывался с наилучшим выходом при применении двухлористого цинка.

Ацилирование алкенов может осуществляться и в присутствии кислот типа Бренстеда, таких как ацетилсульфоуксусная [28], арилсульфоновые [29] и хлорная кислоты [30], хлорангидриды неорганических кислот [31]. Так, к соответствующим α,β -непредельным кетонам приводит ацилирование 2,4,4-триметил-1-пентена уксусным ангидридом [28, 29], стирола—хлористым ацетилом [30], 1,1-дифенилэтилена—хлорангидридами бензойной, фенилуксусной, фумаровой кислот [31].

б. Функционально замещенные углеводороды. Большой интерес к реакциям ацилирования хлоралкенов объясняется практической важностью образуемого класса соединений— β -хлорвинилкетонов. Последние вследствие высокой реакционной способности β -хлора являются чрезвычайно полезными реагентами C-, N-, O-, S-, P-, Hal-, Fe- и Co-кстовинилирования [32]. Разработке препаративных методов синтеза β -хлорвинилкетонов посвящен ряд работ [33—37].

Ацилирование хлористого винила хлорангидридами алифатических и ароматических карбоновых кислот в присутствии треххлористого алюминия приводит к алкил- и арил- β -хлорвинилкетонам [33—35].

Аналогичная реакция имеет место в случае четыреххлористого олова и треххлористого железа.

При ацилировании хлористого винила соответствующий продукт присоединения— β,β -дихлоркетон, удается выделить при проведении реакции в отсутствие растворителя [36].

В тех же условиях протекает ацилирование 1,1-дихлор и 1,1,2-трихлорэтиленов хлорангидридами моно- и трихлоруксусной кислот.

Гомолог хлористого винила—2-хлор-1-пропен, при действии хлористого ацетила приводит к соответствующему β,β -дихлоркетону, который дегидрохлорируется при перегонке с водяным паром [37].

Следует отметить, что ацилирование несимметричных хлоралкенов, таких как хлористый винил, 1,1-дихлорэтилен и 1,1,2-трихлорэтилен протекает с высокой региоселективностью, при которой катионоидный фрагмент присоединяется к атому углерода, несущему минимальное число атомов хлора.

К рассмотренным реакциям относится также ацилирование 3-хлорпропена хлористым ацетилом, приводящее к α,β -непредельному кетону [38].

Изучено ацилирование ряда других функционально замещенных алкенов [39—42]. Особый интерес представляет ацилирование активированной двойной связи на примере окиси мезитила действием хлорангидрида 2,4,6-триметилбензойной кислоты [39]. Присоединение катионоидного фрагмента происходит по α -углеродному атому акриловой системы с образованием α -метилен- β -дикетона.

Недавно описано ацилирование двойной связи, содержащей в α -положении триметилсилильную группу [40]. Так, при взаимодействии *цис*-1-галоген-2-триметилсилилэтилена с хлорангидридами уксусной и пропионовой кислот образуется *транс*-1-галоген-2-ацетилэтилен. По результату реакция является электрофильным замещением, сопровождающимся полной *цис-транс*-изомеризацией.

Ацилирование двойной связи, содержащей силильные группы в β -положении, сопровождается электрофильным замещением с переносом реакционного центра [41]. Причем реакция характеризуется высокой регио- и стереоселективностью, при которой из оптически активного *транс*-алкена образуется оптически активный *цис*-изомер. Следует отметить, что при наличии триметил- и диметилфторсилильных групп избирательно замещается последняя.

Ацилирование α -нитроолефинов в присутствии галоидов цинка приводит к галоидангидридам α -галоид-N-ацилгидроксамовых кислот [42].

Ацилирование циклоалкенов

а. Циклопентен. Оригинальная работа по ацилированию циклопентена была выполнена в конце прошлого столетия [43]. Взаимодействие 2,3,3-триметилциклопентена с хлористым ацетилом в присутствии треххлористого алюминия приводило к соответствующему α,β -непредельному кетону.

Впоследствии ацилированием циклопентена хлористым ацетилом [44], хлористым бензоилом [45], уксусным ангидридом [11], а также метилциклопентена [46] хлористым ацетилом в присутствии треххлористого алюминия были получены метил- и фенилциклопентенилкетоны. Следует отметить, что переход от полярных растворителей к неполярным способствует образованию продуктов присоединения— β -хлоркетонов, дегидрохлорирование которых протекает при действии основных реагентов [44].

Ацилирование циклопентена может быть также методом синтеза β,γ -непредельных кетонов, если в качестве ацилирующей компоненты использовать уксусный ангидрид, а в качестве кислоты Льюиса—двуххлористый цинк [10]. Этим способом из 1-этилциклопентена образуется 3-ацетил-2-этилциклопентен.

Изучение ацилирования 1-метилциклопентена бромангидридом винилуксусной кислоты в присутствии треххлористого алюминия позволило разработать одностадийный метод синтеза бициклических кетонов [47]. Предложенный механизм образования продуктов предполагает енолизацию первичного продукта ацилирования с последующей циклизацией енолята.

Рассмотренным реакциям родственно ацилирование циклопентена хлорангидридами α -хлор- и α -бромпропионовой кислот в присутствии триэтиламина [48]. Первичные продукты реакции в результате 1,4-дегидрохлорирования приводят к эндо- и экзо-изомерам бициклических соединений.

б. Циклогексен. Ацилирование циклогексена и его производных в присутствии различных кислот Льюиса явилось предметом многостороннего изучения, позволившего разработать методы синтеза различных классов органических соединений, таких как α , β - и β,γ -непредельные кетоны [49—51, 10], производные инданона [47, 52], флуоренона [52], фенантрена [53], бифенила [53, 54].

Первые ацилирование циклогексена проводилось действием хлористого ацетила в присутствии треххлористого алюминия, что привело к продукту присоединения—1-ацетил-2-хлорциклогексану, и продукту дегидрохлорирования последнего—1-ацетилциклогексену [4].

Аналогично протекает ацилирование циклогексена хлорангидридами предельных и непредельных алифатических и ароматических карбоновых кислот в присутствии треххлористого алюминия [49—51, 55].

Реакции ацилирования циклогексена позволили разработать доступные методы синтеза производных инданона и декалона, важных в практическом отношении [47, 52].

Взаимодействие циклогексена с хлорангидридами β -хлорпропионовой и кротоновой кислот с последующим дегидрохлорированием при-

водит к дивинилкетонам, которые при нагревании в присутствии кислот циклизуются в 4,5,6,7-тетрагидро- и 4,5,6,7-тетрагидро-3-метилинданоны [52].

Аналогично протекает реакция в случае хлорангидрида циклогексенилкарбоновой кислоты, приводящая к декагидрофлуоренону [52].

Ацилирование циклогексена и 1-метилциклогексена бромангидридом винилуксусной кислоты при -78° также сопровождается циклизацией с образованием производных декалона [47], причем механизм их образования предполагается аналогичным механизму ацилирования циклопентена [47].

В то же время при 0° циклизация не наблюдается и реакция приводит к соответствующему продукту присоединения.

Отдельно следует отметить реакции ацилирования циклогексена, идущие в присутствии циклогексана [56, 57]. Качественным отличием этих реакций является образование продуктов восстановления ожидаемых β -хлоркетонов. Так, ацетилирование циклогексена приводит к метилциклогексилкетону [56].

Аналогично протекает реакция ацетилирования 4-метилциклогексена [57]. Образование продуктов восстановления, по-видимому, связано со

скелетной перегруппировкой циклогексана в 1-метилциклопентен в присутствии смеси хлористый ацетил-треххлористый алюминий [56].

Циклогексен вовлечен также в реакцию сопряженного ацетилфенилирования [53, 54]. Многоступенчатая методика с последовательным добавлением реагентов приводит к 1-ацетил-4-фенилциклогексану—продукту сопряженного ацетилфенилирования, сопровождающегося гидридными сдвигами [54].

При проведении реакции непосредственно в бензоле образуется смесь изомерных продуктов—1-ацетил-2(4)-фенилциклогексанов [53].

В присутствии треххлористого алюминия изучено также ацилирование функционально замещенных циклогексенов— Δ^3 -циклогексенальдегидов [58] и 1-N-морфолилциклогексена [59]. В первом случае наблюдается одновременное ацетилхлорирование альдегидной и двойной связей, во втором—ацилирование двойной связи и атома N субстрата.

Применение четыреххлористого олова и двуххлористого цинка [10, 51, 53, 55, 60—63], наряду с треххлористым алюминием в реакциях ацилирования циклогексена в качестве кислоты Льюиса, приводит при ацилировании ангидридами и галондангидридами алифатических и ароматических карбоновых кислот к соответствующим α,β -непредельным кетонам [51, 55, 60]. При ацилировании несимметричного 4-метилциклогексена в присутствии четыреххлористого олова образуется смесь изомерных α,β - и β,γ -непредельных кетонов [61]. Кроме α,β - и β,γ -непредельных кетонов, при ацилировании 1-метилциклогексена обнаружены также продукты скелетных перегруппировок [62]. Так, в случае хлористого ацетила образуется смесь 1-ацетил-2-метил- и 3-ацетил-2-метилциклогексенов, а также *экзо*-, *эндо*-1-ацетил-6-метилбицикло(3,1,0)гексанов.

Подобная смесь продуктов образуется при ацилировании 1-этилциклогексена уксусным ангидридом [63].

Ацилирование карбоментена и параментена хлорангидридом пропионовой кислоты в присутствии четыреххлористого олова приводит к соответствующим α,β -непредельным кетонам [60].

Отдельный интерес представляет собой реакция циклизации при ацилировании циклогексена хлорангидридом фенилуксусной кислоты в присутствии четыреххлористого олова [53]. Продуктом реакции является 9-кетооктагидрофенантрин.

Недавно было предпринято систематическое исследование синтетических возможностей и механизма реакции ацилирования циклогексена и его производных уксусным ангидридом в присутствии двуххлористого цинка [10]. На большом числе примеров показано, что данная реакция является удобным препаративным методом синтеза β,γ -непредельных кетонов, содержащих ди-, три- и тетразамещенные двойные связи.

Аналогичным образом реагируют нижеприведенные производные циклогексена.

Следует отметить, что при ацилировании 1-метилциклогексена смешанным ангидридом уксусной и муравьиной кислот продуктом реак-

ции является 3-ацетил-2-метилциклогексен, т. е. катионоидным фрагментом ангидрида является более длинный алкильный радикал, что согласуется с ранее полученными данными [23, 24].

Для реакции ацилирования алкенов возможно существование двух предельных механизмов: одностадийного синхронного и двухстадийного с образованием промежуточного карбкатиона. Определенная информация о наличии интермедиата со значительным положительным зарядом была получена для реакций ацилирования 1-арилциклогексенов, в которых скорость убывает в ряду $n\text{-CH}_3\text{O} > n\text{-CH}_3 > n\text{-F} > n\text{-H} > n\text{-CF}_3$ [10]. Более строгие доказательства получены изучением кинетического изотопного эффекта и изотопного эффекта продуктов реакций ацилирования различных дейтерированных производных циклогексена [10]. На основании этих данных сделан вывод о том, что реакция происходит по механизму, включающему по крайней мере две стадии с образованием карбкатионного интермедиата на первой стадии.

Ацилирование циклогексена может быть проведено и в отсутствие кислот Льюиса действием смесей уксусный ангидрид-серная кислота [64], хлорангидрид карбоновой кислоты-ангидрид трифторуксусной кислоты [65], а также ацетилийперхлоратом [66].

в. Другие циклоалкены. Аналогично реакциям ацилирования циклопентена и циклогексена алициклы с большим размером кольца (циклопентен и циклооктен) ацилируются с образованием как продуктов присоединения—1-ацетил-2-хлорциклоалканов, так и соответствующих продуктов дегидрогалогенирования—1-ацетилциклоалкенов [67—69].

В более поздних работах по ацетилированию *цис*-циклооктена [70, 71] обнаружены продукты, образующиеся в результате множественных скелетных перегруппировок—*транс*-ацетил-4-метилциклопентан и *транс*-ацетил-4-хлор-4-этилциклогексан.

Ацетилирование метилциклооктена уксусным ангидридом в присутствии двуххлористого цинка приводит к смеси изомерных β,γ -непредельных кетонов [10].

В подобных условиях при ацилировании Δ^1 -карена образуется 3-ацил- Δ^4 -карен [72].

Ацилирование алкенов и циклоалкенов ацилиевыми солями

Разработка доступных методов синтеза ацилийтетрафторборатов, ацилийгексафтор- и ацилийгексахлорантимонатов [73—75] позволила применить их в качестве ацилирующих агентов нового типа в реакциях электрофильного ацилирования непредельных соединений. Ацилирование с помощью солей ацилия не только качественно расширило синтетические возможности метода, но и позволило получить достоверные данные о механизме реакций и структурах промежуточных частиц.

а. Ацилийтетрафторбораты. Вопросам ацилирования алкенов и циклоалкенов ацилийтетрафторборатами посвящен оригинальный цикл работ, выполненный в период 1970—1978 гг. [76—81]. Авторами показано [77], что ацилиевые соли в определенных условиях могут служить эффективными реагентами ацилирования алкенов и циклоалкенов, приводящего к соответствующим β , γ -непредельным кетонам,

Более детальное изучение указанных реакций показало [78], что если обработку реакционной смеси проводить не при низких температурах, а предварительно отогреть ее до 0°, то результатом реакции оказываются различные соединения в зависимости от того, каким нуклеофилом обрабатывается реакционная смесь. Так, при ацилировании циклогексена пивалоилборфторидом при -25° в нитрометане продуктом реакции является 3-пивалоилциклогексен независимо от основания, которым обрабатывается реакционная смесь. При отогревании промежуточного соединения до 0° в течение 3 мин обработка водой приводит к 1-пивалоил-3-оксициклогексану, а в случае боргидрида натрия, метанола и триэтиламина образуются различные бициклические производные [78].

Для объяснения полученных данных было предположено образование карбоксоновой соли А на первой стадии реакции и изомеризация ее при 0° в результате гидридного сдвига в более устойчивую карбоксоновую соль В, обработка которой нуклеофилом приводит к наблюдаемым продуктам.

Следует отметить, что изомеризация карбоксоновой соли в случае норборнена идет не при 0°, а уже при -25°.

Впоследствии карбоксоновые соли, образование которых было постулировано [78], удалось выделить в индивидуальном состоянии для ряда алкенов и циклоалкенов [79], причем оказалось, что наиболее легко образуются карбоксоновые соли в случае алкенов с разветвлением у γ-аллильного атома углерода [80].

Полученные карбоксоновые соли имеют температуру плавления в интервале 110—220°, для установления их структур наиболее информативными оказались спектры ЯМР ¹³С.

В подытоживающей работе [81] показана генетическая связь между β,γ-непредельными кетонами и карбоксоновыми солями.

Как оказалось, при ацилировании при -50° образуется протонированная форма β,γ -непредельного кетона, спектр ПМР которой идентичен спектру эквимольной смеси β,γ -непредельного кетона с HBF_4 при -50° . Отогревание обоих комплексов до 0° приводит к спектру карбоксоновой соли.

Авторами на основе полученных данных предлагается общая схема ацилирования алкенов солями ацилия [81]. Так, для алкенов, не содержащих разветвления при аллильном атоме углерода, предполагается синхронный процесс через шестизвенное переходное состояние, приводящее к β,γ -непредельным кетонам. В случае алкенов с разветвлением у аллильного атома углерода предпочтительным направлением реакции является 1,2-сдвиг, приводящий к пятичленной карбоксоновой соли.

Изучено также ацилирование ацилийтетрафторборатами метиленциклобутана [82], 1-метилциклобутена [82], циклопентена [83], *цис*-циклооктена [83]. В случае метиленциклобутена единственным продуктом реакции является 1-фтор-1-ацетонилциклобутан, а в случае 1-метилциклобутена образуется смесь *цис-транс*-1-фтор-1-метил-2-ацетилциклобутанов в соотношении 32 : 68.

При ацилировании алициклов C_7 , *цис*- C_8 , *цис*- C_{10} и *цис*- C_{12} основными продуктами реакции являются соответствующие β,γ -непредельные кетоны.

В случае C_7 и *цис*- C_{10} образуется от 10 до 20% α,β -изомера. Кроме того, для C_7 наблюдается сужение цикла порядка 5—7%.

б. Ацилийгексахлорантимоанаты. Опубликована только одна работа по изучению реакции ацилирования циклоалкенов ацилийгексахлорантимоанатами [84]. Реакцию проводили действием предварительно полученного ацетилгексахлорантимоаната [75] на непредельное соединение в присутствии различных оснований, повышающих региоселективность реакции. Основным синтетическим результатом является образование соответствующих β,γ -непредельных кетонов во всех изученных реакциях.

В качестве оснований применялись триэтиламин, дициклогексилламин, 2,4,6-коллидин и 2,6-лутидин в различных отношениях к алкенам. В их присутствии почти полностью исключается образование α,β -изомеров, содержание которых в отсутствие оснований составляет в случае циклогексена 5—7%. Авторами предлагается шестичленная схема образования β,γ -непредельных кетонов с участием γ -водорода [84].

Ацилирование алкинов

Интерес к реакциям ацилирования алкинов связан с большой их ценностью для синтетической органической химии. Представление об этом дает перечисление тех классов органических соединений, которые могут быть получены: алкил-, алкенил-, арил- β -хлорвинилкетоны, β -дикетоны, хлор-, алкилиденциклопентеноны.

Ацилирование алкинов хлорангидридами и ангидридами карбоновых кислот является доступным методом синтеза алкил- β -хлорвинилкетонов [36, 44, 85—90]—чрезвычайно полезных реагентов кетовинилирования [32]. Реакции проводятся в присутствии различных кислот Льюиса, таких как треххлористый алюминий [36, 44, 86, 88], четыреххлористое олово [85], двуххлористый цинк [90], треххлористое железо [85], треххлористый бор [85], приводя вследствие нестереоспецифичности процесса к смеси *цис-транс*-изомеров β -хлорвинилкетонов.

$R = \text{H}$, алкил; $R_1 = \text{CH}_3$, C_2H_5 , C_3H_7 , C_3H_5 , C_6H_5 , ClCH_2 , BrCH_2 , C_6H_{11} , $\text{C}_{11}\text{H}_{23}$

Аналогично фенол- и бензил- β -хлорвинилкетоны образуются при ацилировании ацетилена хлорангидридами бензойной и фенилуксусной кислот [91].

К качественно новому результату приводит применение трехфтористого бора при ацилировании алкинов уксусным ангидридом [92]. Так, в случае 1-гептина продуктом реакции является 2,4-нонандион.

Отдельный интерес представляет также ацилирование алкинов хлорангидридами α,β -непредельных кислот, а также хлорангидридами α -хлор и β -хлоркарбоновых кислот [93—97]. Первоначально было показано, что ацилирование ацетилена хлорангидридами кротоновой и диметилакриловой кислот приводит к соответствующим алкенил- β -хлорвинилкетонам [93].

Последние образуются также при дегидрохлорировании первичных продуктов ацилирования ацетилена хлорангидридами α - и β -хлоркарбоновых кислот [93].

Дальнейшие исследования показали [94—97], что ацилирование моно- и дизамещенных алкинов хлорангидридами α,β -непредельных кислот приводит наряду с линейными к циклическим продуктам: хлор- и алкилиденциклопентенонам, причем соотношение продуктов зависит как от применяемой кислоты Льюиса [94, 95], так и от структуры реагентов [96]. Авторами приводятся подробные данные распределения продуктов при различных значениях R, R₁, R₂, R₃.

Следует отметить, что если при ацилировании монозамещенных алкинов образуются либо алкилиденциклопентеноны, либо алкенил- β -хлорвинилкетоны, то в случае дизамещенных алкинов основными продуктами

являются хлорциклопентеноны. Кроме того, ацилирование хлорангидридами замещенных бензойных кислот сопровождается не циклизацией, а приводит к смеси линейных продуктов [96].

Описано также ацилирование алкоксиацетиленов хлорангидридом трихлоруксусной кислоты, приводящее к соответствующему продукту присоединения по тройной связи [110].

Ацилирование алкинов ацилийтетрафторборатами

Систематическое изучение ацилирования алкинов ацилийтетрафторборатами позволило выяснить основные закономерности стабилизации винилкатионных интермедиагов и одновременно разработать методы синтеза β -дикетонов, циклопентенонов, β -бромвинилкетонов, β -арил- и β,β -диарил- α,β -непредельных кетонов [99—114].

Ацилирование алкинов ацилийтетрафторборатами в среде нитрометана приводит к β -дикетонам [99].

Механизм их образования предполагает участие растворителя в качестве донора гидроксил-иона.

При взаимодействии 2-бутина с изобутироил- и пивалоилтетрафторборатами были получены тетраметилциклопентен-2-оны [100].

Образование их объясняется реализацией 1,5-гидридного сдвига в винилкатионном интермедиате с последующей циклизацией карбокатиона.

В случае циклогексаноилтетрафторбората карбокатион, образовавшийся в результате гидридного сдвига, стабилизируется присоединением F-иона из анионного остатка ацилирующего агента [101, 102].

Аналогично протекает ацилирование алкинов адамантоилтетрафторборатами [103—105]. В случае гексафторантимонатов карбокатионный ин-

термедиат стабилизируется присоединением хлор-иона из среды [105]. В дальнейшем существование 1,5-гидридного сдвига в винилкатионных интермедиатах было показано применением в качестве ацилирующего агента дейтерированного циклогексаноилтетрафторбората [106].

Новое направление стабилизации винилкатионных интермедиатов реализуется в случае Δ^3 -циклогексеноилтетрафторборатов, где внутримолекулярное алкилирование двойной связи с последующим присоединением фтор-иона приводит к производному бицикло(3,1,0)нонена [107].

При ацилировании алкинов α -бромбутироилтетрафторборатами был обнаружен факт 1,4-сдвига атома брома в винилкатионном интермедиате с образованием *цис*- β -бромвинилкетонов [108, 109].

Аналогично протекает ацилирование α -бромизобутироил- и изовалероилтетрафторборатами [110]. В случае β -бромизовалероилтетрафторборатов имеет место 1,5-сдвиг атома брома [110].

Ацилирование алкинов ацилийтетрафторборатами изучено также в присутствии ароматических углеводородов [111, 112]. Продуктами реакций являются β -арил- α,β -непредельные кетоны, образующиеся в результате сопряженного ацилирования тройной связи.

Кроме того, было показано, что сопряженное ацилирование арил-ацетиленов, приводящее к β,β -диарил- α,β -непредельным кетонам, является стереоспецифичным *транс*-присоединением [111, 113, 114].

Ацилирование алкадиенов

Исследования в области ацилирования алкадиенов сравнительно немногочисленны, что связано с большой лабильностью их по отношению к кислотам Льюиса. Известна единственная работа по ацилированию 1,2-пропадиена хлорангидридами алифатических и ароматических карбоновых кислот [115]. Присоединение фрагментов ацилирующего агента происходит по одной из двойных связей аллена.

Среди 1,3-алкадиенов изучено ацилирование 1,3-циклогексадиена [116, 117], комплекса бутадиежелезотрикарбонила [118—120], функционально замещенного изопрена [121] и ряда хлорсодержащих бутадиенов [122—130].

В случае 1,3-циклогексадиена взаимодействие с галоидангидридами и ангидридом уксусной кислоты приводит к 1-ацетил-1,3-циклогексадиену [116].

Данной реакции родственно ацилирование циклопентадиена хлорангидридом α -галоидпропионовой кислоты, при котором образуется 1-(α -галоидпропаноил)циклопентадиен [48].

Ацилирование бутадиена проведено в комплексе с карбонилами металлов подгруппы железа [118—120]. Первоначальный продукт реакции—1-ацетилбутадиежелезотрикарбонил, расщепляется под действием окиси углерода с образованием 1-ацетил-1,3-бутадиена.

В аналогичных условиях получены ацилированные производные 1,3-циклогексадиена, 1,3-циклооктадиена [117].

Производное изопрена, содержащее у концевом С-атома объемистые группы, ацилируется в присутствии дибромистого цинка с образованием продукта ацилдесилирования [121].

Цикл работ посвящен изучению ацилирования хлорсодержащих бутадиенов [9, 122—130], устойчивость которых по отношению к кислотам Льюиса намного выше, чем их водородных аналогов.

Ацилирование хлоропрена, 2,3-дихлор- и 1,1,2-трихлорбутадиенов ангидридами и галоидангидридами уксусной, пропионовой, масляной, а также монохлоруксусной кислот при -10° приводит в результате реакции присоединения-отщепления к соответствующим алкилхлордиеновым кетонам [122—127].

Аналогично при взаимодействии хлоролефинов с хлористым бензоилом получают фенолхлордиеновые кетоны [9, 128].

Примечательно, что если в случае 1,1,2-трихлорбутадиена присоединение катионоидного фрагмента протекает по незамещенной двойной связи [127], то в случае хлоропрена в реакции участвует хлорвинильная группа [122—124].

Недавно было показано [129], что при -80° хлористый ацетил с высокой региоселективностью присоединяется к хлоропрену в 1,4-положение.

Данная реакция является единственным примером 1,4-ацилирования 1,3-алкадиена. Продукт 1,4-присоединения термически неустойчив и при стоянии при 20° , а также при действии триэтиламина дегидрохлорируется с высокой стереоселективностью в *цис*-3-хлор-1,3-гексадиен-5-он [129].

Отметим, что алкилхлордиеновые кетоны, являясь винилогами β -хлорвинилкетон [32], обладают высокой активностью по отношению к нуклеофильным реагентам, что показано в работах [9, 124].

Ацилирование хлоропрена хлорангидридами кротоновой и метакриловой кислот позволило разработать также доступный метод синтеза хлортриеновых кетонов [128].

Отдельный интерес представляют реакции сопряженного 1,4-ацилирования хлорсодержащих бутадиенов при проведении реакций в ароматических растворителях [9]. Продуктами реакций являются арилсодержащие несопряженные алкены.

Описано также ацилирование 1,5-циклооктадиена, при котором в результате скелетных изомеризаций образуется бициклическое соединение—2-ацетил-6-хлоро-*цис*-бицикло(3,3,0)октан [83].

Множественными скелетными изомеризациями сопровождается также ацилирование циклооктатетраена, приводящее к алкилзамещенному коричному альдегиду [131].

Ацилирование алкенинов

Реакции ацилирования алкенинов также не остались вне поля зрения исследователей [116, 129, 130, 132]. Было установлено, что взаимодействие винилацетилена с хлорангидридами карбоновых кислот при -20° приводит к смеси *цис*- и *транс*-изомеров алкил- β -хлорбутадиенил-кетонов [129, 132] в результате региоселективного 1,2-присоединения фрагментов ацилирующего агента по тройной связи.

Соотношение *цис*-*транс*-изомеров при $\text{R} = \text{CH}_3$ составляет 1 : 1,5, при $\text{R} = \text{C}_4\text{H}_9$ —1,3 : 1.

Ацилирование изопропенил- и циклогексенилацетиленов в аналогичных условиях приводит к *транс*-алкил- β -хлордиеновым кетонам [132, 116, 133].

Для *цис*-изомеров последних построением молекулярных моделей была показана их стерическая невыгодность [133].

При ацилировании изопропенилацетиленом при -80° образуется смесь продуктов 1,2- и 1,4-присоединения в соотношении 1 : 4 [133]. При перегонке соотношение изменяется в пользу диенона, а полностью провести изомеризацию удастся кратковременным нагревом смеси изомеров с хлористым литием в диметилформамиде.

Следует отметить, что фенилацетилен реагирует с хлористым ацетилем аналогично циклогексенилацетилену, т. е. ацилируется по тройной связи [116].

8. Циклизации в реакциях ацилирования

Рассмотренный экспериментальный материал включает многочисленные примеры протекания циклизации в процессе ацилирования. Структурным фактором, способствующим этому, является наличие непредельных фрагментов в молекуле, способных воспринимать атаку карбокатионных интермедиагов, образовавшихся на первой стадии реакции. В синтетическом отношении результатом подобных превращений явилась разработка методов получения производных циклопентенона [94—97, 100], инданона [52], декалона [47], флуоренона [52], фенантрена [53], а также карбоксоновых солей [79] и некоторых бициклических соединений [47, 107].

Проведение циклизации посредством ацилирования явилось также объектом специального изучения [134—139]. С целью моделирования биогенеза циклических терпенов осуществлена циклизация 1,5-полиеновых изопреноидов под действием ацилирующего агента [134].

Аналогичная реакция, инициируемая ацилий-катионом, была применена для синтеза трициклических структур [135].

Качественно иной тип циклизации может быть реализован при совместном нахождении в молекуле непредельного фрагмента и хлоркарбонильной группы. Подобная реакция внутримолекулярного ацилирования, сопровождающегося циклизацией, проведена на примере 1,5-полиенового изопреноида при действии четыреххлористого олова [136].

Недавно описана аналогичная реакция хлорангидрида γ -фенил- γ -циклопропилмасляной кислоты, при которой структура образующихся диклических продуктов зависит от применяемой кислоты Льюиса и растворителя [137]. Так, при действии четыреххлористого олова в бензоле, а также треххлористого алюминия в ацетонитриле происходит ацилирование ароматического ядра.

В то же время при применении хлористого метилена или бензола в качестве растворителей реакция протекает с раскрытием трехчленного кольца и образованием производных нафтаола, а также арилированных циклогептанонов [137].

Хлорангидриды изомерных $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ -непредельных кислот при наличии фенильного ядра также претерпевают внутримолекулярное ацилирование при действии треххлористого алюминия [138]. При этом в случае α -фенильной группы происходит ацилирование γ, δ -двойной связи с образованием производного циклопентенона. При наличии фенильной группы в γ -положении происходит ацилирование ароматического ядра.

Подобная реакция имеет место при действии треххлористого алюминия на хлорангидриды 4-циклогептенил- и 4-циклооктенилкарбоновых кислот [139].

9. Строение ацилирующих комплексов

При взаимодействии кислот Льюиса с галондангидридами карбоновых кислот образуются различные по устойчивости ацилирующие комплексы, для которых рядом авторов были предложены возможные структуры [7]. В настоящее время методами рентгеноструктурного анализа [144—148], а также ИК и ПМР спектроскопии [74, 75, 140—143] достоверно установлено, что в зависимости от природы кислоты Льюиса и ацилирующего агента реализуются два типа ацилирующих комплексов.

сов: ионные, включающие образование оксокарбониевых ионов, и молекулярные с донорно-акцепторной связью.

В ИК спектрах обнаруживаются полосы в области 2200—2300 cm^{-1} , характерные для ионных комплексов, и в области 1550—1600 cm^{-1} , относящиеся к молекулярным комплексам [74, 75, 140—143]. Следует отметить, что для большинства изученных ацилирующих комплексов характерно наличие двух полос в ИК спектре, свидетельствующих о сосуществовании обеих форм [141]. Вместе с тем в случае фторангидридов карбоновых кислот и пятифтористой сурьмы обнаруживается только ионная форма [142], а в случае галоидангидридов бензойной кислоты и треххлористого алюминия—молекулярная форма [143].

Два типа ацилирующих комплексов различаются также по данным ПМР спектров [74, 75, 142]. Наличие избыточного положительного заряда на атоме углерода карбонильной группы приводит к слабopольному смещению α -водородов в различной степени для обеих форм [175]. Для ряда ацилирующих комплексов наряду со спектрами ПМР изучены также спектры ЯМР ^{13}C , позволившие определить локализацию положительного заряда в случае различных заместителей в ацильном остатке [74, 142].

Наличие ионных и молекулярных комплексов недавно было однозначно показано методом рентгеноструктурного анализа, причем какая-либо третья форма обнаружена не была [144—148]. Для большого числа ацилирующих комплексов определены строение и параметры кристаллических структур. В частности, в случае оксокарбониевых солей показано наличие квазитройной связи углерод—кислород, причем угол $C-C-O$ равен $\sim 180^\circ$ [145, 146, 148].

Методами ИК и ПМР спектроскопии было обнаружено, что данный ацилирующий комплекс может существовать в растворах в виде ионной и молекулярной форм, соотношение которых зависит от растворителя: в полярных растворителях с высокой диэлектрической проницаемостью концентрация ионной формы возрастает [141]. Особенно четко это удалось показать на примере пары пятихлористая сурьма—*p*-толуол хлористый, для которой обе формы были выделены в кристаллическом состоянии из растворов в хлороформе и четыреххлористом углероде [147]. Следует особо отметить, что ионная форма может быть получена из хлороформного раствора молекулярной формы и, наоборот, молекулярная форма может быть получена из раствора ионной формы в четыреххлористом углероде. Последнее свидетельствует о наличии равновесия между обеими формами [147].

С точки зрения синтетической органической химии изучение реакций электрофильного ацилирования непредельных соединений оказалось исключительно плодотворным. Доступные методы синтеза были разра-

ботаны для многих классов органических соединений, таких как α,β - и β,γ -непредельные кетоны, β -хлор-, β -хлорвинил-, β -хлордивинилкетоны, β -дикетоны, дивинил- и арилвинилкетоны, винил- β -хлорбутадиенилкетоны, полихлорсодержащие алкилбутадиенилкетоны, производные циклопентенона, инданона, декалона, флуорснона, фенантрена, би- и трициклические системы.

Со времен оригинальных работ по ацилированию, выполненных в конце прошлого столетия, развитие данной области происходило в направлении варьирования всех четырех составных частей реакции: непредельной и ацилирующей компонент, кислоты Льюиса и растворителя. Определены границы применимости реакции, накоплен обширный экспериментальный материал. В качестве непредельной компоненты с успехом изучены многие классы органических соединений (алкены, алкины, циклоалкены и др.). Напротив, только ангидриды и галоидангидриды карбоновых кислот оказалось возможным применить в качестве ацилирующих агентов. В дальнейшем следует ожидать расширения границ данной реакции в результате изучения новых классов непредельных и ацилирующих соединений, в том числе функционально замещенных. Отдельный интерес представляет исследование непредельных элементоорганических соединений. В области химии природных соединений, прежде всего терпенов, реакции ацилирования могут найти более широкое применение, в частности, в направленных синтезах и для получения полициклических систем. Перспективным направлением является дальнейшее изучение реакции ацилирования с применением ионных ацилирующих агентов.

Вместе с этим особое внимание, по-видимому, будет уделено более углубленному изучению реакций, прежде всего, исследованию вопросов кинетики, оптической активности, стерео- и региохимии реакций.

Следует ожидать, что дальнейшее развитие области электрофильного ацилирования непредельных соединений окажется плодотворным как для синтетической, так и для теоретической органической химии.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. И. Л. Кондаков, ЖРВХО, 24, 309 (1892); 26, 229 (1894).
2. C. Friedel, J. M. Crafts, С. г., 84, 1392, 1150 (1877).
3. С. Г. Крапивин, Бюлл. общ-ва естествоиспытателей природы, М., 1908, стр. 1.
4. G. Darzens, С. г., 150, 707 (1910).
5. Friedel-Crafts and Related Reactions, Wiley-Interscience, N. Y.—London, v. 1—4, 1963—1965.
6. J. K. Groves, Quart. Rev., 1, 73 (1972).
7. B. Chevrier, R. Weiss, Angew. Chem., 13, 1 (1974).
8. В. А. Смит, ЖВХО им. Д. И. Менделеева, 22, 300 (1977).
9. Ш. О. Бадалян, С. К. Вардапетян, в кн. «Химия непредельных соединений», вып. 1, Изд. АН Арм. ССР, Ереван, 1979, стр. 7.
10. P. Beak, K. R. Berger, J. Am. Chem. Soc., 102, 3348 (1980).
11. N. Jones, H. T. Taylor, J. Chem. Soc., 1959, 4017.
12. А. Д. Петров, Е. П. Каплан, Изв. АН СССР, ОХН, 1947, 295.

13. *R. N. Carroll, G. B. L. Smith*, J. Am. Chem. Soc., 55, 370 (1933).
14. Пат. США № 1737203; [С. А., 24, 626 (1930)].
15. *J. Kepner, F. Statham*, Ber., 69, 16 (1936).
16. *M. McMahon*, J. Am. Chem. Soc., 70, 2971 (1948).
17. *Д. П. Широков, Т. В. Смирнова*, Тр. Моск. хим.-технол. ин-та им. Д. И. Менделеева, вып. 61, 1969, стр. 54.
18. *K. Bowden, P. N. Green*, J. Chem. Soc., 1952, 1164.
19. *N. Jones, H. T. Taylor*, J. Chem. Soc., 1961, 1345.
20. *J. F. Norris, H. B. Couch*, J. Am. Chem. Soc., 42, 2329 (1920).
21. *C. F. H. Allen, H. W. J. Cressman, A. C. Bell*, Can. J. Research, 8, 440 (1933).
22. *A. C. Burns, T. F. Doumani*, Ind. Eng. Chem., 35, 349 (1943).
23. *Л. П. Мецераков, Л. В. Петрова*, Изв. АН СССР, ОХН, 1951, 576; 1955, 1057.
24. *А. П. Мецераков, Л. В. Петрова, А. Д. Петров*, Изв. АН СССР, ОХН, 1960, 98.
25. *J. J. Colonge, K. Mostafavi*, Bull. soc. chim. France, 6, 335 (1939).
26. Пат. США № 2. 463. 742; [С. А., 43, 4685i (1949)].
27. *Л. П. Петренко*, ЖОХ, 33, 1641 (1963).
28. Пат. США № 2. 411. 823; [С. А., 41, 1234d (1947)].
29. Пат. США № 2. 457. 696; [С. А., 43, 3442a (1949)].
30. *F. Bergman, Sh. Israelasvilli, D. Gottlieb*, J. Chem. Soc., 1952, 2522.
31. *Б. А. Розенберг, Н. В. Джигирей, Г. Н. Дорофеенко, Е. П. Бабич*, ЖОХ, 32, 3417 (1962).
32. *М. И. Рыбинская, А. Н. Несмеянов, Н. К. Кочетков*, Усп. хим., 38, 961 (1969).
33. Пат. США № 2. 137. 664; [С. А., 33, 1758 (1939)].
34. *А. Н. Несмеянов, Н. К. Кочетков, М. И. Рыбинская*, Изв. АН СССР, ОХН, 1954, 741.
35. *P. R. Hills, F. J. McQuillan*, J. Chem. Soc., 1953, 4060.
36. *J. R. Catch, D. F. Elliott, D. H. Hey, E. R. H. Jones*, J. Chem. Soc., 1948, 278.
37. *M. M. Julia*, Ann. chim., 5, 595 (1950).
38. *Н. Н. Мушкало, Н. К. Мушкало*, Укр. хим. ж., 36, 915 (1970).
39. *G. Oulevey, B. P. Susz*, Helv. Chim. Acta, 48, 630 (1965).
40. *J.-P. Pillot, Dunques, C. R. Jacques*, Synth. Commun., 9, 395 (1979).
41. *H. Wetter, P. Schrerer, W. B. Schweizer*, Helv. Chim. Acta, 62, 1985 (1979).
42. *Л. М. Козлов, Е. А. Маркович, Б. Г. Лиорбер*, ЖОХ, 30, 1937 (1960).
43. *G. Blance*, Bull. soc. chim. France, 19, 699 (1898).
44. *C. D. Nenitzescu, E. Cloranescu*, Ber., 69B, 1820 (1936).
45. *R. C. Fuson, R. Johnson, W. Cole*, J. Am. Chem. Soc., 60, 1594 (1938).
46. *N. D. Zellinski, E. M. Tarassova*, Ann., 508, 115 (1934).
47. *Z. Bounkhala, S. Hacini, R. Pardo, M. Santelli*, Chem. Commun., 1979, 263.
48. *W. T. Brady, R. Roe, E. F. Hoff, F. H. Parry*, J. Am. Chem. Soc., 92, 146 (1970).
49. *R. E. Christ, R. C. Fuson*, J. Am. Chem. Soc., 59, 893 (1937).
50. *C. D. Nenitzescu, J. Cavat*, Ber., 70, 1883 (1937).
51. *N. C. Deno, H. Chafetz*, J. Am. Chem. Soc., 74, 3940 (1952).
52. *G. Baideley, H. T. Taylor, W. Pickles*, J. Chem. Soc., 1953, 124.
53. *C. D. Gutsche, W. S. Johnson*, J. Am. Chem. Soc., 68, 2239 (1946).
54. *W. S. Johnson, R. D. Offenhauer*, J. Am. Chem. Soc., 67, 1045 (1945).
55. *E. E. Rogals, C. M. Hendry*, J. Org. Chem., 15, 1147 (1950).
56. *C. D. Nenitzescu, J. P. Cantunlari*, Ann., 510, 269 (1934).
57. *S. L. Frliss, R. Pinson*, J. Am. Chem. Soc., 73, 3512 (1951).
58. *V. Vesta*, Lietuvos TSR Mosklu Akad. Darbai. Ser. B 1962, No. 3, 115.
59. *R. Jacquier, C. Petrus, F. Petrus, M. Valentin*, Bull. soc. chim. France. 1970, 2629.
60. *J. Colonge, E. Duroux*, Bull. soc. chim. France, 7, 459 (1940).
61. *M. Mouseron, R. Richaud, R. Cranger*, Bull. soc. chim. France, 1946, 218.
62. *N. Dufort, H. Lafontaine*, Can. J. Chem., 46, 1065 (1968).
63. *J. Allard, N. Dufort*, Can. J. Chem., 47, 2403 (1969).
64. *F. Ebel, M. W. Goldberg*, Helv. Chim. Acta, 10, 677 (1927).

65. A. L. Henne, J. M. Tedder, J. Chem. Soc., 1933, 3628.
66. G. Cauquil, H. Barrera, M. R. Barrera, Bull. soc. chim. France, 1933, 1111.
67. L. Ruzicka, H. A. Bockenhögen, Helv. Chim. Acta, 14, 1319 (1931).
68. W. Taub, J. Szmuzzkowicz, J. Am. Chem. Soc., 74, 2117 (1952).
69. N. Jones, H. T. Taylor, E. Rudd, J. Chem. Soc., 1961, 1342.
70. T. S. Cantrell, J. Org. Chem. Soc., 32, 1669 (1967).
71. J. K. Groves, N. Jones, J. Chem. Soc., C 1969, 1718.
72. M. Muhtstadt, P. Richter, Ber., 100, 1892 (1967).
73. G. A. Olah, H. Quinn, S. Kuhn, J. Am. Chem. Soc., 82, 426 (1960).
74. G. A. Olah, W. Toglietti, S. J. Kuhn, M. E. Moffatt, J. J. Bastien, E. V. Baker, J. Am. Chem. Soc., 85, 1328 (1963).
75. G. A. Olah, S. J. Kuhn, W. S. Toglietti, J. Am. Chem. Soc., 84, 2733 (1962).
76. В. А. Смит, А. В. Семеновский, В. Ф. Кучеров, М. З. Кример, О. В. Любинская, Т. Н. Чернова, Изв. АН СССР, сер. хим., 1970, 1681.
77. В. А. Смит, А. В. Семеновский, О. В. Любинская, В. Ф. Кучеров, ДАН СССР, 203, 604 (1972).
78. О. В. Любинская, В. А. Смит, А. В. Семеновский, В. Ф. Кучеров, ДАН СССР, 203, 829 (1972).
79. O. V. Lubinskaya, A. S. Shashkov, V. A. Chertkov, W. A. Smit, Synth., 1976, 742.
80. О. В. Любинская, В. А. Смит, А. В. Семеновский, В. Ф. Кучеров, Изв. АН СССР, сер. хим., 1978, 1803.
81. О. В. Любинская, В. А. Смит, А. С. Шашков, В. А. Чертков, М. И. Канищев, В. Ф. Кучеров, Изв. АН СССР, сер. хим., 1978, 397.
82. Е. С. Баленкова, Е. Б. Фролов, С. Н. Анфиломова, ЖОХ, 14, 1109 (1978).
83. С. Н. Анфиломова, М. И. Кенгерли, Е. С. Баленкова, ЖОХ, 14, 1627 (1978).
84. H. M. R. Hoffmann, T. Tsushima, J. Am. Chem. Soc., 99, 6008 (1977).
85. N. D. Zellinskii, E. M. Tarassova, Ann., 508, 115 (1934).
86. А. Н. Несмеянов, Н. К. Кочетков, М. И. Рыбинская, Изв. АН СССР, ОХН, 1950, 350.
87. Пат. Япония № 6463; [С. А., 47, 112261 (1953)].
88. H. P. Kaufmann, W. Stamm, Anstrichmittel, 59, 945 (1957).
89. W. R. Benson, A. E. Pohland, J. Org. Chem., 29, 385 (1964).
90. В. Н. Белов, Г. З. Шехтман, ЖОХ, 23, 1501 (1953).
91. Н. К. Кочетков, А. Я. Хорлин, М. Я. Карпейский, ЖОХ, 26, 595 (1956).
92. В. Е. Сибирцева, В. Н. Белов, Тр. ВНИИ синтетических и натуральных душистых веществ, № 5, 42 (1961).
93. Н. К. Кочетков, А. Я. Хорлин, Б. П. Готтих, А. Н. Несмеянов, Изв. АН СССР, ОХН, 1958, 1053.
94. G. J. Martin, G. Davlaud, Bull. soc. chim. France, 1970, 3098.
95. C. J. Martin, C. Rabiller, R. Guldin, Bull. soc. chim. France, 1971, 4554.
96. G. J. Martin, C. Rabiller, G. Mabon, Tetrah., 23, 4027 (1972).
97. C. Rabiller, G. Mabon, G. J. Martin, Bull. soc. chim. France, 1973, 3462.
98. R. Broekema, S. Van der Werf, J. F. Arens, Rec. trav. chim., 77, 258 (1958).
99. Г. В. Ройтбург, В. А. Смит, А. В. Семеновский, ДАН СССР, 203, 1086 (1972).
100. А. А. Schegolev, W. A. Smit, G. A. Roitburd, V. F. Kucherov, Tetrah. Lett., 1974, 3373.
101. А. А. Schegolev, W. A. Smit, V. F. Kucherov, R. Caple, J. Am. Chem. Soc., 97, 6604 (1975).
102. А. А. Щеголев, Р. Кэпл, В. А. Смит, В. Ф. Кучеров, Изв. АН СССР, сер. хим., 1975, 2382.
103. М. И. Канищев, В. А. Смит, А. А. Щеголев, Р. Кэпл, Изв. АН СССР, сер. хим., 1978, 511.
104. М. И. Kanishev, M. A. Smit, A. A. Schegolev, R. Caple, Tetrah. Lett., 1978, 1421.
105. М. И. Канищев, В. А. Смит, А. А. Щеголев, А. П. Родионов, Р. Кэпл, Изв. АН СССР, сер. хим., 1979, 835.
106. М. И. Kanishev, A. A. Schegolev, W. A. Smit, R. Caple, M. J. Kelner, J. Am. Chem. Soc., 101, 5660 (1979).

107. О. В. Любинская, В. А. Смит, В. Ф. Кучеров, А. А. Щеголев, Р. Кэпл, Изв. АН СССР, сер. хим., 1979, 1776.
108. С. А. Хуршудян, А. А. Щеголев, В. А. Смит, В. Ф. Кучеров, Изв. АН СССР, сер. хим., 1977, 1203.
109. С. А. Хуршудян, А. А. Щеголев, В. А. Смит, В. Ф. Кучеров, Изв. АН СССР, сер. хим., 1977, 1203.
110. С. А. Хуршудян, А. А. Щеголев, В. А. Смит, В. Ф. Кучеров, А. П. Родионов, Изв. АН СССР, сер. хим., 1978, 1559.
111. А. А. Schegolev, W. A. Smit, S. A. Khurshudyan, V. A. Chertkov, V. F. Kucherov Synth., 1977, 324
112. А. А. Щеголев, В. А. Смит, С. А. Хуршудян, В. А. Чертков, В. Ф. Кучеров, Изв. АН СССР, сер. хим., 1977, 1093.
113. С. А. Хуршудян, А. А. Щеголев, В. А. Смит, В. А. Чертков, В. Ф. Кучеров, Изв. АН СССР, сер. хим., 1977, 2754.
114. В. А. Смит, А. А. Щеголев, В. Ф. Кучеров, Изв. АН СССР, сер. хим., 1972, 2377.
115. Пат. США № 2. 971. 983; [С. А., 55, 24567 (1961)].
116. К. Л. Саркисян, Т. Т. Минасян, Ш. О. Баданян, Арм. хим. ж., 27, 848 (1974).
117. H. Alper, J. K. Gurrle, H. D. Abbayes, Chem. Commun., 1978, 311.
118. Пат. США № 3. 149. 135; [С. А., 62, 4054e (1965)].
119. К. Н. Анисимов, Г. К. Магомедов, Н. Е. Колобова, А. Г. Труфанов, Изв. АН СССР, сер. хим., 1970, 2533.
120. R. F. Hess, J. Am. Chem. Soc., 85, 3383 (1963).
121. I. Fleming, J. Coldhill, I. Peterson, Tetrah. Lett., 1979, 3209.
122. Ш. О. Баданян, К. Л. Саркисян, А. А. Геворкян, ЖОрХ, 7, 622 (1971).
123. Ш. О. Баданян, К. Л. Саркисян, А. А. Геворкян, Авт. свид. СССР № 338519 (1970), Бюлл. изобр. № 16 (1972).
124. Ш. О. Баданян, К. Л. Саркисян, Арм. хим. ж., 26, 817 (1973).
125. Ш. О. Баданян, К. Л. Саркисян, Арм. хим. ж., 28, 925 (1973).
126. Ш. О. Баданян, К. Л. Саркисян, Авт. свид. СССР № 395356 (1971), Бюлл. изобр. № 35, (1973).
127. Ш. О. Баданян, К. Л. Саркисян, Т. Т. Минасян, ЖОрХ, 11, 512 (1975).
128. Ш. О. Баданян, К. Л. Саркисян, Т. Т. Минасян, Авт. свид. СССР № 426994 (1972), Бюлл. изобр. № 17 (1974).
129. Г. Г. Меликян, К. А. Атансян, Ш. О. Баданян, ЖВХО им. Д. И. Менделеева, в печати (1981).
130. Ш. О. Баданян, К. Л. Саркисян, А. А. Геворкян, ЖОрХ, 7, 662 (1971).
131. A. C. Core, T. A. Liss, D. S. Smith, J. Am. Chem. Soc., 79, 240 (1957).
132. Ш. О. Баданян, К. Л. Саркисян, Арм. хим. ж., 26, 733 (1973).
133. Г. Г. Меликян, Э. В. Бабаян, Ш. О. Баданян, Арм. хим. ж., в печати.
134. W. A. Smit, A. V. Semenovskiy, V. F. Kucherov, Tetrah. Lett., 1964, 2299.
135. F. J. Corey, R. Balanson, Tetrah. Lett., 1973, 3153.
136. T. Kato, T. Kobayashi, Y. Kitaçara, Tetrah. Lett., 1975, 3299.
137. M. P. Doyle, R. C. Elliott, J. F. Dellaria, J. Org. Chem., 43, 4459 (1978).
138. A. Roedig, P. Gelst, H. Gopfert, H. Jarosch, Chem. Ber., 112, 2730 (1979).
139. A. Hechtmann, W. Kraus, Tetrah., 34, 405 (1978).
140. B. P. Susz, J. J. Wuhrmann, Helv. Chim. Acta, 40, 722, 1971 (1957).
141. D. Cook, Can. J. Chem., 37, 48 (1959).
142. G. A. Olan, M. B. Comisarov, J. Am. Chem. Soc., 88, 3313, 4442 (1966); 89, 2694 (1967).
143. B. P. Susz, D. Gassmatts, Helv. Chim. Acta, 44, 395 (1961).
144. S. E. Rasmussen, N. C. Bruch, Acta Chem. Scand., 20, 1351 (1966).
145. J. M. Carpenter, R. Weiss, Acta Cryst., B28, 1437, 1421, 1430, 1442 (1972).
146. B. Chevrier, J. M. Carpenter, R. Weiss, Acta Cryst., B28, 2659, 2667 (1972).
147. B. Chevrier, J. M. Carpenter, R. Weiss, J. Am. Chem. Soc., 94, 5718 (1972).
148. F. D. Boer, J. Am. Chem. Soc., 90, 6706 (1968).