РЕАКЦИИ НЕПРЕДЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

LXXXVI. РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ЛАКТОНИЗАЦИИ МЕТИЛОВОГО ЭФИРА ДИМЕТИЛВИНИЛЭТИНИЛКАРБИНОЛА

Г. Г. МЕЛИКЯН, Д. А. МКРТЧЯН и Ш. О. БАДАНЯН

Институт органической химии АН Армянской ССР, Ереван

Поступило 22 VII 1981

Показано, что взаимодействие диметилвинилэтинилкарбинола с уксусной кислотой, диэтиловым эфиром малоновой кислоты в присутствии окислительной системы Mn^{3+}/Cu^{2+} приводит к производным γ -бутанолида, а с этиловым эфиром циануксусной кислоты—к этиловому эфиру 2-циано-4-ацетокси-7-метил-7-метокси-5-октиновой кислоты. Проведен ряд превращений полученных соединений.

Табл. 1, библиограф. ссылок 10.

Лактонное кольцо является молекулярным фрагментом, входящим в состав молекул многих физиологически активных и природных веществ [1—3]. В частности, в последние годы выяснилось, что производные бутиролактона, содержащие в γ -положении алкенильные группы, являются половыми феромонами некоторых животных [4, 5]. Этот факт побудил нас исследовать возможность лактонизации сопряженных ениновых систем на примере модельного соединения—метилового эфира диметилвинилэтинилкарбинола (ДМВЭК). Ранее нами было проведено систематическое изучение реакций сопряженных ениновых систем с α, α -диоксоалкильными радикалами, генерируемыми из β -дикарбонильных соединений под действием ацетата трехвалентного марганца [6—8]. В продолжение проведенных исследований и в качестве потенциального метода лактонизации были выбраны реакции модельного соединения с уксусной кислотой, диэтиловым эфиром малоновой кислоты и этиловым эфиром циануксусной кислоты в присутствии окислительной системы ацетат Mn^{3+} — ацетат Cu^{2+} .

Как оказалось, метиловый эфир ДМВЭК при нагревании в течение 4 ч при 125° с уксусной кислотой в присутствии ацетата марганца (III) приводит к 4-(3-метил-3-метокси-1-бутинил)бутанолиду (I) с выходом 33%. Структура I свидетельствует о высокой региоселективности реакции, при которой атака α -карбоксиметильного радикала, генерируемого окислением уксусной кислоты, направляется исключительно на двойную связь молекулы. Следует отметить, что эффективность защиты тройной связи метоксидиметилметильной группой в радикальных реакциях енинов была отмечена ранее [8]. Промежуточный пропаргильный радикал А стабилизируется циклизацией по карбоксильной группе с образованием лактонного кольца.

Таким образом, лактонизация двойной связи модельного соединения протекает аналогично соответствующей реакции олефинов [9].

Взаимодействие метилового эфира ДМВЭК с диэтиловым эфиром малоновой кислоты в присутствии окислительной системы ацетат Mn^{3+} — ацетат Cu^{2+} при 70—75° приводит к 2-карбэтокси-4-(3-метил-3-метокси-1-бутинил-бутанолиду) (II) с выходом 43%.

Образование II происходит в результате атаки α,α -дикарбэтоксиметильного радикала по двойной связи исходного соединения с последующей окислительной циклизацией пропаргильного радикала Б по карбэтоксильной группе. Образовавшийся вторичный радикал В стабилизируется дезэтилированием с образованием II.

Следует отметить, что данная реакция является первым примером циклизации промежуточных частиц, сопряженных с кратными связями по карбэтоксильной группе [6—8]. Вместе с этим промежуточный радикал В в отличие от аналогичных интермедиатов в реакциях ацетилацетона и ацетоуксусного эфира не депротонируется с образованием производных 4,5-дигидрофурана [6—8], а дезалкилируется, приводя к производному бутанолида II.

Соединение II под действием водно-спиртовой щелочи подвергалось дециклизации-омылению, приводящему к соответствующей оксидикислоте IIa. Последняя при перегонке циклизовалась в искомый лактон I с выходом 65%.

Реакция модельного соединения с этиловым эфиром циануксусной кислоты в аналогичных условиях приводит к этиловому эфиру 2-циано-4-ацетокси-7-метил-7-метокси-5-октиновой кислоты (III) с выходом 44%. Данная реакция является первым примером образования продукта с линейной структурой в реакциях α,α -диоксиалкильных радикалов с сопряженными енинами [6—8]. Омыление III в аналогичных условиях приводит к оксидикислоте IIa, циклизующейся в лактон I с выходом 75%.

Попытка вовлечь в реакцию динитрил малоновой кислоты не увенчалась успехом, т. к. в условиях реакции (70°, уксусная кислота) наблюдалось омыление нитрильных групп, приводящее к смеси продуктов.

Таким образом, выход искомого лактона I через две стадии составляет для диэтилового эфира малоновой и этилового эфира циануксусной кислот соответственно 28 и 33%. Следовательно, при одинаковом выходе продукта I метод прямой лактонизации по сравнению с двумя другими оказывается предпочтительнее вследствие одностадийности процесса и дешевизны применяемых реагентов.

На основе лактона I проведен также синтез соединения V с потенциальной пиретроидной активностью по схеме, аналогичной синтезу этилового эфира 2-(2,2-дихлорвинил)-3,3-диметилциклопропанкарбоновой кислоты [10]. Кислотным расщеплением I под действием тионила хлористого в этаноле получен этиловый эфир 4-хлор-7-метил-7-метокси-5-октиновой кислоты IV.

Последнюю 1,3-дегидрохлорированием превращали в эфир 2-(3-метил-3-метокси-1-бутинил)циклопропанкарбоновой кислоты V.

Экспериментальная часть

Спектры ПМР сняты в четыреххлористом углероде на спектрометре «Perkin-Elmer R-12 В» (60 МГц). Химические сдвиги приведены в м. д. (шкала δ) относительно ТМС, КССВ—в Гц. ИК спектры чистых веществ получены в тонком слое на спектрометре UR-20, масс-спектры—на MX-1303 с энергией ионизирующих электронов 30 эВ. ГЖХ анализ проведен на хроматографе «Цвет-104» с катарометром на колонках (2 м × 3 мм) с насадкой 5% SE-30 (Chromaton N-AW-DMCS, 0,200—0,250 мм) для соединений I—IV и 15% Apiezon L. (Chromaton N-AW-DMCS (0,125—0,160 мм) для соединения V, газ-носитель—гелий. ТСХ анализ выполнен на пластинках Silufol UV-254, элсент—эфир, обнаруженне парами йода. Константы соединений I—V приведены в таблице.

Таблица

Константы соединений I—V

Соединение	Выход, %	Т. кип., °С/1 мм	n_D^{20}	R_f	ГЖХ: Т, °С V, мл/мин; $t_{удерж}$, мин	Найдено, %		Вычислено, %	
						С	Н	С	Н
I	33	110	1,4748	0,48	195; 23; 5,4	65,7	7,90	65,93	7,69
II	43	159—163	1,4610	0,66	195; 30; 26,1	61,53	7,36	61,42	7,09
III*	44	152—155	1,4650	0,53	217; 23; 7,2	61,23	7,27	61,02	7,12
IV	83	98—99	1,4650	0,75	182; 22; 10,2	58,08	8,16	58,42	7,7
V	60	76—77	1,4618	0,79	193; 20; 10,8	68,50	8,91	68,57	8,57

* Найдено %: N 4,67. C₁₅H₂₁O₅N. Вычислено %: N 4,74.

4-(3-Метил-3-метокси-1-бутинил)-бутанолид (I). К раствору 150 г ацетата калия в 500 мл уксусной кислоты прибавляют 26,8 г (0,1 моля) Мп (ОАс)₃·2Н₂О и 6,2 г (0,05 моля) метилового эфира ДМВЭК. Реакционную смесь нагревают в атмосфере аргона при 125° 4 ч (до просветления реакционной смеси). После охлаждения реакционную смесь обрабатывают водой, экстрагируют эфиром. Эфирный экстракт промывают водой, сушат над Na₂SO₄. После удаления эфира остаток перегоняют в вакууме. Получено 3,0 г I. Спектр ПМР: 1,35 с (6H, 2СН₃), 2,0—2,65 м (4H, 2СН₂), 3,22 с (3H, ОСН₃), 5,10 т. расщ. (1H, СН), J_{СН,СН}, 7,0. ИК спектр, см⁻¹: 2245 (С≡С), 1788 (С=О лактон. кольца), МС: М⁺ 182.

2-Карбэтокси-4-(3-метил-3-метокси-1-бутинил)-бутанолид (II). К раствору 1,5 г (7 ммоль) Си(ОАс)₂·2Н₂О в 65 мл ледяной уксусной кислоты прибавляют 26,8 г (0,1 моля) Мп(ОАс)₃·3Н₂О, 32,0 г (0,2 моля) диэтилового эфира малоновой кислоты и 12,4 г (0,1 моля) метилового эфира ДМВЭК. Смесь перемешивают в инертной атмосфере при 70—75° до перехода коричневой окраски раствора в голубую (20 мин). Затем реакционную массу фильтруют, фильтрат обрабатывают водой, экстрагируют эфиром, эфирный экстракт сушат над Na₂SO₄ и упаривают. Остаток (10,0 г) перегоняют и выделяют 7,0 г II.

Соединение II выделено также с помощью колоночной хроматографии на стеклянной колонке (внутренний диаметр 2,0 см), заполненной 50,0 г Silica Gel Woelm (70—120 мкм), элюент—бензол-ацетат, 12:1 (общий объем 260 мл), скорость подвижной фазы 2 мл/мин. Из 1,5 г сырого продукта получают 1,14 г (65,0%) II. ПМР спектр: 1,22 т (3H, СН₃), 1,35 с (6H, 2СН₃), 2,26 т (2H, СН₂), 3,25 с (3H, ОСН₃), 3,42 т (1H, СН), 4,18 кв (2H, ОСН₂), 5,42 т (1H, ОСН). J_{СН,СН}, 7,0, J_{СН,СНО} 7,0, J_{СН,СНО} 7,0. ИК спектр, см⁻¹: 2250 (С≡С), 1788 (С=О лактон. кольца), 1740, 1750 (СООС₂Н₅).

Этиловый эфир 2-циано-4-ацетокси-7-метил-7-метокси-5-октиновой кислоты (III). Аналогично из 1,5 г (7 ммоль) Си(ОАс)₂·2Н₂О в 65 мл уксусной кислоты, 26,8 г (0,1 моля) Мп(ОАс)₃·2Н₂О, 22,6 г (0,2 моля) этилового эфира циануксусной кислоты и 12,4 г (0,1 моля) метилового эфира ДМВЭК перегонкой получают 6,5 г III. Спектр ПМР: 1,32 т (3H, СН₃), 1,36 с (6H, 2СН₃), 2,05 с расщ. (3H, ОСОСН₃), 2,38 т (2H, СН₂), 3,25 с (3H, ОСН₃), 3,4—3,8 м (1H, СН), 4,30 кв (2H, СН₂), 5,61 т (1H, ОСН), J_{СН,СН}, 7,0, J_{СН,СНО} 7,0, J_{СН,СН} 7,0. ИК спектр, см⁻¹: 2256 (С≡N), 1740 (СООС₂Н₅).

Омыление 2-карбэтокси-4-(3-метил-3-метокси-1-бутинил)-бутанолида. В круглодонной колбе с обратным холодильником кипятят 4 ч смесь 4,6 г (0,018 моля) II, 5,6 г (0,1 моля) едкого кали, 10 мл воды и 20 мл этилового спирта. После окончания реакции отгоняют в слабом вакууме основную массу спирта. Остаток растворяют в минимальном объеме воды и при 0° подкисляют 20% раствором Н₂SO₄ до рН 1. После этого реакционную смесь высаливают (NaCl), многократно экстрагируют эфиром, сушат над Na₂SO₄, эфир упаривают. ИК спектр остатка, см⁻¹: 3400—3300 (ОН), 3200—2500 (СООН). Перегонкой получают 2,0 г (65%) I.

Омыление этилового эфира 2-циано-4-ацетокси-7-метил-7-метокси-5-октиновой кислоты. Аналогично предыдущему из 1,3 г (0,004 моля)

III, 2,24 г (0,04 моля) едкого кали, 3 мл воды и 5 мл этилового спирта получают 550 мг (75%) I.

Этиловый эфир 4-хлор-7-метил-7-метокси-5-октиновой кислоты (IV). Смесь 4,0 г (0,022 моля) I и 10,3 г тионилхлорида нагревают 3 ч на водяной бане, затем охлаждают реакционную массу и добавляют 5 мл этилового спирта. Нагревают еще 2 ч и отгоняют основное количество спирта. Остаток перегоняют, получают 4,5 г IV. Спектр ПМР: 1,20τ (3H, CH₃), 1,36 с (6H, 2CH₂), 2,05—2,60 м (4H, 2CH₂), 3,22 с (3H, OCH₃), 4,08 кв (2H, OCH₂), 4,64 τ (1H, CHCl), J_{CH,CH}, 7,0, J_{CH,OH}, 7,0. ИК спектр, см⁻¹: 1730 (COOC₂H₅), 2250 (C≡C).

Этиловый эфир 2-(3-метил-3-метокси-1-бутилил)циклопропанкарбоновой кислоты. 0,74 г (0,032 моля) натрия растворяют в 30 мл этилового спирта, затем прикапывают 4,0 г (0,016 моля) IV и нагревают при 80° 2 ч. Отгоняют основное количество спирта, обрабатывают водой, экстрагируют эфиром (5×25 мл), сушат над Na₂SO₄. Перегонкой получают 2,0 г V. Спектр ПМР: 1,22 τ (3H, CH₃), 1,27 с (6H, 2CH₂), 1,76 τ (2H, CH₂), 3,15 с (3H, OCH₃), 4,06 кв (2H, OCH₂). ИК спектр, см⁻¹: 2245 (C≡C), 1730 (COOC₂H₅), 850, 1010 (циклопропановое кольцо). МС: М⁺ 210.

ՉՀԱԳԵՑԱԾ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐ

LXXXVI. ԴԻՄԵԹԻԼՎԻՆԻԼԵԹԻՆԻԿԱՐԲԻՆՈԼԻ ԼԱԿՏՈՆԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

Գ. Գ. ՄԵԼԻԿԻԱՆ, Դ. Ա. ՄԿՐՏՉՅԱՆ և Շ. Հ. ԲԱԴԱՆԻԱՆ

Ցույց է տրված, որ դիմեթիլվինիլէթինիլկարբինոլի փոխազդեցությունը քացախաթթվի և մալոնաթթվի դիէթիլէսթերի հետ Mn³⁺/Cu²⁺ օքսիդիչ համակարգի ներկայությամբ բերում է γ-բուտանոլիդի ածանցյալների, իսկ ցիանքացախաթթվի էթիլէսթերի հետ՝ 2-ցիան-4-ացետօքսի-7-մեթիլ-7-մեթօքսի-5-օկտինաթթվի էթիլէսթերի: Կատարվել է ստացված միացությունների մի շարք փոխարկումներ:

REACTIONS OF UNTATURATED COMPOUNDS

LXXXVI. THE ELABORATION OF THE METHOD OF DIMETHYL-VINYLETHTHNYLCARBINOL LACTONIZATION

G. G. MELIKIAN, D. A. MKRTCHIAN and Sh. O. BADANIAN

It has been shown that interaction of dimethylvynylethynylcarbinol with acetic and diethylester of malonic acid in the presence of manganese (III) acetate brings to the derivatives of γ-butanolide. Analogous reaction of ethyl ester of cyanoacetic acid resulted in ethyl ester of 2-cyano-4-acetoxy-7-methyl-7-methoxy-5-octynoic acid. Some reactions of compounds obtained have been investigated.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. В. В. Ежов, С. Н. Данышин, П. Ф. Поташиников, Г. А. Сокольский, ЖВХО им. Д. И. Менделеева, 23, 225 (1978).
2. A. R. Pinder, Chem. Rev., 64, 551 (1964).
3. В. М. Березовский, Химия витаминов, М., 1973, 19.

4. I. H. Tumlinson, M. G. Klein, R. E. Doolittle, A. T. Proveaux, *Science*, 789 (1977).
5. W. H. Pirkle, E. Adams, *J. Org. Chem.*, 44 (13), 2169 (1979).
6. Г. Г. Меликян, Д. А. Мкртчян, Ш. О. Баданян, *ХГС*, 1980, 884.
7. Г. Г. Меликян, Д. А. Мкртчян, Ш. О. Баданян, *ХГС*, 1982, 19.
8. Г. Г. Меликян, Д. А. Мкртчян, Ш. О. Баданян, *Арм. хим. ж.*, 34, 1011 (1981).
9. E. I. Helba, R. M. Dessau, W. I. Koehl, *J. Am. Chem. Soc.*, 90, 5905 (1968).
10. A. Buder, *Aldrichimico Acta*, 9, № 3; 49 (1976).

УДК 547.724.3

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ НЕНАСЫЩЕННЫХ ЛАКТОНОВ

L. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАРБОНИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 2-БУТЕН-4-ОЛИДОВ С АМИНОСОЕДИНЕНИЯМИ

А. М. ДЖАНДЖАПАНЯН, А. А. АВETИСЯН, Б. К. КАСПАРЯН
и М. Т. ДАНГЯН

Ереванский государственный университет

Поступило 18 VII 1980

Получены имины, аминокетоны и амиды, содержащие лактонное кольцо, исходя из 2-ацетил-, 2-бромацетил- и 2-хлорформил-2-бутен-4-олидов.

Табл. 1, библи. ссылок 3.

В продолжение работ по химическим превращениям функционально замещенных ненасыщенных γ -лактонов [1, 2] показано, что при нагревании в этиловом спирте 2-ацетил-2-бутен-4-олид конденсируется с тиомочевинной, тиосемикарбазидом, 4-карбо-N,N-диэтиламиноэтоксанилином и их гидрохлоридами. Реакции с тиомочевинной и тиосемикарбазидом протекают только за счет кетонного карбонила, что наблюдалось и ранее для других случаев [2].

Реакции тех же бутенолидов с *p*-аминобензолсульфонамидом и 2-амино-1,3-диокси-1-(4-нитрофенил)пропаном протекают лишь при кипячении смеси компонентов в ледяной уксусной кислоте.

В ИК спектрах полученных соединений имеются полосы поглощения, характерные для лактонного карбонила ($1745\text{--}1750\text{ см}^{-1}$), $\text{C}=\text{C}$ связи ($1654\text{--}1662\text{ см}^{-1}$), NH_2 группы ($3250\text{--}3365\text{ см}^{-1}$, для I—IV и VI), бензольного ядра ($1580\text{--}1600\text{ см}^{-1}$, для V, VI), групп OH и NO_2 (3270 и 1380 см^{-1} , для VII), а также концевой винильной группы ($875\text{--}950\text{ см}^{-1}$), свидетельствующие о наличии в молекулах енаминной таутомерной формы.

При взаимодействии 2-ацетил-2-бутен-4-олида с 2-амино-1,3-диокси-1-(4-нитрофенил)пропаном и параформальдегидом в условиях реакции Манниха наблюдаются расщепление и сополимеризация продукта с об-