ԿՀՊ + ՕՄՖ + Co²⁺ ռեակցիայի դոմարային արագությունը արտահայտվում է հետևյալ հավասարումով.

$$W_{\text{total}}^{\circ} = K_{1, \text{cat}} [\text{ՕՄՖ}]_0 [\text{ԿՀՊ}]_0 + K_{1, \text{non}} [\text{Co}^{2+}]^{0.5} \cdot [\text{ՕՄՖ}]_0 [\text{ԿՀՊ}]_0$$

Ձկատալիզված և կատալիզված ռեակցիաների արագության հաստատունների ջերմաստիճանային կախվածությունները բավարարում են Արենիուսի հավասարմանը՝

$$K_{1, \text{cat}} = 2,75 \cdot 10^{10} \exp(-17500/RT) \text{ l} \cdot \text{մոլ}^{-1} \cdot \text{րոպ}^{-1}$$

$$K_{1, \text{non}} = 1,9 \cdot 10^5 \exp(-9500/RT) \text{ l} \cdot \text{մոլ}^{-1} \cdot \text{րոպ}^{-1}$$

THE KINETICS OF THE REACTION OF CUMENE HYDROPEROXIDE WITH OCTYL MORPHOLINE IN AQUEOUS SOLUTION WITHOUT AND IN THE PRESENCE OF Co (II)

S. K. GRIGORIAN

The kinetics of cumene hydroperoxide (CHP) reaction with octyl morpholine (OM) and Co (II) has been studied in 50–80° temperature range. The first reaction occurs by non radical mechanism, the second is radical chain.

The over-all rate law (W_{Σ}°) has the following expression

$$W_{\Sigma}^{\circ} = \{K_{\text{noncat}} + K_{\text{cat}} [\text{Co}^{2+}]^{0.5}\} [\text{OM}]_0 [\text{CHP}]$$

where

$$K_{\text{noncat}} = 2,75 \cdot 10^{10} \exp(-17500/RT) \text{ M}^{-1} \text{ min}^{-1}$$

$$K_{\text{cat}} = 1,9 \cdot 10^5 \exp(-9500/RT) \text{ M}^{-1} \text{ min}^{-1}$$

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Н. М. Бейлерян, О. А. Чалтыкян, С. К. Григорян, Э. З. Меликсетян, Арм. хим. ж., 21, 7 (1968).
2. С. К. Григорян, Арм. хим. ж., 31, 357 (1978).
3. С. К. Григорян, Н. М. Бейлерян, Арм. хим. ж., 30, 634 (1977).

УДК 541.127+678.744.422

РОЛЬ ФЕНИЛДИЭТАНОЛАМИНА ПРИ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ СТИРОЛА, ИНИЦИИРОВАННОЙ ДИНИТРИЛОМ АЗОИЗОМАСЛЯНОЙ КИСЛОТЫ И ПЕРОКСИДОМ БЕНЗОИЛА

Б. М. СОГОМОНЯН

Ереванский государственный университет

Поступило 1 XII 1980

Показано, что присутствие фенилдиэтанолamina (ФДЭола) не влияет на кинетические параметры при полимеризации стирола в массе, если процесс инициируется радикалами динитрила азонизомасляной кислоты (ДАК), генерируемыми его термическим и фоторазложением. При полимеризации же стирола, инициированной системой перок-

сид бензоила (ПБ)—фенилдиэтанолмин, наблюдаются отклонения от «идеальной» кинетики. Причина аномалии—изменение механизма обрыва цепей: квадратичный обрыв макрорадикалов переходит в обрыв на первичных радикалах инициатора.

Рис. 2, табл. 5, библиографические ссылки 12.

Работы по кинетике полимеризации винилацетата (ВА) [1—3], стирола (СТ) [4—6], метилметакрилата (ММА) [7, 8], иницированной окислительно-восстановительными системами ПБ—алкиламиноспирты, а также ДАК, можно в общем охарактеризовать следующим образом: 1) если инициатором служит ДАК, то присутствие алкиламиноспиртов не сказывается ни на общей скорости полимеризации, ни на скорости иницирования, ни на константах роста и обрыва цепей; 2) если генерация цепей производится системой ПБ—алкиламиноспирт, то наблюдаются отклонения от «идеальной» кинетики.

Среди аминосспиртов достоин внимания ФДЭоЛА, который, будучи аминосспиртом, должен проявлять присущие им свойства и в то же время должен обладать стабилизирующим действием на полимер.

Исследование системы ПБ—ФДЭоЛА как инициатора полимеризации даст возможность обобщить сделанные ранее наблюдения, распространить заключения, сделанные на примере алкиламиноспиртов, на арил-аминосспирты и окончательно выявить причину отклонений от «идеальности».

Целью настоящей работы является выявление роли ФДЭоЛА в элементарных стадиях полимеризации стирола.

Экспериментальная часть

Стирол обрабатывался 10% раствором щелочи, после отмыwania щелочи и высушивания от влаги перегонялся при пониженном давлении. ФДЭоЛА использован марки «х. ч.».

Скорость полимеризации определялась dilatометрически, скорость иницирования—методом ингибирования. Ингибитором служил стабильный иминоксильный радикал—2,2,6,6-тетраметил-4-оксо-пиперидин-1-оксил.

Вначале иницирование в присутствии ФДЭоЛА проводилось ДАК, т. к. известно, что амины не влияют на скорость его термического разложения [9—11], следовательно, участие амина в стадии иницирования цепей заведомо исключается. В таком случае влияние амина должно проявиться в росте и обрыве цепей.

В табл. 1 приведены значения суммарной скорости полимеризации стирола и скорости иницирования цепей в отсутствие и в присутствии ФДЭоЛА. Неизменность $W_{\text{пм}}$ и $W_{\text{ин}}$ дает основание предполагать инактивность ФДЭоЛА в стадиях формирования макромолекул.

Сопоставление некоторых кинетических параметров полимеризации стирола в присутствии ФДЭоЛА с соответствующими величинами в присутствии алкиламиноспиртов [5] и без амина [12] подтверждает высказанное выше предположение (табл. 2).

В табл. 3 приведена величина $K_p/\sqrt{K_{\text{об}}}$, определенная в присутствии ФДЭоЛА при разных температурах, в сравнении с известной в

литературе аналогичной величиной без амина. Она может служить критерием влияния амина на K_p и $K_{об}$. Совпадение данных очевидно. Если заключение об отсутствии влияния ФДЭоЛА на K_p и $K_{об}$ верно, следует ожидать, что наличие амина не скажется на суммарной скорости полимеризации и величине $K_p/\sqrt{K_{об}}$ и в том случае, если процесс инициируется фотохимическим разложением ДАК. Так и оказалось на самом деле (табл. 4).

Таблица 1
Скорости инициирования и полимеризации стирола в отсутствие и в присутствии ФДЭоЛА [ДАК]=0,05 моль/л, $t=50^\circ$

[ФДЭоЛА], моль/л	$W_{пм} \cdot 10^5$, моль/л·с	$W_{ин} \cdot 10^4$, моль/л·с
0	5,65	1,42
0,004	5,60	1,48
0,008	5,45	1,45

Таблица 2
Кинетические параметры полимеризации стирола без амина и в присутствии различных аминоспиртов при $t=40^\circ$, [ДАК]=0,05 моль/л

Кинетические параметры	Без амина	ЭДЭоЛА	ДЭЭоЛА	ФДЭоЛА
$W_{ин} \cdot 10^4$, моль/л·с	—	3,7	3,8	3,1
$W_{пм} \cdot 10^5$, моль/л·с	—	2,11	2,19	1,93
$K_p/\sqrt{K_{об}}$, (л/моль·с) ^{1/2}	0,011; 0,014	0,013	0,013	0,012
$E_{пм}$, кДж/моль	89,2	90,0	91,7	90,0
$E_{ин}$, кДж/моль	125,6	126,0	126,4	129,4
$E_p - \frac{1}{2} E_{об}$, кДж/моль	27,2; 23,9	26,8	28,5	25,1

Таблица 3
Температурная зависимость $K_p/\sqrt{K_{об}}$ в отсутствие и в присутствии ФДЭоЛА. [ДАК]=0,05 моль/л

[А], моль/л	0		0,008	
	$K_p/\sqrt{K_{об}}$	$K_p/\sqrt{K_{об}}$	$K_p/\sqrt{K_{об}}$	$K_p/\sqrt{K_{об}}$
t , °C				
40	0,0125	0,0112		
45	0,0146	0,0142		
50	0,0170	0,0171		
55	0,0195	0,0190		

Таблица 4
Влияние ФДЭоЛА на кинетические параметры при фотополимеризации стирола $\lambda=365$ нм, [ДАК]=0,05 моль/л, $t=40^\circ$

[ФДЭоЛА], моль/л	$W_{пм} \cdot 10^4$, моль/л·с	$W_{ин} \cdot 10^4$, моль/л·с	$K_p/\sqrt{K_{об}}$, (л/моль·с) ^{1/2}
0	1,11	2,0	0,009
0,004	0,94	2,0	0,008
0,008	1,05	2,4	0,008

Таким образом, при полимеризации стирола, инициированной термическим и фотохимическим разложением ДАК, присутствующий в реак-

ционной смеси ФДЭоЛА не принимает участия в иницировании, росте и обрыве полимерных цепей.

Кинетическая картина оказывается сложнее, когда в сочетании с ФДЭоЛА вместо ДАК берется ПБ.

Кинетическое исследование системы ПБ—ФДЭоЛА как инициатора полимеризации стирола проведено в разных концентрационных интервалах:

а) при избытке пероксида: $[A] = 0,002-0,01$; $[ПБ] = 0,05$; $[ПБ] = 0,025-0,06$; $[A] = 0,007$ моль/л.

б) при избытке амина: $[A] = 0,0075-0,05$; $[ПБ] = 0,01$; $[ПБ] = 0,025-0,01$; $[A] = 0,05$ моль/л.

В обоих случаях иницирование описывается уравнением второго порядка.

а) В этой серии опытов в уравнении эффективной скорости полимеризации порядок по компонентам инициатора «нормальный», равный 0,5. В табл. 5 приведены скорости иницирования в отсутствие и в присутствии ФДЭоЛА. Значительное ускорение генерации свободных радикалов в присутствии ФДЭоЛА очевидно.

Таблица 5

Роль ФДЭоЛА в стадиях зарождения, роста и обрыва цепей, $[ПБ] = 0,05$ моль/л

$t, ^\circ\text{C}$	$[ФДЭоЛА],$ моль/л	$W_{ин} \cdot 10^7,$ моль/л·с	$\frac{W_{пм(A)}}{W_{пм(0)}}$	$\frac{W_{ин(A)}}{W_{ин(0)}}$	$\frac{W_{пм(A)}}{W_{пм(0)}} \sqrt{\frac{W_{ин(A)}}{W_{ин(0)}}}$
40	0	0,13	—	—	—
	0,02	6,0	4,5	46,1	0,66
	0,005	15,0	6,9	115,4	0,64
	0,007	22,2	8,8	170,8	0,68
	0,010	31,5	10,4	242,3	0,67
50	0,002	—	3,54	20,8	0,78
	0,008	—	6,95	93,3	0,72

Однако, если бы роль амина заключалась только в ускорении иницирования, то следовало бы ожидать, что

$$\frac{W_{пм(A)}}{W_{пм(0)}} = \sqrt{\frac{W_{ин(A)}}{W_{ин(0)}}} \quad (1)$$

Данные табл. 5 говорят, что ФДЭоЛА участвует не только в стадиях иницирования, но и в росте или обрыве цепей, а может, в обоих процессах одновременно.

б) В этой серии опытов наблюдается отклонение от классического уравнения как по амину, так и по пероксиду (рис. 1, 2).

Заслуживает внимания факт, что в области «нормальной» кинетики, т. е. при $[A] < 0,025$ моль/л, величина $K_p/\sqrt{K_{об}}$ с амином и без амина одинакова. Различие имеет место в области «аномалии».

В изложенном экспериментальном материале независимо от концентрационных условий эксперимента наблюдаются отклонения от «идеальной» кинетики: аномально низкий порядок в уравнении скоро-

сти ПМ как по амину, так и по пероксиду и несоблюдение равенства (1). В чем их причина?

Если бы предположение, сделанное в [1, 2, 4], было верным, а именно: изменение реакционной способности макрорадикала происходило в результате его связывания в комплекс с аминоспиртом, следовало бы ожидать влияния амина и на скорость ПМ стирола, инициированной термическим и фотохимическим разложением ДАК. Однако присутствие ФДЭоЛА никак не сказывается на скорости ПМ стирола, если она инициируется радикалами ДАК, генерируемыми его термическим или фоторазложением.

Рис. 1. Зависимость квадрата скорости полимеризации от концентрации амина при $t = 40^\circ$ и $[ПБ] = 0,01$ моль/л.

Рис. 2. Зависимость скорости полимеризации от $[ПБ]^{0,25}$ при $t = 40^\circ$, $[ФДЭоЛА] = 0,05$ моль/л.

Такой результат следовало ожидать, т. к. в [5] однозначно показано, что при ПМ стирола K_p и $K_{об}$ в присутствии алкиламиноспиртов не изменяются, что говорит об их неактивности относительно полистирольных радикалов.

Указанные отклонения, по-видимому, можно объяснить тем, что при высоких скоростях иницирования механизм квадратичного обрыва на макрорадикалах сводится к обрыву, протекающему на первичных радикалах.

Таким образом, полученные результаты находятся в согласии с предшествующими работами. Из настоящей работы следует, что ФДЭоЛА в сочетании с ПБ заметно ускоряет генерацию свободных радикалов. При концентрациях амина, превышающих 0,025 моль/л, радикалы амина участвуют в акте обрыва цепей.

ԱՃՈՒՋՈՎԱՐԱԳԱԹՔՎԻ ԴԻՆԻՏՐԻԼԻ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԵՎ ՖՈՏՈՔԱՅՔԱՑՈՒՄՈՎ
 ՀԱՐՈՒՑՎԱԾ ՍՏԻՐՈՒԻ ՊՈԼԻՄԵՐՄԱՆ ԿԻՆԵՏԻԿԱՆ
 ՅԵՆԻԴԻԷԹԱՆՈՂԱՄԻՆԻ ԱՐԿԱՑՈՒԹՅԱՄԲ

Բ. Մ. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆ

Յույց է տրված, որ ֆենիլդիէթանոլամինի առկայութեանը չի ազդում վանգվածում ստիրոլի պոլիմերման կինետիկական պարամետրերի վրա, երբ պրոցեսը հարուցվում է շերմային և ֆոտոքայքայումից առաջացած ազոիզոկարագաթվի դինիտրիլի ռադիկալներով:

THE INFLUENCE OF PHENYLDIETHANOLAMINE ON THE DECOMPOSITION OF AZO-*bis*-ISOBUTYRONITRILE AND BENZOYL PEROXIDE ON STYRENE POLYMERIZATION

B. M. SOGOMONIAN

It has been established that phenyldiethanolamine-azo-*bis*-isobutyronitrile-benzoylperoxide (I) has no influence upon styrene bulk polymerization kinetics when the process was initiated by thermal and photodecomposition of azo-*bis*-isobutyronitrile (II). The kinetics of styrene polymerisation initiated with system did not obey the ideal polymerization law.

The polymerization rate order for both (I) and (III) is less than 0.5.

The reason of the deviation from the ideal kinetics has been explained assuming that there is a change in a chain termination mechanism. This is due to the reaction of the growing macroradicals with primary ones.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Н. М. Бейлерян, С. Л. Мхитарян, О. А. Чалтыкян, Арм. хим. ж., 25, 568 (1972).
2. Н. М. Бейлерян, С. А. Мхитарян, Арм. хим. ж., 27, 1011 (1974).
3. Б. М. Согомонян, М. М. Аветисян, Уч. зап. ЕГУ, 2, 143 (1980).
4. Б. М. Согомонян, Н. М. Бейлерян, А. Г. Тумагян, Арм. хим. ж., 28, 451 (1975).
5. Б. М. Согомонян, Н. М. Бейлерян, С. А. Дадаян, Арм. хим. ж., 32, 354 (1979).
6. Б. М. Согомонян, Н. М. Бейлерян, С. А. Дадаян, Арм. хим. ж., 32, 695 (1979).
7. Н. М. Бейлерян, Ж. А. Погосян, Уч. зап. ЕГУ, 2, 118 (1974).
8. Н. М. Бейлерян, Ж. А. Погосян, Арм. хим. ж., 28, 83 (1975).
9. Н. М. Бейлерян, О. А. Чалтыкян, А. К. Авакян, Уч. зап. ЕГУ, 3, 72 (1970).
10. С. Н. Bamford, A. D. Jenkins, R. Johnston, Trans. Farad. Soc., 55, 1451 (1959).
11. Th. Meltzer, A. Tobolsky, J. Am. Chem. Soc., 76, 5178 (1954).
12. С. Х. Багдасарьян, Теория радикальной полимеризации, Изд. «Наука», М., 1966, стр. 114.

УДК 669.4.5

КИНЕТИКА ЦЕМЕНТАЦИИ СВИНЦА ЦИНКОМ И АЛЮМИНИЕМ ИЗ ХЛОРИДНЫХ РАСТВОРОВ

М. Л. ЕПИСКОПОСЯН, Н. С. САРКИСЯН, О. Н. ШАХБАЗЯН, С. К. КАРАПЕТЯН
и А. Х. МЕЛИКСЕТЯН

Армянский научно-исследовательский и проектный институт
цветной металлургии, Ереван

Поступило 15 X 1980

Установлено, что вытеснение свинца как цинком, так и алюминием из хлоридных растворов, насыщенных поваренной солью, протекает в диффузионной области. Выявлено влияние температуры на константу скорости реакции (для обеих процессов). Определена зависимость скорости реакции от скорости вращения диска. Вычислены экспериментальные энергии активации реакций цементации и коэффициент диффузии комплексного хлорида свинца в солянокислых растворах, насыщенных поваренной солью.

Рис. 2, табл. 1, библиографические ссылки 8.

При продувке медных штейнов на черновую медь образуется значительное количество тонкодисперсных пылей, которые осаждаются в