REDUCTIONS OF *bis*(ALKOXY)DIMETHYLAMINO AND METHOXY *bis*(DIMETHYLAMINO)METHANES WITH *tetra-n*-BUTYLDIBORANE

G. B. BAGDASSARIAN, K. S. BADALIAN, M. A. SHEYRANIAN
and M. G. INJIKIAN

It has been shown that the reduction of *bis*(alkoxy)dimethylamino and methoxy-*bis*(dimethylamino)methanes with *tetra-n*-butyldiborane takes place at room temperature with a C—O bond break and leads to the formation of dialkyl(alkoxymethyl)amines or *bis*(dimethylamino)-methanes and alkoxy(*di-n*-butyl)boranes.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Г. Б. Багдасарян, К. С. Бадалян, М. Г. Инджикян, Арм. хим. ж., 29, 179 (1976).
2. Г. Б. Багдасарян, К. С. Бадалян, М. Г. Инджикян, Арм. хим. ж., 32, 203 (1979).
3. Б. М. Михайлов, Л. С. Васильев, Изв. АН СССР, сер. хим., 1982, 1756; Б. М. Михайлов, А. А. Ахназарян, Л. С. Васильев, ДАН СССР, 136, 828 (1961).
4. H. Brederick, Chem. Ber., 101, 41 (1968).
5. W. Gerrard, E. F. Meoneu, R. C. Rees, J. Chem. Soc., 1964, 740.
6. Г. Б. Багдасарян, Л. Ш. Айриян, К. С. Бадалян, М. Г. Инджикян, Арм. хим. ж., 33, 69 (1980).

Армянский химический журнал, т. 35, № 6, стр. 383—386 (1982 г.).

УДК 542.91+542.953+543.852.6+547.455+66+.73+.9

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ НЕНАСЫЩЕННЫХ ЛАКТОНОВ

LXXVI. СИНТЕЗ ЗАМЕЩЕННЫХ 3-(2-МЕТИЛ-4-ОКСИ-
МЕТИЛ-1,3-ДИОКСОЛАНИЛ-2)- Δ^3 -БУТЕНОЛИДОВ И
-5,6-ДИГИДРОПИРАНОВ-2

А. А. АВETИСЯН, А. Г. ГАЛСТЯН, Г. С. МЕЛИКЯН и М. Т. ДАНГЯН

Ереванский государственный университет

Поступило 1 VI 1981

Изучено взаимодействие замещенных 3-ацетилбутенолидов и 3-ацетил-5,6-дигидропиранов-2 с этиленгликолем и глицерином при нагревании в бензоле в присутствии каталитических количеств *p*-толуолсульфокислоты в условиях азеотропной отгонки воды. Показано, что при этом образуются 3-(2-метил- и 2-метил-4-оксиметил-1,3-диоксоланил-2)- Δ^3 -бутенолиды и -5,6-дигидропираны, соответственно.

Табл. 2, библиографических ссылок 16.

Известно, что производные 1,3-диоксоланов обладают интересными фармакологическими свойствами. Многие из них проявляют мускариноподобное действие [1—3], уменьшают артериальное давление [4, 5], являются инсектицидами, гербицидами и ингибиторами роста [6, 7], применяются в качестве пластификаторов [8, 9], моющих средств, фотографических эмульсий, покрытий и др. [10—14].

С целью синтеза соединений, содержащих в своей структуре ненасыщенное лактонное кольцо и 1,3-диоксолановый цикл, исследовано взаимодействие замещенных 3-ацетил- Δ^3 -бутенолидов [15] и 3-ацетил-5,6-дигидропиринов-2 [16] с этиленгликолем и глицерином. Реакция проводилась при нагревании в среде бензола в присутствии каталитических количеств *n*-толуолсульфокислоты с одновременным удалением образовавшейся воды.

- I. $R = H$, $R' = CH_3$, $R'' = CH_3$, $R''' = CH_3$;
- II. $R = CH_2OH$, $R' = CH_3$, $R'' = CH_3$, $R''' = CH_3$;
- III. $R = H$, $R' = C_2H_5$, $R'' = C_2H_5$, $R''' = H$;
- IV. $R = CH_2CH_2$, $R' = C_2H_5$, $R'' = C_2H_5$, $R''' = H$.

1,3-Диоксолановые производные получены также из 3-ацетил-4,5-диметил-5,6-дигидропирона и этиленгликоля или глицерина.

где $R = H$, $R = CH_2OH$

В ИК спектрах 1,3-диоксоланилбутенолидов I, III и V обнаружены полосы поглощения лактонного карбонила в ненасыщенном пятичленном и шестичленном лактонных циклах 1760, C=C связи 1640; диоксоланового цикла 1040, 1060, 1095, 1240 cm^{-1} .

Для соединений II, IV и VI наряду с указанными обнаружена также полоса поглощения ассоциированной первичной гидроксильной группы 3200—3500 cm^{-1} .

Полученные соединения находятся на стадии биологического исследования.

Экспериментальная часть

Чистота полученных соединений проверена методами ТСХ и ГЖХ на приборе ЛХМ-72, колонка (2Ж×0,4 см) на хроматоне N-AW 5% SE-301 при 150—250° и расходе гелия 50 мл/мин.

Взаимодействие замещенных 3-ацетил- Δ^3 -бутенолидов с этиленгликолем (глицерином). Смесь 0,04 моля соответствующего 3-ацетил- Δ^3 -бутенолида, 0,06 моля этиленгликоля (глицерина), 0,1 г *n*-толуолсульфокислоты и 30 мл абс. бензола нагревают с водоотнимателем до прекращения выделения воды. После охлаждения промывают 5% раствором бикарбоната натрия до слабощелочной реакции, водой и высушивают над сульфатом натрия. После удаления растворителя остаток перегон-

няют в вакууме или перекристаллизовывают. Физико-химические данные полученных замещенных 3-(2-метил-1,3-диоксоланил-2)- Δ^3 -бутенолидов и 3-(2-метил-4-оксиметил-1,3-диоксоланил-2)- Δ^3 -бутенолидов приведены в табл. 1.

Таблица 1

3-(2-Метил-1,3-диоксоланил-2)- и 3-(2-метил-4-оксиметил-1,3-диоксоланил-2)- Δ^3 -бутенолиды

Соединение	Выход, %	Т. кип., °C/1 мм. (т. пл., °C)	n_D^{20}	Найдено, %		Вычислено, %	
				С	Н	С	Н
I	71	65—66 (гексан)	—	62,50	7,30	62,26	7,55
II	56	132—134	1,4840	59,85	6,96	59,50	7,43
III	63	155—159	1,4780	66,53	8,80	66,14	8,66
IV	51	150—163	1,4780	63,70	8,55	63,39	8,45

Взаимодействие 3-ацетил-4,5-диметил-5,6-дигидропирона-2 с этиленгликолем (глицерином). Смесь 0,04 моля 3-ацетил-4,5-диметил-5,6-дигидропирона-2, 0,06 моля этиленгликоля (глицерина), 0,1 г *p*-толуолсульфокислоты и 30 мл абс. бензола нагревают с водоотнимателем до прекращения выделения воды. После вышеописанной обработки продукты реакции перегоняют в вакууме. Физико-химические данные полученных 3-(2-метил-1,3-диоксоланил-2)-5,6-дигидропирона-2 и 3-(2-метил-4-оксиметил-1,3-диоксоланил-2)-5,6-дигидропирона-2 приведены в табл. 2.

Таблица 2

3-(2-Метил-1,3-диоксоланил-2)- и 3-(2-метил-4-оксиметил-1,3-диоксоланил-2)-5,6-дигидропироны-2

Соединение	R	Выход, %	Т. кип., °C/1 мм.	n_D^{20}	Найдено, %		Вычислено, %	
					С	Н	С	Н
V	H	63	86—88	1,4960	62,09	7,2	62,26	7,55
VI	CH ₂ OH	49	73—75	1,4980	59,80	7,5	59,50	7,43

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԶԶԱԳԵՑԱՆ ԼԱԿՏՈՆՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ

LXXVI. ՏԵՂԱԿԱՎԱՆ Տ-(2-ՄԵԹԻԼ-4-ՕՔՍԻՄԵԹԻԼ-1,3-ԴԻՕԷ-ՍՈՒՆԻԼ-2)- Δ^3 -ԲՈՒՏԵՆՈԼԻԴՆԵՐԻ ԵՎ 5,6-ԴԻԶԻԴՐՈՊԻՐՈՆ-2-ՆԵՐԻ ՍԻՆԹԵԶԸ

Ա. Ա. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ, Ա. Վ. ԳԱՍՏՅԱՆ, Գ. Ս. ՄԵԼԻՔՅԱՆ Ե Մ. Յ. ԴԱՆՎՅԱՆ

Ուսումնասիրված է տեղակալված 3-ացետիլըրոտենոլիդների և 3-ացետիլ-5,6-դիհիդրոպիրոն-2-ի փոխազդեցությունը էթիլենգլիկոլի և գլիցերինի հետ, ուսկցիոն խառնուրդը բենզոլի միջավայրում կատալիտիկ քանակներով և-տոլուոլսուլֆոթթվի առկայությամբ ջրի ազիոտրոպ հեռացման պայմաննե-

ըրում: Ցույց է տրված, որ ստացվում են համապատասխանաբար 3-(2-մեթիլ-
և 2-մեթիլ-4-օքսիմեթիլ-1,3-դիօքսոլանիլ-2)- Δ^3 -բուտենոլիդներ և 5,6-դիհիդր-
բուպիրոններ:

INVESTIGATIONS IN THE FIELD OF UNSATURATED LACTONES

LXXVI. SYNTHESIS OF SUBSTITUTED 3-(2-METHYL -4-OXYMETHYL-1,3-DIOXOLANYL-2)- Δ^3 -BUTENOLIDES AND 5,6-DIHYDROPYRONES-2

A. A. AVETISIAN, A. G. GALSTIAN, G. S. MELIKIAN and M. T. DANGIAN

The interaction of substituted 3-acetylbutenolides and 3-acetyl-5,6-dihydropyrones-2 with ethylene glycol and glycerol in benzene with catalytic amounts of *p*-toluenesulphonic acid under conditions of azeotropic water distillation has been studied. It has been shown that the corresponding 3(2-methyl and 2-methyl-4-oxymethyl-1,3-dioxolanyl-2)- Δ^3 -butenolides and 5,6-dihydropyrones are obtained.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. E. A. Fournan, J. P. Fournan, Bull. soc. chim. biol., 26, 516 (1941).
2. E. A. Fournan, J. P. Fournan, Ann. pharm. France, 3, 114 (1954).
3. J. P. Fournan, J. P. Chantalou, Bull. Soc. chim. Fr., 1945, 845.
4. A. C. Butter, J. Pharmacol., 81, 72 (1944).
5. Гетероциклические соединения, под ред. Р. Эльдерфильда, ИЛ, М., т. 5, 1961, стр. 24.
6. Англ. пат. № 1017797 (1966), [РЖХ, 711542 (1967)].
7. А. Н. Мирскова, Л. С. Атавиц, Т. С. Проскурич, ХГС, 1972, 601.
8. Ам. пат. № 524518 (1972), Открытия, изобретения, промыш. образцы, товарные знаки, вып. 28, 181 (1976).
9. Авт. свид. СССР № 506605 (1977), [РЖХ, 18т142, (1977)].
10. Пат. США, 2295265; [С.А, 40, 3010 (1960)].
11. Пат. США, 2415638; [С.А, 41, 3321 (1947)].
12. Пат. США, 2282640; [С.А, 40, 776 (1946)].
13. Пат. США, 2436138; [С.А, 42, 2883 (1948)].
14. Пат. США, 2394862; [С.А, 40, 2696 (1946)].
15. P. C. Tanasescu, A. C. Tanasescu, С. А., 20, 749 (1926).
16. P. C. Tanasescu, D. R. Macooski, Bull. Soc. chim. France, (4) 51, 1556 (1932).

Армянский химический журнал, т. 35, № 6, стр. 386—391 (1982 г.).

УДК 547.294.314.07(088.8)

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КЕТОЛАКТОНОВ И КЕТОКИСЛОТ

III. ПОВЕДЕНИЕ 2-АЦЕТИЛ-5-АЛКОКСИ-4-ПЕНТАНОЛИДОВ В РЕАКЦИИ МИХАЭЛЯ

В. С. АРУТЮНЯН, Т. В. КОЧИКЯН и М. Г. ЗАЛИНЯН

Ереванский государственный университет

Поступило 19 X 1981

Разработан удобный способ получения 2-[β -карбаллоксиптил (цианэтил)]-5-алкокси-4-пентанолидов конденсацией 2-ацетил-5-алкокси-4-пентанолидов с метил-, этил-,