гичная картина наблюдается при переходе к другим электрофилам— бромистому метилу и аллилу.

Смесь изомерных диеновых солей, образовавшихся под действием бромистоводородной кислоты, нам удалось разделить на колонке с использованием силикагеля марки Л 100/160. После разделения был выделен и идентифицирован встречным синтезом бромистый трибутил-2-метил-1,3-бутадиенилфосфоний [2]. Реакцию можно представить протекающей по схеме, включающей в себя атаку фосфина как по первому, так и по третьему углеродному атому системы.

Смесь 10,1 г (0,05 моля) трибутилфосфина и 3,3 г (0,05 моля) изопропенилацетилену нагревали 24 ч при 100°. После удаления непрореагировавших трибутилфосфина и изопропенилацетилену осталось 5,9 г (0,022 моля) 1 : 1 аддукта. ИК спектр, ν , cm^{-1} : 1610, 1645 (сопр. диен) и 1965 (аллен).

К 5,9 г (0,022 моля) полученного аддукта в 10 мл эфира добавили 7,4 мл 40% водного раствора бромистоводородной кислоты. Эфирный слой отделили, остаток экстрагировали хлороформом. Хлороформный слой высушили и перегнали. После удаления хлороформа остаток тщательно промыли эфиром и высушили под вакуумом. Получили 3,3 г (42,9%) смеси изомерных фосфониевых солей. Найдено %: $\overline{B}r$ 23,38. $C_{17}H_{34}PB\overline{r}$. Вычислено %: $\overline{B}r$ 22,92. После разделения на колонке в системе вода: уксусная кислота: гептан: изобутиловый спирт (1 : 2 : 1 : 5) выделен бромистый трибутил-2-метил-1,3-бутадиенилфосфоний. ИК спектр, ν , cm^{-1} : 1620, 1650 (диен). R_f 0,47 [3].

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. А. М. Торгомян, М. Ж. Овакимян, М. Г. Инджикян, Арм. хим. ж., 32, 288 (1979).
2. Р. К. Лулукян, М. Ж. Овакимян, М. Г. Инджикян, Арм. хим. ж., 34, 995 (1981).

Г. Ц. ГАСПАРЯН,
М. Ж. ОВАКИМЯН,
М. Г. ИНДЖИКЯН

Институт органической химии
АН Армянской ССР, Ереван

Поступило 22 XI 1982

РЕФЕРАТЫ СТАТЕЙ, ДЕПОНИРОВАННЫХ В ВИНТИ

УДК 547.49.8+661.18

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ ЦИАНУРОВОЙ КИСЛОТЫ С ФОРМАЛЬДЕГИДОМ И АМИНАМИ

М. Л. Ерицян, С. М. Габриелян и Н. П. Ерицян

Государственный научно-исследовательский и проектный институт полимерных клеев им. Э. Л. Тер-Газаряна, Кировакан

Поступило 7 IV 1980

Для изучения химизма реакции между циануровой кислотой, формальдегидом и аминами исследовано взаимодействие как *трис*-метилольной производной изоциануровой кислоты с моно- и диэтанолaminaми, так и метилольной производной моно- и диэтанолamina с циануровой кислотой.

В обоих случаях получена смесь I—IV.

Механизм образования циануровой кислоты можно представить схемой: