Л И Т Е Р А Т У Р А

1. А. А. Геворкян, П. И. Казарян, Н. М. Хизанцян, Арм. хим. ж., 34, 435 (1981).
2. H. Suzuki, H. Jashima, T. Hirose, M. Takahashi, J. Morn-Oka, T. Ikama, Tetrah. Lett., 21, 4927 (1980).
3. А. А. Геворкян, А. С. Аракелян, Арм. хим. ж., 29, 1033 (1976).
4. А. А. Геворкян, А. С. Аракелян, П. И. Казарян, ХГС, 1982. 1611.

Армянский химический журнал, т. 37, № 5, стр. 309—315 (1984 г.)

УДК 547.31+547.322

РЕАКЦИИ НЕПРЕДЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

СЛ. О РЕГИОХИМИИ ХЛОРАРИЛИРОВАНИЯ ТРЕТИЧНЫХ ВИНИЛЭТИНИЛОВЫХ КАРБИНОЛОВ И ИХ ЭФИРОВ

Л. М. ГЕВОРГЯН, Л. Г. ГРИГОРЯН, В. О. БАБАЯН, А. Б. САРГСЯН,
Г. А. ПАНОСЯН и Ш. О. БАДАНЯН

Армянский педагогический институт им. Х. Абовяна, Ереван

Институт органической химии АН Армянский ССР, Ереван

Исследована региохимия хлорариллирования эниновых спиртов и их эфиров. Установлено, что региоселективность процесса зависит от рН среды.

Табл. 1, библи. ссылок 2.

Как уже отмечалось ранее, третичные и вторичные винилацетиленовые карбинолы в присутствии хлористой меди реагируют с фенилдиазоний хлоридом с образованием смеси хлорацетиленовых и хлоралленовых карбинолов [1, 2].

В настоящей статье рассмотрены реакции пара-замещенных арилдиазоний хлоридов с винилацетиленовыми третичными карбинолами I в широком интервале рН среды (рН 1—5). Проведенные исследования показали, что в кислых средах реакция в основном протекает по двойной связи эниновой системы и в смеси преобладает изомер II.

IIa, IIIa. R=CH₃, R'=C₂H₅, R''=H; IIб, IIIб. R=R'=пентаметилен, R''=H;

IIв, IIIв. R=R'=R''=CH₃; IIг, IIIг. R=R''=CH₃, R'=C₂H₅;

IIд, IIIд. R=R'=CH₃, R''=OCH₃; IIе, IIIе. R=CH₃, R'=C₂H₅, R''=OCH₃.

Состав полученных смесей подтвержден как данными ИК и ПМР спектров, так и некоторыми химическими превращениями. В ИК спектрах смесей имеются валентные колебания в области 2255 см^{-1} , характерные для тройной связи изомера II. Частота в области $3350\text{—}3340\text{ см}^{-1}$ характеризует гидроксильную группу, частота в области 1950 см^{-1} — алленовую группу в изомере III. Параметры спектров ПМР, приведенные в таблице, также подтверждают строения II и III.

Следует отметить, что смесь изомеров II и III (соотношение 4 : 1) при нагревании в присутствии хлористой меди превращается в новую смесь, где преобладающим является галогеналленовый карбинол (соотношение II : III = 1 : 3). В ПМР спектре смеси наблюдается триплетный сигнал протона при $\delta = 5,72\text{ м. д.}$, характерный для водорода при sp^2 гибридизированном углероде в соединениях III.

Далее было показано, что из смеси изомеров IIв и IIIв (соотношение 4 : 1) под действием серной кислоты легко отщепляется вода с образованием смеси IVв и Vв (соотношение 2,5 : 1).

При нагревании же смеси в присутствии солей одновалентной меди IV подвергается анионотропной перегруппировке с образованием еналлонового изомера V.

В спектре ПМР смеси IV и V имеются сигналы при $\delta = 1,82\text{ м. д.}$, характерные для протонов метильной группы при двойной связи $[\text{C}(\text{CH}_3)=]$, и сигналы при $\delta = 5,25\text{ м. д.}$, характеризующие терминальную винильную группу ($\text{C}=\text{CH}_2$). Сигналы протонов $=\text{CHCH}_2$ группировки V в спектрах ПМР появляются при $\delta = 3,40$ и $5,74\text{ м. д.}$

В продолжение исследований нами изучено хлортолуидирование и хлоранидирование эфиров диметилвинилэтинилкарбинолов в разных средах. Выяснено, что при проведении реакций в кислых средах количество ацетиленового изомера VII в смеси преобладает (соотношение VII : VIII = 5,7 : 1).

VIIa, VIIIa. R = CH₃; VIIб, VIIIб. R = C₂H₅;

VIIв, VIIIв. R = C₃H₇; VIIг, VIIIг. R = C₄H₉.

При хлорфенилировании эфиров в щелочной среде количество VII в смеси понижается, и соотношение VII : VIII уже составляет 1,7 : 1. Составы смесей полученных хлорацетиленовых и хлоралленовых эфиров VII и VIII подтверждены данными ИК и ПМР спектров. В ИК спектрах смеси VII и VIII ацетиленовую группу характеризуют валентные колебания в области 2250 см⁻¹, а алленовую группу—1950 и 1965 см⁻¹. Параметры спектров ПМР приведены в таблице. Следует отметить, что в спектрах ПМР смесей VII и VIII, полученных в щелочной среде, наблюдаются сигналы при δ = 3,18 и 3,20 м. д., характеризующие протон гидроксильной группы, количество которого составляет 2—2,5%. Гидроксильная группа появляется, по-видимому, вследствие гидролиза эфирной группировки.

Экспериментальная часть

ИК спектры снимались на спектрометрах ИК-10 и ИК-20, ПМР спектры—на приборе «Perkin-Elmer-12B» (60 МГц). В качестве внутреннего стандарта используется ТМС. ГЖХ проводилось на приборе ЛХМ-8М, модель 5 с катарометром. V = 60 мл/мин (гелий), носитель—5% SE-30 на хроматоне N-AW 0,160—0,200 мм, обмытый кислотой, l = 1 м, d = 3 мм, температура 200°.

Хлорфенилирование метилэтилвинилэтинилкарбинола Ia. К смеси 200 мл ацетона, 30 мл воды, 1 г оксида кальция, 13,5 г хлористой меди, 14,8 г (0,12 моля) Ia при перемешивании постепенно прибавлен охлажденный раствор (4—5°) соли фенилдиазония, приготовленный из 35 г анилина, 85 мл конц. соляной кислоты, 35 г нитрита натрия, 75 мл воды и 50 г льда (рН среды 1—2). После прибавления 30—40 г раствора соли наблюдалось интенсивное выделение азота в осуде Тищенко. Перемешивание продолжено до полного прекращения выделения азота. Полученный продукт экстрагирован эфиром, промыт раствором щелочи, водой и высушен над сульфатом магния. Перегонкой получено 9,9 г (42%) смеси IIa и IIIa в соотношении 5,7 : 1 по ГЖХ. Т. пер. 135—136°/1 мм. Найдено %: Cl 14,95. C₁₄H₁₇OCl. Вычислено %: Cl 15,01. ИК спектр, ν, см⁻¹: 1955, 2240, 3350—3340.

Хлорфенилирование циклогексилвинилэтилкарбинола 1б. Аналогично предыдущему опыту из 18 г (0,12 моля) 1б и 9,3 г (0,1 моля) анилина (рН среды 2,5—3) получено 13,18 г (45%) смеси IIб и IIIб в соотношении 2,5 : 1 по ГЖХ. Т. пер. 158—159°/1 мм. Найдено %: Cl 12,00. C₁₆H₁₉OCl. Вычислено %: Cl 13,50. ИК спектр, ν , см⁻¹: 1940, 2260, 3350.

Хлортолуидирование диметилвинилэтилкарбинола 1в. а) Аналогично предыдущему из 13,32 г (0,12 моля) 1в и 10,7 г (0,1 моля) *p*-толуидина (рН среды 3,5—4) получено 14,32 г (50,1%) смеси IIв и IIIв в соотношении 2,5 : 1 по ГЖХ. Т. пер. 133—134°/1 мм. Найдено %: Cl 15,93. C₁₄H₁₇OCl. Вычислено %: Cl 15,01. ИК спектр, ν , см⁻¹: 1950, 2250, 3330.

б) Аналогично предыдущему из 13,32 г (0,12 моля) 1в и 10,7 г (0,1 моля) *p*-толуидина (рН среды 1—2) получено 15,7 г (55%) смеси IIв и IIIв в соотношении 4 : 1 по ГЖХ. Т. пер. 133—134°/1 мм.

Хлортолуидирование метилэтилвинилэтилкарбинола 1а. Аналогично из 14,8 г (0,12 моля) 1а и 10,7 г (0,1 моля) *p*-толуидина (рН среды 2,5—3) получено 16,5 г (55%) смеси IIг и IIIг в соотношении 3 : 1 по ГЖХ. Т. пер. 138°/1 мм. Найдено %: Cl 14,75. C₁₅H₁₉OCl. Вычислено %: Cl 14,16. ИК спектр, ν , см⁻¹: 1950, 2255, 3355—3350.

Хлоранизидирование диметилвинилэтилкарбинола 1в. Аналогично из 13,32 г (0,12 моля) 1в и 12,1 г (0,1 моля) *p*-анизида (рН среды 1—2) получено 19,5 г (55%) смеси IIд и IIIд в соотношении 4 : 1 по ГЖХ. Т. пер. 150—151°/1 мм. Найдено %: Cl 14,56. C₁₄H₁₇O₂Cl. Вычислено %: Cl 14,59. ИК спектр, ν , см⁻¹: 1955, 2250, 3350—3340.

Хлоранизидирование метилэтилвинилэтилкарбинола 1а. Аналогично предыдущему из 14,8 г (0,12 моля) 1а и 12,1 г (0,1 моля) *p*-анизида (рН среды 4,5—5) получено 18 г (56,5%) смеси IIе и IIIе в соотношении 1,5 : 1 по ГЖХ. Т. пер. 156—157°/1 мм. Найдено %: Cl 13,81. C₁₅H₁₉O₂Cl. Вычислено %: Cl 13,60. ИК спектр, ν , см⁻¹: 1950, 2275, 3360—3345.

Хлоранизидирование метилового эфира диметилвинилэтилкарбинола VIа. Аналогично предыдущему из 14,8 г (0,12 моля) VIа и 12,1 г (0,1 моля) *p*-анизида (рН среды 3—3,5) получено 16,41 г (51,4%) смеси VIIа и VIIIа в соотношении 2,5 : 1 по ГЖХ. Т. пер. 133—134°/1 мм. Найдено %: Cl 12,90. C₁₅H₁₉O₂Cl. Вычислено %: Cl 13,32. ИК спектр, ν , см⁻¹: 1970, 2270, 3350—3340.

Хлоранизидирование этилового эфира диметилвинилэтилкарбинола VIб. а) Аналогично предыдущему из 15,12 г (0,12 моля) VIб и 12,1 г (0,1 моля) *p*-анизида (рН среды 1—2) получено 21,4 г (51,2%) смеси VIIб и VIIIб в соотношении 4 : 1. Т. пер. 141—142°/1 мм. Найдено %: Cl 12,87. C₁₅H₂₁O₂Cl. Вычислено %: Cl 12,65. ИК спектр, ν , см⁻¹: 1960, 2250, 3385—3400.

б) Аналогично при рН среды 7 получено 19,6 г (71%) смеси изомеров VIIб и VIIIб в соотношении 2,5 : 1. Т. пер. 144°/1 мм. Найдено %: Cl 15,01. C₁₅H₂₁OCl. Вычислено %: Cl 14,58. ИК спектр, ν , см⁻¹: 1960, 2255.

в) Аналогично при рН среды 8—9 получено 17,9 г (65%) смеси VIIб и VIIIб в соотношении 1,5 : 1. Т. пер. 145—146°/1 мм. Найдено %: Cl 15,13. C₁₅H₂₁OCl. Вычислено %: Cl 14,58. ИК спектр, ν , см⁻¹: 1950, 2250.

Хлоранизидирование пропилового эфира диметилвинилэтинилкарбинола VIв. Аналогично из 18,2 г (0,12 моля) VIв и 12,1 г (0,1 моля) *n*-анизидина (рН среды 2,5—3) получено 26,0 г (49%) смеси VIIв и VIIIв в соотношении 3 : 1 по ГЖХ. Т. пер. 146°/1 мм. Найдено %: Cl 12,01. C₁₇H₂₃O₂Cl. Вычислено %: Cl 12,50. ИК спектр, ν , см⁻¹: 1975, 2265, 3350—3390.

Хлоранизидирование бутилового эфира диметилвинилэтинилкарбинола VIг. Аналогично из 19,68 г (0,12 моля) VIг и 12,1 г (0,1 моля) *n*-анизидина (рН среды 1—2) получено 27,13 г (45%) смеси VIIг и VIIIг в соотношении 5,7 : 1 по ГЖХ. Т. пер. 150°/1 мм. Найдено %: Cl 11,75. C₁₈H₂₅O₂Cl. Вычислено %: Cl 11,50. ИК спектр, ν , см⁻¹: 1955, 2265, 3440.

Изомеризация смеси 1-п-толуидил-2-хлор-5-окси-5-метил-3-гексина (IIв) и 1-п-толуидил-4-хлор-5-метил-2,3-гексадиена (IIIв). К смеси 1,41 г хлористого аммония, 1,25 г монохлорида меди, 0,80 г металлической меди, 2 мл конц. соляной кислоты по каплям добавлено 7,9 г (0,03 моля) смеси IIв и IIIв в соотношении 4 : 1. Реакционная смесь нагревалась при 90—95° 10 ч, экстрагировалась эфиром, промывалась водой и высушивалась над сульфатом магния. Перегонкой получено 4,4 г (62%) смеси IIг и IIIг в соотношении 1 : 3. Т. пер. 131°/1 мм. Найдено %: Cl 15,70. C₁₄H₁₇OCl. Вычислено %: Cl 15,01. Спектр ПМР, δ , м. д.: 1,27 с [6H, (CH₃)₂], 2,28 с (3H, PhCH₃), 3,16 ш (1H, OH), 3,34 д (2H, =CHCH₂), 5,70 т (1H, =CHCH₂), 6,80 и 7,06 (4H, C₆H₄). ИК спектр, ν , см⁻¹: 1955, 3395.

Изомеризация смеси 1-п-анизидил-2-хлор-5-окси-5-метил-3-гексина (IIд) и 1-п-анизидил-4-хлор-5-окси-2,3-гексадиена (IIIд). Аналогично предыдущему опыту 7,9 г (0,03 моля) смеси IIд и IIIд в соотношении 4 : 1 подвергли изомеризации. После перегонки получено 5 г (71%) смеси IIд и IIIд в соотношении 1 : 2,5. Т. пер. 150—151°/1 мм. Найдено %: Cl 14,01. C₁₃H₁₉O₂Cl. Вычислено %: Cl 13,60. Спектр ПМР, δ , м. д.: 0,91 т (3H, CH₃CH₂), 1,35 с (3H, CH₃), 1,47 к (2H, CH₂CH₂), 2,80 ш (1H, OH), 3,26 д (2H, =CHCH₂), 3,69 с (3H, OCH₃), 5,67 т (1H, =CHCH₂), 6,70 и 7,01 (4H, C₆H₄). ИК спектр, ν , см⁻¹: 1950, 3420.

Дегидратация смеси IIв и IIIв. а) В условиях перемешивания к 40 мл 50% серной кислоты прибавлено по каплям 9,4 г (0,04 моля) смеси IIв и IIIв в соотношении 4 : 1. Смесь нагревалась при 65—70° 6 ч, экстрагировалась эфиром, высушивалась над сульфатом магния. Перегонкой получено 3,6 г (60%) смеси IVв и Vв в соотношении 2,5 : 1. Т. пер. 110—111°/1 мм. Найдено %: Cl 16,01. C₁₄H₁₅Cl. Вычислено %: Cl 16,24. ПМР спектр, δ , м. д.: 1,82 т (3H, =CCH₃), 2,29 с (3H, PhCH₃), 3,12 д (2H, CHCH₂), 4,66 т (1H, CH), 5,25 м (2H, =CH₂), 6,82 и 7,10 (4H, C₆H₄). ИК спектр, ν , см⁻¹: 1620, 2235.

б) К 9,4 г (0,04 моля) смеси IIв и IIIв в соотношении 1 : 3 прибавлено 40 г 50% серной кислоты. Смесь нагревалась при 65—70° 6 ч, экстрагировалась эфиром, высушивалась над сульфатом магния. Перегонкой получено 5,17 г (58%) смеси IVв и Vв в соотношении 1 : 2. Т. пер. 117—118°/1 мм.

Таблица

Параметры спектров ПМР в CCl_4

Изомер	R (CH_3)	R' (CH_2CH_3)	R'' ($\text{CH}_2\text{---}$ $\text{CH}_2\text{O---}$)	OH	CHCl	CH_3Ph
IIa	1,37	1,50	—	3,18	4,60	3,12	7,12	—	—
IIIa	1,37	1,50	—	3,16	5,75	3,37	7,08	—	—
IIб	1,1	1,0	—	3,20	4,68	3,17	7,27	—	—
IIIб	1,1	2,0	—	3,20	5,70	3,41	7,27	—	—
IIв	1,40	1,41	2,28	3,16	4,58	3,09	7,10	—	—
IIIв	1,27	1,27	2,28	3,16	5,70	3,34	7,06	—	—
IIг	1,35	0,90	2,29	2,55	4,57	3,08	7,08	—	—
IIIг	1,35	0,80	2,29	2,55	5,71	3,33	7,03	—	—
IIд	1,35	0,90	3,69	2,60	5,74	3,38	7,08	—	—
IIIд	1,35	0,89	3,70	2,58	5,72	3,33	7,05	—	—
IIе	1,35	0,91	3,67	2,80	4,55	3,06	6,75	—	—
IIIе	1,35	0,90	3,69	2,80	5,67	3,29	7,07 "	—	—
							6,70		
							7,01 "		
VIIa	1,33	3,17	—	—	4,60	3,08	7,12	2,28	3,68
VIIIa	1,33	3,17	—	—	5,66	3,30	7,09	2,28	3,67
VIIб	1,34	1,10	—	—	4,59	3,09	7,14	2,29	3,72
VIIIб	1,34	3,44 (CH_3)	—	—	5,79	3,32	7,10	2,29	3,72

Химические сдвиги приведены в м. д. относительно внутреннего ТМС.

Изомеризация смеси 1-п-толуидил-2-хлор-5-метил-5-гексен-3-ина (IVв) и 1-п-толуидил-4-хлор-5-метил-2,3,5-гексатриена (Vв). 7 г (0,03 моля) смеси IVв и Vв в соотношении 3 : 1 прибавлено к смеси 0,45 г хлористого аммония, 0,65 г хлористой меди, 2 мл конц. соляной кислоты и 0,25 металлической меди. Смесь нагревалась при 90—95° 10 ч, экстрагировалась эфиром и высушивалась над сульфатом магния. Перегонкой получено 3,5 г (50%) смеси IVв и Vв в соотношении 1 : 4. Т. пер. 117—118°/1 мм. Найдено %: Cl 16,77. C₁₄H₁₅Cl. Вычислено %: Cl 16,24. Спектр ПМР. δ , м. д.: 1,75 т (3H, CH₃), 2,29 с (3H, PhCH₃), 3,42 д (2H, =CH₂), 5,15 м (2H, =CHCH₂), 5,74 т (1H, =CHCH₂), 6,75 и 7,08 (4H, C₆H₄). ИК спектр, ν , см⁻¹: 885, 1950 и 1960.

ՉԶԱԳԵՑԱՄ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐ

CL. ԵՐՐՈՐԴԱՅԻՆ ՎԻՆԻԼՔԵԻՆԻԿԱՐԲԻՆՈԼՆԵՐԻ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԵԹԵՐՆԵՐԻ ՀԱԼՈԳԵՆԱՐԻԼԱՑՄԱՆ ՌԵԳԻՈՔԵՄԻՍՏԻԱՅԻ ՄԱՍԻՆ

Լ. Մ. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ, Լ. Գ. ԴՐԻԳՈՐՅԱՆ, Վ. Ն. ԲԱԲԱՅԱՆ, Ա. Բ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ,
Գ. Ա. ՓԱՆՈՍՅԱՆ և Շ. Ն. ԲԱԴԱՆՅԱՆ

Հետազոտված է ենինային սպիրտների և նրանց եթերների հալոգենարիլացման ռեգիոքեմիան: Պարզված է, որ պրոցեսի ռեգիոսելեկցիան հիմնականում պայմանավորված է միջավայրի pH-ով:

REACTIONS OF UNSATURATED COMPOUNDS

CL. THE REGIOCHEMISTRY OF THE HALOGENOARYLATION OF TERTIARY VINYLACETYLENIC CARBINOLS AND THEIR ETHERS

L. M. GUEVORKIAN, L. G. GRIGORIAN, V. O. BABAYAN, A. B. SARGSIAN,
G. A. PANOSIAN and Sh. O. BADANIAN

The regiochemistry of the halogenoarylation of enynic carbinols and their ethers has been investigated. It has been shown that the regioselectivity of the process is mainly conditioned by the pH value of the medium.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Լ. Գ. Գրիգորյան, Լ. Մ. Գեւորգյան, Վ. Օ. Բաբայան, Ա. Բ. Տարգսյան, Գ. Ա. Փանոսյան, Շ. Օ. Բադանյան, *Արմ. քիմ. թ.*, 35, 247 (1982).
2. Լ. Մ. Գեւորգյան, Լ. Գ. Գրիգորյան, Վ. Օ. Բաբայան, Ա. Բ. Տարգսյան, Գ. Ա. Փանոսյան, Շ. Օ. Բադանյան, *Արմ. քիմ. թ.*, 35, 590 (1982).