тры ЭПР измерены на спектрометре «Varian E-4», ИК спектры—на приборе UR-20 в виде пленок, осажденных из свежеприготовленных растворов полимера в хлороформе. Электронные спектры разбавленных в диоксане и метаноле растворов осадков записаны на спектрофотометре «Specord UV-Vis» (1-сантиметровые кварцевые кюветы).

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. S. Nagakura, J. Am. Chem. Soc., 80, 520 (1958).
2. K. Toyoda, W. B. Person, J. Am. Chem. Soc., 88, 1629 (1966).
3. P. Boule, J. Am. Chem. Soc., 90, 517 (1968).
4. A. Funasatu, K. Toyoda, Bull. Chem. Soc. Japan, 43, 279 (1970).
5. H. Handel, P. Labbe, L. G. Raymond, J. L. Pierre, J. Chem. Phys. et phys. chim. biol., 73, 421 (1981).
6. Ш. А. Маркарян, ЖОрХ, 18, 252 (1982); Арм. хим. ж., 35, 281 (1982).
7. G. Optiz, H. Hildenberger, Lieb. Ann., 649, 26 (1961).
8. P. W. Hickmott, B. J. Hopkins, C. T. Yoxall, J. Chem. Soc., 1971B, 205.
9. Т. Ф. Ахунов, Ф. А. Фаткуллина, Р. А. Караханов, Д. Л. Рахманкулов, ЖОХ, 53, 717 (1983).
- 10 Ш. А. Маркарян, ЖОрХ, 19, 1553 (1983); Арм. хим. ж., 37, 51 (1984).
10. G. Bellucci, G. Berti, R. Bianchini, L. Orsini, Tetrah. Lett., 1982, 3635.

Армянский химический журнал, т. 38, № 9, стр. 599—600 (1985 г.)

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

УДК 547.233.3

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 1-ФЕНИЛ-2-АЗА-1,3-БУТАДИЕНА СО СПИРТАМИ

Известно, что 2-аза-1,3-диены вступают в реакцию Дильса-Альдера в качестве диеновых фрагментов [1, 2]. Их взаимодействие с нуклеофилами почти не изучено.

Нами установлено, что 1-фенил-2-аза-1,3-бутадиен [1] реагирует со спиртами при кипячении с образованием продуктов присоединения по С=С связи—1-фенил-3-алкокси-2-аза-1-бутенов [11]. Имивная двойная связь не принимает участия в реакции.

а) R=CH₃, б) R=C₂H₅

Строение полученных соединений установлено с помощью данных ИК и ПМР спектров.

4 г (0,031 моля) I нагревают с 4,8 г (0,15 моля) метилового спирта при кипении. Спирт отгоняют, остаток перегоняют в вакууме. Получают 3,2 г (63%) 1-фенил-3-метокси-2-аза-1-бутена (IIa), т. кип. 74°/2 мм, n_D^{20} 1,5286. Найдено %: С 73,18; Н 8,02; N 8,95. C₁₀H₁₃NO. Вычис.

лено %: С 73,61; Н 7,97; N 8,58. ИК спектр, ν , см^{-1} : 699, 765, 1499, 1586, 1606 (бенз. кольцо), 1655 (C=N), 1120 (CO). ПМР спектр (в CCl_4), δ , м. д.: 1,25 д (3Н, CHCH_3), 3,15 с (3Н, OCH_3), 4,56 квд (1Н, CCH), 7,25—7,85 м (5Н, C_6H_5), 8,25 с (1Н, N, N=CH).

Аналогично получен 1-фенил-3-этокси-2-аза-1-бутен (IIб). Выход 50%, т. кип. $84^\circ/2 \text{ мм. рт. ст.}$ p_D^{20} 1,5299. Найдено %: С 74,38; Н 8,62; N 7,76. $\text{C}_{11}\text{H}_{15}\text{NO}$. Вычислено %: С 74,57; Н 8,47; N 7,90. ИК спектр, см^{-1} : 699, 765, 1499, 1586, 1606 (бенз. кольцо), 1655 (C=N), 1120 (CO). ПМР спектр (в CCl_4), δ , м. д.: 1,18 т (3Н, CH_2CH_3), 1,40 д (3Н, CHCH_3), 3,40 кв (2Н, OCH_2CH_3), 4,72 квд (1Н, CCH), 7,25—7,90 м (5Н, C_6H_5) 8,27 с (1Н, N=CH).

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. J. S. Cheng, F. W. Fowler, A. T. Lupo, J. Am. Chem. Soc., 103, 2090 (1981).
2. Г. Я. Кондратьева, Ю. С. Дольская, ЖОрХ, в, 2200 (1970).

Л. Л. НИКОГОСЯН,
К. А. НЕРСЕСЯН,
Т. Я. САТИНА,
Г. А. ПАНОСЯН,
М. Г. ИНДЖИКЯН

Армянский филиал ВНИИ ИРЕА, Ереван

Поступило 28 VI 1985