2-Ацетонил-4-амилоксиметил-4-бутанолид (V). Выход 82%.
 т. кип. 129–130°/0,5 мм, n_D^{20} 1,4565, d_4^{20} 1,0407. R_f 0,53. Найдено %:
 С 64,35; Н 9,15. $C_{13}H_{22}O_4$. Вычислено %: С 64,46; Н 9,09. ИК спектр
 IV, V, ν , cm^{-1} : 1760 (C=O лакт.), 1715 (C=O кетон.), 1190, 1240
 (COC). ПМР спектр IV, V, δ , м. д.: 2,1 с (3H, CH₃, d), 2,9 м (3H,
 CH + CH₂, e + f).

В. С. АРУТЮНЯН,
 О МИ НАМ
 Т. В. КОЧИҚЯН,
 А. А. АВЕТИСЯН

Ереванский государственный университет

Поступило 8 VII 1986

Армянский химический журнал, т. 39, № 9, стр. 594–595 (1986 г.)

УДК 547.567

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ЭЛЕКТРОНОАКЦЕПТОРНЫХ ПОЛИМЕРОВ

Полимеры с электроноакцепторными свойствами мало изучены.
 Известные методы в основном многостадийные, а электроноакцеп-
 торные группы в полученных полимерах находятся в боковых цепях
 [1, 2].

Нами разработан способ получения соединений общей формулы:

взаимодействием соответствующих дианионов с хлоранилом (тетра-
 хлор-1,4-бензохинон).

В частности, взаимодействием хлоранила с натрий-1,1,2,2-тетра-
 цианэтандинидом получен поли(дихлор-2,5-циклогексадиен-1,4-дионди-

илтетрацианэтилен) $R = \begin{matrix} N \equiv C & & C \equiv N \\ & \diagdown & / \\ & C - C & \\ & / & \diagdown \\ N \equiv C & & C \equiv N \end{matrix}$. Характеристическая вяз-

кость полученного соединения $[\eta] = 0,08$ дл/г в ДМФА при 25°, $M_n =$
 $= 1,5 \cdot 10^4$. Найдено %: С 46,7; Н 0,3; N 18,8. $C_{22}Cl_2N_4O_2$. Вычислено %:
 С 47,5; Н 0; N 18,6.

При взаимодействии хлоранила с натрий-*p*-фениленбиспропанди-
 нилтридинидом получается поли(дихлор-2,5-циклогексадиен-1,4-дионди-

илдицианметиленилфенилендицианметиленил) $R = \begin{matrix} N \equiv C & & C \equiv N \\ & \diagdown & / \\ & C - \text{C}_6\text{H}_4 - C & \\ & / & \diagdown \\ N \equiv C & & C \equiv N \end{matrix}$

$[\eta] = 0,09 \text{ дл/г}$, в ДМФА при 25° , $M_n = 1,9 \cdot 10^3$. Найдено %: С 56,4; Н 1,4; N 14,6. $C_{18}H_4Cl_2N_4O_2$. Вычислено %: С 57,0; Н 1,04; N 14,8.

Для получения дианионов использованы как насыщенные соединения (1,1,2,2-тетрацианэтан и *n*-фениленбиспропандинитрил), так и соответствующие ненасыщенные соединения (тетрацианэтилен и 2,5-циклогексадиен-1,4-дилиденбиспропандинитрил).

Взаимодействием хлоранила с малонитрилом в присутствии основания получен поли(дихлор-2,5-циклогексадиен-1,4-диондиилди-

цианметилен), $R = -C \begin{matrix} / C \equiv N \\ \backslash C \equiv N \end{matrix}$. $[\eta] = 0,07 \text{ дл/г}$ в ДМФА при 25°

$M_n = 1,3 \cdot 10^3$. Найдено %: С 45,6; Н 0,2; Cl 30,1; N 12,2. $C_9Cl_2N_4O_2$. Вычислено %: С 45,2; Н 0; Cl 29,7; N 11,7.

Составы полученных соединений вычислены без учета концевых групп, и некоторые отклонения экспериментальных значений от расчетных, вероятно, обусловлены этим.

Образование этих соединений доказывается как данными элементного анализа, так и спектроскопическими данными. В спектрах полученных соединений имеются поглощения хинонового кольца при 1630—1660 и 1560—1590, 1650—1660 и 1610—1620, 1600—1640 и 1530—1570 $см^{-1}$, а также циановых групп при 2210, 2210—2230 и 2215 $см^{-1}$, соответственно. Первые два полимера имеют максимум поглощения в УФ области при 325, 326 $нм$, соответственно.

Реакции 1,1,2,2-тетрацианэтана, тетрацианэтилена, *n*-фениленбиспропионитрила, 2,5-циклогексадиен-1,4-дилиденбиспропионитрила с хлоранилом проведены следующим образом:

В круглодонной колбе в атмосфере азота в 50 мл сухого ДМФА растворяют 0,05 моля тетрацианового соединения и прибавляют 0,1 моля натрия, после полного реагирования которого прибавляют 0,05 моля хлоранила.

Герметично закрывая колбу, реакционную смесь нагревают на кипящей водяной бане 15 ч. Обработку опытов проводят обычным образом. Полимеры переосаждают из ацетонитрилового или диметилформамидного раствора эфир-гексановой смесью. Выход 90—100%.

Реакцию с малонитрилом проводят аналогично, однако сначала на моль малонитрила берут 1 моль натрия и после 9,5-часового нагревания к реакционной смеси прибавляют 2 моля поташа и нагревают еще 24 ч.

Молекулярные массы определены изопиестическим методом.

ЛИТЕРАТУРА

1. Tsuchida E., Abe E. — *Advances in Polym. Sci.*, 1982, vol. 45, p. 113.
2. Хидекель М., Жилева Е. — *ЖВХО им. Д. И. Менделеева*, 1978, т. 23, с. 506.

А. А. ДУРГАРЯН,
Р. Г. АРАКЕЛЯН,
Н. А. ДУРГАРЯН,

Ереванский государственный университет

Поступило 6 XI 1986