СИНТЕЗ И АДРЕНОБЛОКИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА ГИДРОХЛОРИДОВ N-ИНДОЛИЛАЛКИЛАМИНО- -1-АРИЛЗАМЕЩЕННЫХ АЛКАНОЛОВ

А. Б. САРКИСЯН, Л. П. СОЛОМИНА, Л. Ш. ПИРДЖАНОВ, О. С. НОРАВЯН,
А. В. ПОГОСЯН и Э. А. МАРҚАРЯН

Институт тонкой органической химии им. А. Л. Мнджояна
АН Армянской ССР, Ереван

Поступило 14 I 1986

Взаимодействием арилзамещенных эпоксиалканов с индолилалкиламинами получены соответствующие индолилалкиламиноэтанола и индолилалкиламиноизопропанола. Соединения, содержащие нитро-группы в бензольном кольце боковой цепи, восстановлены до соответствующих диаминопроизводных. Синтезированные соединения обладают умеренным α - и β -адреноблокирующим действием.

Табл. 1, библиографические ссылки 7.

Ранее [1] нами было показано, что производные индола, содержащие аминопропанольную группу, обладают β_1 - и β_2 -адреноблокирующим действием. Продолжая работы в этой области, мы предприняли синтез арилзамещенных индолилалкиламиноалканолов, содержащих хлор-, нитро- и аминогруппы в разных положениях ароматического кольца боковой цепи.

IIIа. R=H, R'=C ₆ H ₅	к. R=CH ₃ , R'=n-ClC ₆ H ₄ OCH ₃
б. R=H, R'=m-NO ₂ C ₆ H ₄	л. R=CH ₃ , R'=n-NO ₂ C ₆ H ₄ OCH ₃
в. R=H, R'=n-NO ₂ C ₆ H ₄	м. R=CH ₃ , R'=n-NH ₂ C ₆ H ₄ OCH ₃
г. R=H, R'=n-ClC ₆ H ₄ OCH ₃	н. R=CH ₃ , R'=m-NH ₂ C ₆ H ₄
д. R=H, R'=o-NO ₂ C ₆ H ₄ OCH ₃	о. R=H, R'=o-NH ₂ C ₆ H ₄ OCH ₃
е. R=H, R'=n-NO ₂ C ₆ H ₄ OCH ₃	п. R=H, R'=n-NH ₂ C ₆ H ₄ OCH ₃
ж. R=CH ₃ , R'=C ₆ H ₅	р. R=H, R'=n-NH ₂ C ₆ H ₄
з. R=CH ₃ , R'=m-NO ₂ C ₆ H ₄	с. R=H, R'=m-NH ₂ C ₆ H ₄
и. R=CH ₃ , R'=n-NO ₂ C ₆ H ₄	

Взаимодействием триптамина и α -метилтриптамина с замещенными арилокси-1,2-эпоксипропанами и арилэпоксиэтанами синтезированы соответствующие аминоспирты IIIа—л. [2]. Соединения IIIм—с получены восстановлением аминоспиртов III б, в, д, е, з, и, л, содержащих в ароматическом кольце нитро-группу, гидразингидратом в присутствии скелетного никеля [3]. Синтезированные соединения IIIа-с выделены и охарактеризованы в виде моно- и дигидрохлоридов.

Строение конечных соединений установлено физико-химическими методами и данными элементного анализа, чистота проверена хроматографически. В ИК спектре соединения IIIл обнаружены полосы поглощения при 3380 (NH инд.), 3300—3000 (NH, OH ассоц.), 2880—2860 (NH₂СГ), 1605—1595 (C=C аром.), 1540 (NO₂) см⁻¹. В ИК спектрах соединений IIIм-с отсутствует полоса поглощения при 1560—1540 см⁻¹, и появляется новая при 1680—1660 см⁻¹, характерная для деформационных колебаний NH₂-групп. В масс-спектрах соединений (IIIв, л) имеются молекулярный ион и ряд характерных осколков. Так, для IIIв обнаружены пики с *m/e* (J отн.) 325 (70), 294 (30), 277 (80), 195 (30), 173 (50), 159 (40), 130 (100), а для IIIл—369 (46), 239 (100), 217 (30), 199 (40), 158 (40), 130 (80), подтверждающих строение III [4, 5].

ПМР спектр соединения IIIв, *м. д.*: 2,6—3,0 м [6H, (CH₂)₃], 4,8 т (1H, ОСН), 7,0—8,4 м (9H, аром. H), 9,8 ш. с. (1H, NH инд.).

Исследованы α - и β -адреноблокирующие свойства всех синтезированных соединений. В опытах на изолированном семявыносящем протоке крысы изучалось влияние на α -адренорецепторы и проведение возбуждения через постганглионарные симпатические нервы [6]. Соединения испытывались в конечной концентрации 0,05 мМ. Установлено, что препараты IIIг-е, к, л, с аминопропанольным фрагментом, имеющие нитро- или хлор- заместители в бензольном кольце, проявляют длительное блокирующее действие (60 мин) на проведение возбуждения через симпатические нервные волокна, а на α -рецепторы оказывают кратковременное блокирующее влияние. Замена нитро-группы на амино-группу (IIIм, о, п) приводит к общему снижению активности. Соединения (IIIа-в, ж-и, н, р, с) с аминоктанольным фрагментом оказались менее активными.

β -Адреноблокирующее действие изучалось по [7]. Соединения вводились внутривенно и перорально. В качестве контрольного препарата служило известное β -блокирующее вещество—обзидан (пропраналол). Опыты показали, что соединения с аминоктанольным фрагментом IIIа-в, ж-и, н, р, с более активны, чем с аминопропанольным—IIIг, д, е, к, л. Однако весь ряд соединений проявляет слабые β_1 - и β_2 -адреноблокирующие свойства и уступает пропраналолю.

Препараты IIIа-с не обладают антиаритмическим действием и не оказывают влияния на ЦНС.

Экспериментальная часть

ТСХ проведена на пластинках «Silufol» в системе бензол—ацетон (1 : 1), насыщенной парами аммиака (А), и на окиси алюминия II степени активности в системе бензол—этилацетат (1 : 1) (Б). Проявитель—пары йода.

Температура плавления определена на приборе «Бозтиус-72». ИК спектры сняты на приборе UR-20 в вазелиновом масле, масс-спектры—на масс-спектрометре МХ-1320 с системой прямого ввода образца в источник ионов, ПМР спектры—на спектрометре «Varian T-60» (60-МГц), в качестве стандарта использован ТМС.

Гидрохлориды N-индоллилакклиаминопропаолов и аминоэтанолов

R	R'	Выход, %	Т. пл., °C	Найдено, %				Молекулярная формула	Вычислено, %				R _f (система)
				C	H	Cl	N		C	H	Cl	N	
H	C ₆ H ₅	94	132—133	68,00	6,40	10,99	8,60	C ₁₈ H ₂₁ ClN ₂ O	68,30	6,64	11,23	8,86	0,72 (A)
H	(<i>m</i> -NO ₂)C ₆ H ₄	77	92—93	59,65	5,85	9,50	11,83	C ₁₈ H ₂₀ ClN ₂ O ₂	59,37	5,42	9,73	11,53	0,58 (A)
H	(<i>n</i> -NO ₂)C ₆ H ₄	71	97—98	59,63	5,82	9,61	11,82	C ₁₈ H ₂₀ ClN ₂ O ₂	59,37	5,42	9,73	11,53	0,63 (A)
H	(<i>m</i> -NH ₂)C ₆ H ₄	49	141—142	58,23	5,86	18,97	11,82	C ₁₈ H ₂₃ Cl ₂ N ₃ O	58,69	6,25	19,29	11,41	0,58 (Б)
H	(<i>n</i> -NH ₂)C ₆ H ₄	53	147—148	59,10	6,48	18,80	11,94	C ₁₈ H ₂₃ Cl ₂ N ₃ O	58,69	6,25	19,29	11,41	0,59 (Б)
H	(<i>n</i> -Cl)C ₆ H ₄ OCH ₂	40	120—121	59,75	5,52	18,64	7,54	C ₁₉ H ₂₂ Cl ₂ N ₂ O ₂	59,89	5,82	19,00	7,35	0,59 (A)
H	(<i>o</i> -NO ₂)C ₆ H ₄ OCH ₂	84	82—83	58,35	5,65	9,40	10,30	C ₁₉ H ₂₂ ClN ₂ O ₄	58,23	5,62	9,06	10,71	0,70 (A)
H	(<i>n</i> -NO ₂)C ₆ H ₄ OCH ₂	79	166—167	58,45	5,62	9,28	10,28	C ₁₉ H ₂₂ ClN ₂ O ₄	58,23	5,62	9,06	10,71	0,63 (A)
H	(<i>o</i> -NH ₂)C ₆ H ₄ OCH ₂	67	132—133	57,70	6,10	17,60	10,28	C ₁₉ H ₂₃ Cl ₂ N ₃ O	57,43	6,05	17,88	10,58	0,51 (Б)
H	(<i>n</i> -NH ₂)C ₆ H ₄ OCH ₂	45	134—135	57,65	6,50	17,58	10,23	C ₁₉ H ₂₃ Cl ₂ N ₃ O	57,43	6,05	17,88	10,58	0,53 (Б)
CH ₃	C ₆ H ₅	65	108—109	69,20	7,20	10,50	8,70	C ₁₉ H ₂₃ ClN ₂ O	68,96	6,96	10,74	8,47	0,50 (A)
CH ₃	(<i>m</i> -NO ₂)C ₆ H ₄	90	115—116	61,13	5,40	8,76	11,53	C ₁₉ H ₂₂ ClN ₂ O ₂	60,72	5,85	9,17	11,17	0,67 (A)
CH ₃	(<i>n</i> -NO ₂)C ₆ H ₄	75	111—112	61,00	5,70	9,18	10,67	C ₁₉ H ₂₂ ClN ₂ O ₂	60,72	5,85	9,17	11,17	0,71 (A)
CH ₃	(<i>m</i> -NH ₂)C ₆ H ₄	89	166—167	59,80	6,60	18,40	11,50	C ₁₉ H ₂₅ Cl ₂ N ₃ O	59,95	6,54	18,58	10,99	0,64 (Б)
CH ₃	(<i>n</i> -Cl)C ₆ H ₄ OCH ₂	74	135—136	61,00	6,30	8,80	6,95	C ₂₀ H ₂₄ Cl ₂ N ₂ O ₂	60,76	6,08	8,98	7,09	0,57 (A)
CH ₃	(<i>n</i> -NO ₂)C ₆ H ₄ OCH ₂	50	93—94	59,30	5,90	9,10	10,18	C ₂₀ H ₂₄ ClN ₂ O ₄	59,11	5,91	8,75	10,35	0,56 (A)
CH ₃	(<i>n</i> -NH ₂)C ₆ H ₄ OCH ₂	35	143—144	58,30	6,50	17,20	10,25	C ₂₀ H ₂₇ Cl ₂ N ₃ O	58,25	6,31	17,23	10,19	0,61 (Б)

Гидрохлориды *N*-[1-*R*-2-(β -индолил)этил]-1-арилокси-3-амино-2-пропанолов и арил-аминоэтанолов IIIа-л. Смесь 0,018 моля амина I, 0,02 моля эпоксида II, 1 мл воды в 50 мл изо-пропильного спирта кипятят 10—12 ч с обратным холодильником. Растворитель отгоняют, остаток растворяют в 20—30 мл абс. эфира и наносят на колонку (1=1 м, $d=40$ мм) с окисью алюминия II степени активности (20 г на 1 г вещества), элюируют смесью бензол-этилацетат (1 : 1), собирая фракцию с соответствующим R_f (табл.). Отгоняют растворитель, остаток растворяют в 50—75 мл безводного ТГФ и прибавлением эфирного раствора хлористого водорода получают гидрохлорид. Перекристаллизовывают из смеси эфир-этанол (5 : 1) (табл.).

Дигидрохлориды *N*-[1-*R*-2-(β -индолил)этил]-1-(*o*- или *p*-аминофенокси)-3-амино-2-пропанолов и-(*m*- или *p*-аминофенол)аминоэтанолов IIIм-с. К раствору 0,006 моля соединения IIIб, в, д, е, з, л в 50 мл этанола при 60—70° прибавляют 2 г скелетного никеля и по каплям 12 мл гидразингидрата 75% в течение 15—20 мин. Смесь кипятят при перемешивании до полного выделения аммиака (25—30 ч). Катализатор отфильтровывают, растворитель отгоняют в вакууме, остаток растворяют в 50 мл безводного ТГФ и прибавляют эфирный раствор хлористого водорода. Полученный дигидрохлорид перекристаллизовывают из смеси эфир-ацетон (5 : 1) (табл.).

1-ԱՐԻՆՏԵՆԿԱԿԱԿԱՄ N-ԻՆԴՈՒԼԻԱԿԻԼԱՄԻՆՈԱԿԱՆՈՒՆԵՐԻ
ՀԻԴՐՈՔԼՈՐԻԴՆԵՐԻ ՍԻՆԹԵԶԸ ԵՎ ԱԴՐԵՆԱՄԵԿԻՈՒՍԱՑՆՈՂ
ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ա. Բ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ, Լ. Պ. ՍՈԼՈՄԻՆԱ, Լ. Շ. ՊԻՐՋԱՆՈՎ, Հ. Ս. ՆՈՐԱՎԻԱՆ,
Ա. Վ. ՊՈՂՈՍՅԱՆ և Է. Ա. ՄԱՐԿԱՐԻԱՆ

Արիտեղակաված էպոկսիակալանների և ինդոլիլակիլամինների փոխազդեցութեան արդյունքում ստացված են համապատասխան ինդոլիլակիլամինոէթանոլներ և -պրոպանոլներ: Արոմատիկ օղակում նիտրո-խումբ պարունակող միացութեաները վերականգնված են մինչև դիամինների: Սինթեզված նյութերը օժտված են շափավոր α - և β -ադրենամեկուսացնող հատկութեամբ:

SYNTHESIS AND ADRENO-BLOCKING PROPERTIES OF
THE HYDROCHLORIDES OF N-INDOLYLALKYLAMINO-1-ARYL-
SUBSTITUTED ALKANOLS

A. B. SARKISSIAN, L. P. SOLOMINA, L. Sh. PIRJANOV, H. S. NORAVIAN,
A. V. POGHOSSIAN and E. A. MARKARIAN

By the interaction of aryl-substituted epoxyalkanes with indolyllalkylamines, the corresponding indolyllalkylaminoethanols and indolyllalkylaminopropanols have been obtained. The compounds bearing nitro-groups in benzene ring were reduced to the corresponding diamino-derivatives.

The synthesized compounds show moderate α - and β -adreno-blocking properties.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Саркисян А. Б., Соломина Л. П., Пирджанов Л. Ш., Маркарян Э. А., Арзанунц Э. М., Саркисян И. С., Норавян О. С. — Хим. фарм. ж., 1985, т. 19, № 4, с. 423.
2. Keighbaum W. E., Matier W. L., Dennis P. D. — J. Med. Chem., 1980, vol. 23, № 3, p. 385.
3. Valcon D., Furst A. — J. Am. Chem. Soc., 1953, vol. 75, № 17, p. 4334.
4. Parker R. E., Isaacs N. S. — Chem. Rev., 1959, vol. 59, № 4, p. 737.
5. Вартанян С. О., Авакян А. С., Маркарян Э. А., Цатикян А. С., Маркарян К. Ж. — Арм. хим. ж., 1981, т. 35, № 6, с. 505.
6. Авакян О. М. — Биол. ж. Армения, 1968, т. 21, № 6, с. 8.
7. Авакян О. М., Норавян О. С. — Биол. ж. Армении, 1976, т. 29, с. 41.

Армянский химический журнал, т. 40, № 10, стр. 659—660 (1987 г.)

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 543.51+547.461.4/5

МАСС-СПЕКТРЫ α -АЛКОКСИБЕНЗИЛЗАМЕЩЕННЫХ СУКЦИНИМИДОВ И ГЛУТАРИМИДОВ

Р. Т. ГРИГОРЯН и К. А. ТАТЕВОСЯН

Институт тонкой органической химии им. А. Л. Миджояна
АН Армянской ССР, Ереван

Поступило 10 IV 1986

В продолжение исследований в области замещенных иминов двухосновных карбоновых кислот [1, 2] нами изучены масс-спектры нижеследующих соединений [3, 4].

I—VI, $n=1$; VII—XIII, $n=2$.

I, VII. $R=C_2H_5$, II, VIII. $R=C_3H_7$, III, IX. $R=изо-C_3H_7$, IV, XI. $R=изо-C_4H_9$,
V, XII. $R=C_5H_{11}$, VI, XIII. $R=изо-C_5H_{11}$, X. $R=C_4H_9$.

Настоящее сообщение является дополнением к работам [1, 2]. Целью его является выяснение влияния на характер фрагментации α -замещенных сукцинимидов и глутаримидов метиленовой группы, введенной между бензольным и гетероциклическим ядрами.

Масс-спектры соединений I—XIII коренным образом отличаются от масс-спектров α -*h*-алкоксибензилсукцин- и глутаримидов, исследованных в [1, 2]. Так, если масс-спектры соединений, описанных в [1, 2], в основном состоят из пиков ионов, обусловленных разрывами связей в гетероциклическом кольце, то в случаях соединений I—XIII пики аналогичных ионов в масс-спектрах отсутствуют. Характерными для соединений I—XIII, наряду с молекулярными, являются пики ионов, образование