ОБЩАЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

УДК 541.144.8+632.95

РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ПИРАЗОЛОНОВ В ОТНОШЕНИИ РАДИКАЛОВ $\dot{\text{O}}\text{H}$ И $\dot{\text{O}}_2^-$

Г. П. ПИРУМЯН, А. И. МАРТИРЯН, Ю. И. СКУРЛАТОВ, Е. В. ШТАММ и
Дж. М. НАЛБАНДЯН

Ереванский государственный университет
Институт химической физики АН СССР, Москва

Поступило 18 IX 1987

Изучена реакционная способность насыщенных и ненасыщенных производных пиразолонов рыбохозяйственного назначения в отношении $\dot{\text{O}}\text{H}$ и $\dot{\text{O}}_2^-$ для оценки скорости радикального окисления этих соединений в случае конкретного природного или искусственного водоема. Получены константы скоростей взаимодействия $\dot{\text{O}}\text{H}$, $\dot{\text{O}}_2^-$ с А²-57 и ВАС-195.

Рис. 3, библиографические ссылки 5.

В последнее время при изучении химической трансформации веществ в природных водах все большее внимание уделяется процессам с участием свободных радикалов и H_2O_2 [1]. При фотоллизе многих растворенных в природных водах органических соединений в присутствии кислорода образуются радикалы $\dot{\text{O}}_2^-$ (HO_2), которые либо диспропорционируют с образованием H_2O_2 :

либо взаимодействуют с растворенными в воде веществами.

Радикал $\dot{\text{O}}_2^-$ (HO_2) обладает как электронодонорными, так и электроноакцепторными свойствами. Обычно «партнерами» этих радикалов служат ионы металлов переменной валентности, в частности, ионы меди:

Наряду с ними во взаимодействии с $\dot{\text{O}}_2^-$ могут участвовать другие акцепторы электрона (А):

или вещества-доноры электрона или атома Н (DH_2):

Помимо радикалов $\dot{\text{O}}_2^-$ (HO_2), при фотоллизе H_2O_2 , NO_2^- , NO_3^- . $[\text{Fe}(\text{OH})]^{+2}$ в природных водах образуются $\dot{\text{O}}\text{H}$ — наиболее эффек-

тивные окислители растворенных в воде веществ органической и неорганической природы [2]. Радикалы OH могут образовываться и в результате темновых процессов—при взаимодействии ионов металлов в восстановленной форме, в частности, ионов Cu^{+2} , Fe^{+2} или других доноров электрона с H_2O_2 .

С целью установления реакционной способности OH в отношении производных пиразолонов было изучено влияние их на скорость обесцвечивания красителя паранитрозодиметиланилина (ПНДМА) при фотолизе H_2O_2 в дистиллированной воде. Для оценки реакционной способности производных пиразолонов в отношении O_2^- (HO_2) было изучено их влияние на кинетику каталитического разложения H_2O_2 при ее высоких концентрациях. Часть опытов по фотолизу H_2O_2 проводили в присутствии формиат-иона и следили за трансформацией указанных соединений [3].

Экспериментальная часть

В качестве объектов исследования взяты соединения: фенилгидразон 3,3-диметил-5-оксопиразолидин-2-карбальдегида (препарат A_2^2 -57), оксалат 3-метил-4-бутил-4-(2'-гидразинокарбонилэтил)-2-пиразолин-5-она (препарат ВАС-229), 3-метил-4-(2'-гидразинокарбонилэтил)-2-пиразолин-5-он (препарат ВАС-195), обладающие антимикробной активностью и стимулирующие развитие рыб.

Реакционную способность указанных соединений в отношении OH изучали, применяя в качестве конкурентного акцептора OH ПНДМА [4]. Иницирование OH осуществляли фотолизом H_2O_2 (10^{-3} моль/л) под действием УФ света $\lambda=313$ нм. Скорость иницирования OH измеряли по скорости обесцвечивания ПНДМА в дистиллированной воде.

Реакционную способность ВАС-229, ВАС-195 с супероксидным радикалом изучали методом газометрического анализа—по влиянию добавок этих соединений на скорость каталитического разложения H_2O_2 при высоких ($\sim 1\text{M}$) концентрациях, $\text{pH}=7$ (0,1 М фосфатный буфер) [5]. Фотолиз H_2O_2 осуществляется на длине волны $\lambda=313$ нм (фильтр БС-3).

Информация о реакционной способности A_2^2 -57 в отношении O_2^- (HO_2) была получена на основе спектрофотометрических измерений при фотолизе H_2O_2 в присутствии формиат-иона (0,3—0,1 моль/л).

Результаты и обсуждение

Препараты ВАС-229 и ВАС-195 в слабокислой водной среде неактивны в отношении OH , что, по-видимому, связано с нахождением их в этих условиях в протонированной форме. Поэтому измерения проводили при $\text{pH}=9$.

Оказалось, что в неионизованной форме изучаемые соединения обладают высокой реакционной способностью в отношении OH . Константы скорости рассчитывали по уравнению и из данных рис. 1:

$$K_{\text{OH}+\text{P}} = 1,25 \cdot 10^{10} \frac{[\text{ПНДМА}]}{[\text{P}]} \cdot \left(\frac{W_1}{W_2} - 1 \right), \quad (6)$$

где $1,25 \cdot 10^{10}$ —константа скорости взаимодействия ОН с ПНДМА, $[\text{P}]$ —концентрация пиразолона, W_1 и W_2 —скорости обесцвечивания ПНДМА в дистиллированной воде и в присутствии P, соответственно.

Для А²-57 $K_{\text{OH}+\text{P}} = 1,01 \cdot 10^{10} \text{ л} \cdot \text{моль}^{-1} \cdot \text{с}^{-1}$, а для ВАС-195 (при рН=9) $K_{\text{OH}+\text{P}} = 1,1 \cdot 10^{10} \text{ л} \cdot \text{моль}^{-1} \cdot \text{с}^{-1}$.

Рис. 1. Зависимость скорости обесцвечивания ПНДМА (в относительных единицах) от концентрации: а) А²-57, б) ВАС-19. $[\text{ПНДМА}]_0 = 8,2 \cdot 10^{-6} \text{ моль/л}$. $[\text{H}_2\text{O}_2]_0 = 10^{-3} \text{ моль/л}$.

Тот факт, что при высоких концентрациях добавок А²-57 ($\sim 10^{-4}\text{M}$) и ВАС-195 ($\sim 10^{-4}\text{M}$) скорость обесцвечивания ПНДМА не уменьшается до нуля, свидетельствует о регенерации ОН при последующих превращениях вторичных радикалов, образованных в результате взаимодействия ОН с исходными веществами [4].

Поскольку при высоких концентрациях производных пиразолонов скорость обесцвечивания ПНДМА не зависит от присутствия кислорода воздуха (были проведены опыты в атмосфере аргона марки «ос. ч.»), регенерация ОН возникает, по-видимому, при взаимодействии вторичных радикалов этих соединений с примесями ионов металлов и H_2O_2 . Другими словами, радикалы производных пиразолонов обладают выраженными восстановительными свойствами и легко окисляются до продуктов двухэлектронного окисления.

При фотоллизе ВАС-229 при рН=9 обнаружено увеличение скорости обесцвечивания ПНДМА при низких концентрациях этого соединения и торможение процесса—при высоких. Таким образом, ВАС-229 обладает двойственной функцией. Поскольку единственным существенным отличием ВАС-229 от ВАС-195 является присутствие у первого оксалатной группы, то можно предположить, что в щелочной среде фотоллиз этой группы приводит к дополнительному инициированию ОН. Реакционная способность пиразолона ВАС-229 в отношении ОН, по-видимому, такая же высокая, как и ВАС-195. Представляет интерес в дальнейшем изучить механизм инициирования ОН при фотоллизе ВАС-229 более детально.

На рис. 2 приведены данные по влиянию концентраций ВАС-229 и ВАС-195 на скорость газовой выделению. Опыты проводили при 50°. В качестве катализаторов использованы добавки ионов меди. Как установлено в работе [4], радикально-цепной механизм разложения H_2O_2 при высоких концентрациях H_2O_2 в нейтральных водных растворах осуществляется только в присутствии меди, причем длина цепи невелика.

Рис. 2. Зависимость скорости газовой выделению W_{O_2} от концентрации: а) ВАС-229. б) ВАС-195. $[H_2O_2] = 1$ М, $pH = 9$, $[Cu^{+2}] = 10^{-5}$ М

При каталитическом разложении H_2O_2 вклад в выделение O_2 обусловлен несколькими процессами, основными из которых являются диспропорционирование $O_2^-(HO_2)$ по реакции (1), приводящее к обрыву цепи, и продолжение цепи за счет взаимодействия O_2^- с Cu^{+2} по реакции (2).

Измеряемым параметром служит скорость газовой выделению (W_{O_2}):

$$W_{O_2} = k_1 [O_2^-]^2 = k_2 [O_2^-] [Cu^{+2}]. \quad (7)$$

В присутствии акцепторов радикалов OH , O_2^- скорость выделению O_2 уменьшается за счет уменьшения длины цепи в процессе разложения H_2O_2 . При этом обрыв цепи может быть обусловлен взаимодействием акцептора либо с OH , либо с O_2^- . В первом случае при увеличении концентрации акцептора процесс становится нецепным и скорость газовой выделению определяется скоростью инициирования радикалов O_2^- . Во втором случае с ростом концентрации акцептора скорость газовой выделению уменьшается до нуля. Соответственно в условиях рис. 2 влияние малых добавок ВАС-195 и ВАС-229 может быть обусловлено взаимодействием их с OH .

О реакционной способности этих соединений в отношении O_2^- -радикалов можно судить по влиянию больших концентраций. Как следует из рис. 2, соединение ВАС-229 с O_2^- не взаимодействует (скорость газовой выделению не уменьшается до нуля). Реакционную способность ВАС-195 можно оценить по величине полуэффекта второй «фазы» зависимости W_{O_2} от добавок этого соединения $[P]_{0.5} \approx 1,2 \cdot 10^{-3}$ М из соотношения

$$k_{P, O_2^-} := \sqrt{2k_1 W_{I_1}} / [P]_{0.5}, \quad (8)$$

где W_1 — экстраполированное к нулевой концентрации ВАС-195 значение W_0 , рис. 26, k_1 (рН = 9) = $6 \cdot 10^3 \text{ M}^{-1} \cdot \text{c}^{-1}$ — константа скорости диспропорционирования $\dot{\text{O}}_2^-$ (HO_2). Из этого соотношения при 50° получается:

$$k_{\dot{\text{O}}_2^- + \text{P}} = 50 \text{ M}^{-1} \cdot \text{c}^{-1}.$$

Для рН = 7, $k_1 = 6 \cdot 10^3 \text{ M}^{-1} \cdot \text{c}^{-1}$ и $k_{\dot{\text{O}}_2^- + \text{P}} = 5 \cdot 10^3 \text{ M}^{-1} \cdot \text{c}^{-1}$.

Продукт трансформации А²-57 окрашен, что позволяет следить за кинетикой реакции спектрофотометрически. В присутствии формиат-иона фотоллиз H_2O_2 приводит к образованию $\dot{\text{O}}_2^-$ -радикала:

В отсутствие добавок других акцепторов радикалов стационарная концентрация $\dot{\text{O}}_2^-$ определяется скоростью инициирования $\dot{\text{O}}\text{H}$ (измеряемый в тех же условиях в отсутствие HCO_2^- с помощью ПНДМА) и диспропорционированием $\dot{\text{O}}_2^-$ (HO_2)-радикалов:

$$[\dot{\text{O}}_2^-] = \sqrt{\frac{W_1}{2k_1}} \quad (12)$$

Рис. 3. Зависимость скорости окисления А²-57 при фотоллизе H_2O_2 в присутствии формиат-иона от концентрации А²-57.

Оказалось, что начальная скорость трансформации А²-57 не зависит от избытка формиат-иона (все радикалы $\dot{\text{O}}\text{H}$ трансформируются в $\dot{\text{O}}_2^-$) и пропорциональна концентрации вводимого А²-57 (рис. 3). Эти данные свидетельствуют о том, что А²-57 не перехватывает все $\dot{\text{O}}_2^-$ -радикалы, и их стационарная концентрация определяется выражением (12). Подставляя величины $W_1 = 2 \cdot 10^{-8} \text{ M}^{-1} \cdot \text{c}^{-1}$, $2k_1 = 1.2 \cdot 10^4$ (рН = 9) $\text{M}^{-1} \cdot \text{c}^{-1}$ в эффективную константу скорости

трансформации $A^2-57 - k_{\text{эф.}} = 10^{-4} \text{ с}^{-1}$ (рис. 3), находим для этого соединения величину $k_{\text{O}_2^- + P(25^\circ)} \approx 7 \cdot 10^3 \text{ M}^{-1} \cdot \text{с}^{-1}$.

Указанным способом можно для каждого конкретного природного водоема оценить скорость радикального окисления этих соединений.

ՊԻՐԱԶՈՂՈՆՆԵՐԻ ՈՐՈՇ ԱՇԱՆՅՅԱԼՆԵՐԻ ՌԵԱԿՑԻՆՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՕՆ ԵՎ Օ₂⁻ ՀԱՆԴԵՊ

Գ. Գ. ՓԻՐՈՒՄՅԱՆ, Ա. Ի. ՄԱՐՏԻՐՅԱՆ, ՅՈՒ. Ի. ՍԿՈՒՐԼԱՏՈՎ,
Ե. Վ. ՇՏԱՄ և Զ. Մ. ՆԱԲԱՆԴԻԱՆ

Ուսումնասիրված է ձկնարդյունաբերական նշանակություն ունեցող որոշ հազգեցած և շհազեցած պիրազոլոնների ռեակցիոնունակությունը ՕՆ և Օ₂⁻ հանդեպ:

REACTIVITY OF SOME PYRAZOLONE DERIVATIVES
TOWARDS OH AND O₂⁻

G. P. PIROUMIAN, A. I. MARTIRIAN, Yu. I. SKOURLATOV,
E. V. SHTAMM and J. M. NALBANDIAN

The reactivity of saturated and unsaturated pyrazolone derivatives, designated for fishing industry purposes, towards OH and O₂⁻ has been studied.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Скурлатов Ю. И., Эрнестова Л. С., Штамм Е. В., Шлотова Т. В., Калинин В. Б.— ДАН СССР, 1984, т. 276, № 4, с. 1014.
2. Пикаев А. К., Кобаки С. А.— Реакционная способность первичных продуктов радиолиза воды. Справочник. М., Энергониздат, 1982, 200 с.
3. Blaiski V. H. J., Cabelli D. E., Arudi R. I., Ross A. B.— J. Phys. chem., 1985, v. 14, p. 1041.
4. Эрнестова Л. С., Скурлатов Ю. И.— ЖФХ, 1984, т. 58, № 10, с. 2358.
5. Шлотова Т. В.— Кинетика химических превращений загрязняющих веществ в природных водах и модельных системах. Автореферат дисс. на соиск уч. ст. канд. хим. наук, 1985, Кишинев.