1,78 г (0,01 моля) глюкозона и кипятят в течение 6 ч. Выпавший после охлаждения осадок отфильтровывают и перекристаллизовывают из этанола. ИК спектр, ν , см^{-1} : 1650 (C=N). Масс-спектр, m/e : 255, 136, 121, 106, 77.

Бис-(циклогексалимин)глюкозона (VIII) получен аналогично VII из 1,0 г (0,01 моля) циклогексиламина и 0,9 г (0,005 моля) глюкозона. ИК спектр, ν , см^{-1} : 1640 (C=N). Масс-спектр, m/e : 252, 224, 171, 98, 84, 70; 56.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Диланян Э. Р., Овсепян Т. Р., Арсемян Ф. Г., Степанян Г. М., Миронов Е. А., Вольский М. Е. — Хим.-фарм. ж., 1984, № 8, с. 927.
2. Tang A., Lien E. J., Lai M. M. C. — J. Med. Chem., 1985, v. 28, № 8, p. 1103.
3. Овсепян Т. Р., Диланян Э. Р., Акопян Н. Е., Чаушян К. А., Мелконян Ж. С., Буничян Ж. М., Азаронян А. С., Пароникян Г. М., Акопян Л. Г. — Депонированная ЦБНТИ мед. пром., Хим.-фарм. промышленность, вып. 1, 1983, рукопись № 136.

Химический журнал Армении, т. 48, № 1—3, стр. 157—160 (1995 г.)

УДК 542.91+547.831/811.922.3

СИНТЕЗ АРИЛАЛКИЛАМИДОВ 3,4-ДИМЕТОКСИФЕНИЛУКСУСНОЙ И 3,4-ДИМЕТОКСИКОРИЧНОЙ КИСЛОТЫ

Э. Л. АКОПЯН и **А. О. ТОСУНЯН**

Институт тонкой органической химии им. А. Л. Миджояна
НАН Республики Армения, Ереван

Поступило 3 IV 1991

С целью получения новых потенциально возможных антагонистов кальция нами синтезирован ряд аналогов изоптина [1], содержащих диметоксифенильный фрагмент, тетрагидропирановое кольцо, третбутиламинную и амидную функции.

Синтез намеченных соединений осуществлен взаимодействием 3,4-диметоксифенилуксусной кислоты (I) в растворе декалина с вторичными аминами—2,2-диметил-4-(фенил-, бензил-, 4-метоксибензил-, 3,4-диметоксибензил-, 1,2,5-триметил-4-пиперидил)аминотетрагидропиранами (III—VII) и 3,4-диметоксибензилтретбутиламинол (X). При этом получен ряд арилалкиламидов 3,4-диметоксифенилуксусной кислоты XII—XVII. Так как в декалине 3,4-диметоксикоричная кислота (II) подвергается осмолению, то арилалкиламиды II были синтезированы иным путем, а именно, путем превращения соединений II в хлорангидриды с помощью тионилхлорида и дальнейшим взаимодействием хлорангидридов с аминами без предварительной очистки. В результате взаимодействия хлорангидридов с аминами—2,2-диметил-4-метиламино-

тетрагидропираном (VIII), бензилтретбутиламином (IX), 3,4-диметоксисбензилтретбутиламином (X) и 4-метоксисбензилтретбутиламином (XI)—получены ожидаемые амиды XVIII—XXI.

Восстановлением алюмогидридом лития (АГЛ) 3,4-диметоксисбензилтретбутиламида 3,4-диметоксифенилуксусной кислоты (XVII) и 4-метоксисбензилтретбутиламида 3,4-диметоксикоричной кислоты (XX) получены соответственно N-(3,4-диметоксифенэтил)-N-(3,4-диметоксисбензил)третбутиламин (XXII) и N-(3,4-диметоксифенил-1-пропенил)-N-(4-метоксисбензил)-третбутиламин (XXIII) по схеме:

I R = 3,4(CH₃O)₂C₆H₃CH₂ (Z). II R = 3,4(CH₃O)₂C₆H₃-CH=CH (V). III R₂ = C₆H₅,

IV R₂ = C₆H₄CH₃. V R₂ = 4CH₃OC₆H₄CH₂. VI R₂ = 3,4(CH₃O)₂C₆H₃CH₂.

X (R₁) = C(CH₃)₃, R₂ = 3,4(CH₃O)₂C₆H₃CH₂. XI (R₁) = C(CH₃)₃; R₂ = 4CH₃OC₆H₄CH₂,

XII R = Z; R₂ = C₆H₅. XIII R = Z; R₂ = C₆H₄CH₃. XIV R = Z; R₂ = 4CH₃OC₆H₄CH₂.

XVII R = Z. (R₁) = C(CH₃)₃; R₂ = 3,4(CH₃O)₂C₆H₃CH₂

Структуры синтезированных соединений подтверждены элементным анализом, ИК, ПМР и масс-спектральными методами анализа.

Исследованы некоторые биологические свойства синтезированных соединений. Оказалось, что все они обладают слабым блокирующим действием ионов кальция.

Экспериментальная часть

ИК спектры сняты на приборе «UR-20», ПМР—на «Varian T-60» с внутренним стандартом ТМС, масс-спектры—на приборе «MX-1303». Вторичные амины III—X синтезированы известными способами [2].

Синтез арилалкиламиноамидов 3,4-диметоксифенилуксусной кислоты (XII—XVII). Смесь 0,1 моля 3,4-диметоксифенилуксусной кислоты [3] и 0,12 моля соответствующего вторичного амина кипятят в 30 мл декалина при 170° в течение 5 ч. После удаления декалина остаток перегоняют в вакууме. Выходы и константы амидов XII—XVII приведены в таблице.

В ИК спектрах полученных амидов присутствуют полосы поглощений С=О группы в области 1680—1700 см⁻¹. ПМР спектры соединения XI (CCl₄), δ, м. д.: 1,2—1,25 д (6H, 2CH₃); 3,70 с (6H, 2CH₃O); 6,30—7,1 м (8H, C₆H₄ и C₆H₅).

Синтез арилалкиламиноамидов 3,4-диметоксикоричной кислоты (XVIII—XXI). Смесь 10,4 г (0,05 моля) 3,4-диметоксикоричной кислоты, 3 г диметилформаида в 100 мл сухого бензола кипятят при 80°. При этом по каплям добавляют 8 г свежеперегнанного хлористого тионила и продолжают кипячение до полного растворения осадка, примерно в течение 3 ч. После удаления избытка хлористого тионила к остатку добавляют 0,1 моля соответствующего вторичного амина и кипятят 5 ч. Образовавшиеся кристаллы (гидрохлорид амина) отфильтровывают. После удаления бензола получают амиды XVIII—XXI, константы которых приведены в таблице.

В ИК спектрах соединений XVII—XX присутствует полоса поглощения С=О группы, в области 1670—1680, см⁻¹. ПМР-спектры соединения XIX (CCl₄), δ, м. д.: 1,2—1,5 с (9H, C(CH₃)₂); 3,75 с (9H, 3CH₃O); 6,7—7,2 м (7H, C₆H₄ и C₆H₅).

N-(3,4-Диметоксифенэтил)-N-(3,4-диметоксибензил)третбутиламин (XXII). К 3 г АГЛ в 150 мл сухого эфира при 10° добавляют по порциям 7,5 г 3,4-диметоксибензилтретбутиламино амида 3,4-диметоксифенилуксусной кислоты (XVI). Смесь нагревают 25 ч при 34—35°. После

охлаждения раствора до 0—5° комплекс осторожно разлагают водом (10 мл) при 10—12°. Добавляют 10 мл 30% раствора едкого натра. На следующий день прозрачный раствор декантируют, сушат сульфатом магния. Получают 5,36 г (80%) соединения XXI. Т. кип. 170—2°/8 мм. Найдено, %: С 71,99; Н 9,09; N 3,35. C₂₃H₃₃O₄N. Вычислено, %: С 71,28; Н 8,58; N 3,71. Т. пл. гидрохлорида 265°. ПМР спектр (CCl₄), δ, м. д.: 1,2 с (9Н, С(CH₃)₃); 3,75 с (12Н, 4СН₃O); 6,8—6,9 (6Н, 2С₆H₅).

Таблица
Арилалкиламиноамиды 3,4-диметоксикоричной и 3,4-диметоксиаричной кислоты (XI—XX)

Соединение	Выход, %	Т. кип., °С	Т. пл., °С	Найдено, %			Брутто формула	Вычислено, %			Т. пл. гидрохлорида, °С
				С	Н	N		С	Н	N	
XII	72	220—222,9	—	72,52	7,18	3,62	C ₂₃ H ₃₁ O ₄ N	72,29	7,61	3,70	171
XIII	59	210—212,9	—	72,10	7,45	3,29	C ₂₁ H ₃₁ O ₄ N	71,90	7,85	3,52	215—216
XIV	64	208—210,2	—	69,54	7,29	3,11	C ₂₃ H ₃₃ O ₅ N	68,24	7,71	3,06	185—186
XV	68	218—222,9	110	68,41	8,29	3,50	C ₂₆ H ₃₅ O ₆ N	68,24	7,71	3,36	235
XVI	39	260—265,8	—	67,98	8,99	6,43	C ₂₃ H ₄₀ O ₄ N ₂	69,41	9,47	6,32	155
XVII	32	—	56—157	68,73	8,15	3,84	C ₂₃ H ₃₇ O ₅ N	68,80	7,75	3,48	—
XVIII	18	145—150,3	—	68,39	7,81	4,23	C ₁₉ H ₂₇ O ₄ N	68,44	7,16	4,20	—
XIX	36	—	186—188	74,76	8,20	3,90	C ₂₃ H ₂₇ O ₃ N	74,75	7,69	3,96	—
XX	68	—	118—119	71,72	7,92	4,02	C ₂₁ H ₃₁ O ₄ N	72,03	7,62	3,65	—
XXI*	54	—	117—118	71,82	7,64	4,11	C ₂₁ H ₃₁ O ₅ N	72,51	7,87	3,56	—

* M⁺ = 415. Вычислено 415,51.

** Гидрохлорид растворяют в минимальном количестве сухого этанола и осаждают в сухом эфире.

N-(3,4-Диметокси-1-фенилпропенил)-3-(4-метоксибензил)третбутиламин (XXIII). Аналогично вышеописанному 5,5 г 4-метоксибензилтретбутиламино амида, 3,4-диметоксикоричной кислоты (XIX) восстанавливают с помощью 3 г АГЛ в 150 мл сухого эфира. Получают 5 г (82%) соединения XXIII. Т. кип. 250—55°/5 мм. Найдено, %: С 74,65; Н 8,47; N 4,17. C₂₃H₃₁O₃N. Вычислено, %: С 74,76; Н 8,45; N 3,79. Гидрохлорид гигроскопичен. ПМР спектр (CCl₄), δ, м. д.: 1,1 с (9Н, С(CH₃)₃); 3,84 с (9Н, 3СН₃O); 6,9—7,1 м (7Н, С₆H₅, С₆H₄).

ЛИТЕРАТУРА

1. Пат. 615.861. Бельгия/Кволл.—С. А., 1963, у 59, р. 13892
2. Аюбян Э. Л., Нораян О. С., Тосунян А. О.— Арм. хим. ж., 1990, с. 48, № 1—3, с. 103.
3. Рубцов М. В., Байчиков А. Г.— Сипт. хим.-фарм. препараты, М., 1971, с. 227