ПЕНТАГАЛОГЕНПРОПИЛЕНОКСИДЫ—СИНТОНЫ ДЛЯ СИНТЕЗА ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ДИПЕПТИДОВ

Л. Х. ГАЛСТЯН, Н. Т. ГУКАСЯН и А. А. АВЕТИСЯН

Ереванский государственный университет

Поступило 4 X 1994

В настоящей работе изучено взаимодействие гем-дигалогенэпоксидов с эфирами аминокислот

Известно, что аминокислоты, содержащие N-карбоксиметил (См) защитную группу I, обладают широким спектром биологической активности.

Типичными примерами таких аминокислот, найденных в природе, являются октопин [1], лизопин [2], нолапин [3]. См-лейцин входит в состав природного антибиотика пептидного характера боттромацина А₂ [4], а См-аланин-стромбин был выделен из экстракта *Strombus gigas* [5]. Японскими исследователями получены синтетические См-аминокислоты [6], пептиды и их диалкиловые эфиры [7]. Однако синтез диалкиловых эфиров См-пептидов осуществляется в несколько стадий, в жестких условиях и с применением труднодоступных соединений.

Нами осуществлен синтез диалкиловых эфиров См-дипептидов, заключающийся во взаимодействии синтезированных нами ранее [8] смешанных (хлор, бром)пентагалогенпропиленоксидов IIa-в с алкиловыми эфирами глицина, β-аланина, DL-валина и D-фенилаланина. Реакция проведена в среде хлороформа при комнатной температуре в течение 48 ч. При этом с высокими выходами (66—87%) однозначно образуются продукты дивалентного замещения—диалкиловые эфиры См-дипептидов IVa-л вицинального строения, что указывает на отсутствие изомеризации соединений IIa-в в галогенангидриды α-галогенкарбоновых кислот [9], т. е. реакция протекает первоначальной атакой мононуклеофила на α-углеродный атом IIa-в и вторичной атакой на β-углеродный атом образуются соединения IVa-л.

- IIa. $X = \text{CCl}_3$, $Y = \text{Cl}$; б. $X = \text{CCl}_2\text{Br}$, $Y = \text{Cl}$; в. $X = \text{CClBr}_2$, $Y = \text{Br}$;
 IVa. $X = \text{CCl}_3$, $R = \text{CH}_3$, $R' = \text{C}_2\text{H}_5$; 6. $X = \text{CCl}_2\text{Br}$, $R = \text{CH}_3$, $R' = \text{C}_2\text{H}_5$;
 в. $X = \text{CClBr}_2$, $R = \text{CH}_3$, $R' = \text{C}_2\text{H}_5$; г. $X = \text{CCl}_3$, $R = (\text{CH}_2)_3$, $R' = \text{CH}_3$;
 д. $X = \text{CCl}_2\text{Br}$, $R = (\text{CH}_2)_3$, $R' = \text{CH}_3$; е. $X = \text{CClBr}_2$, $R = (\text{CH}_2)_3$, $R' = \text{CH}_3$;
 ж. $X = \text{CCl}$, $R = \text{CHCH}(\text{CH}_3)_2$, $R' = \text{CH}_3$; з. $X = \text{CCl}_2\text{Br}$, $R = \text{CHCH}(\text{CH}_3)_2$, $R' = \text{CH}_3$;
 и. $X = \text{CCl}_3$, $R = \text{CHCH}_2\text{C}_2\text{H}_5$, $R' = \text{CH}_3$; к. $X = \text{CCl}_2\text{Br}$, $R = \text{CHCH}_2\text{C}_2\text{H}_5$, $R' = \text{CH}_3$;
 л. $X = \text{CClBr}_2$, $R = \text{CHCH}_2\text{C}_2\text{H}_5$, $R' = \text{CH}_3$

Изучено, влияние замены атомов хлора на бром у β -углеродного атома и в тригалогенметильной группе IIa-в на выходы целевых продуктов. IVa-л. Установлено, что в обоих случаях ввод атома брома приводит к повышению выходов IVa-л (табл.). Этот факт у β -углеродного атома можно объяснить легкостью удаления иона брома (схема), т. к. его основность меньше основности иона хлора.

Ранее по данным рентгенструктурного анализа модельного 1,1,3,3,3-пентахлорпропиленоксида IIa нами было установлено, что имеет место отклонение длин связей, особенно связи $\text{C}_{(a)}-\text{O}$ (на 0,06 Å длиннее) от стандартных значений длин связей в эпоксидном цикле, что обусловлено влиянием природы заместителей на геометрию трехчленных колец [10]. В тригалогенметильной группе при замене атома хлора на бром, по всей вероятности, связь $\text{C}_{(a)}-\text{O}$ удлинена (схема), следовательно, ослаблена больше по сравнению с той же связью в 1,1,3,3,3-пентахлорпропиленоксиде, т. к.—I атома брома меньше—I атома хлора, что в конечном итоге приводит к большей реакционной способности пентагалогенпропиленоксидов, содержащих в тригалогенметильной группе атомы брома.

Структура синтезированных соединений подтверждена ИК и ПМР спектральными методами.

Таким образом, на основании проведенных исследований нами предлагается одностадийный способ синтеза потенциально биологически активных диалкиловых эфиров См-дипептидов.

Экспериментальная часть

ИК спектры сняты на спектрофотометре «UR—20» в вазелиновом масле, спектры ПМР—на спектрометре «Tesla BS—497» с рабочей частотой 100 МГц, внутренний стандарт—ГМДС, растворитель— CDCl_3 .

Для ТСХ использованы пластинки «Silufol UV-254», элюент+—ацетон-эфир (2:3) и уксусная кислота-вода (4:6).

Гидрохлориды алкиловых эфиров глицина, β -аланина, DL-валина, D-фенилаланина синтезированы по методике [11].

Диалкиловые эфиры См-дипептидов IVa-л. Смесь 0,0044 моля пентагалогенпропиленоксида IIa-в и 0,00176 моля алкилового эфира аминокислоты в 30 мл хлороформа оставляют при комнатной температуре в течение 48 ч. Образовавшийся осадок отфильтровывают, фильтрат промывают 0,1 н раствором HCl (3×20), водой (3×20) и сушат сульфатом натрия. Растворитель отгоняют, остаток перекристаллизовывают

Таблица

Выходы, физико-химические константы и данные элементного анализа соединений IVа-л

Соедине- ния	X	R	R'	Выход %	Т. пл., °С	R _f	Найдено, %			Брутто- формула	Вычислено, %		
							С	Н	N		С	Н	N
IVа	CCl ₃	CH ₂	C ₂ H ₅	66,6	90—91	0,50	36,45	4,44	7,81	C ₁₁ H ₁₇ N ₂ O ₃ Cl ₃	36,31	4,68	7,70
IVб	CCl ₂ Br	CH ₂	C ₂ H ₅	87,8	84—85	0,42	32,54	4,02	6,33	C ₁₁ H ₁₇ N ₂ O ₃ BrCl ₂	32,35	4,17	6,86
IVв	CClBr ₂	CH ₂	C ₂ H ₅	70,6	87—88	0,55	29,24	3,85	6,24	C ₁₁ H ₁₇ N ₂ O ₃ Br ₂ Cl	29,17	3,76	6,19
IVг	CCl ₃	(CH ₂) ₂	CH ₃	74	98	0,78	36,01	4,31	7,48	C ₁₁ H ₁₇ N ₂ O ₃ Cl ₃	36,31	4,68	7,70
IVд	CCl ₂ Br	(CH ₂) ₂	CH ₃	74,3	95	0,79	32,55	4,28	6,66	C ₁₁ H ₁₇ N ₂ O ₃ BrCl ₂	32,35	4,17	6,86
IVе	CClBr ₂	(CH ₂) ₂	CH ₃	81,6	92—93	0,80	29,11	3,54	6,28	C ₁₁ H ₁₇ N ₂ O ₃ Br ₂ Cl	29,17	3,76	6,19
IVж	CCl ₃	CHCH(CH ₃) ₂	CH ₃	75	117—118	0,68	43,41	5,18	6,51	C ₁₅ H ₂₃ N ₂ O ₃ Cl ₃	43,11	5,51	6,71
IVз	CCl ₂ Br	CHCH(CH ₃) ₂	CH ₃	79,4	111—112	0,65	39,01	4,71	6,25	C ₁₀ H ₂₃ N ₂ O ₃ BrCl ₂	38,96	4,98	6,06
IVи	CCl ₃	CHCH ₂ C ₆ H ₅	CH ₃	71,8	142	0,76	53,68	4,61	5,54	C ₂₃ H ₂₇ N ₂ O ₃ Cl ₃	53,54	4,85	5,43
IVк	CCl ₂ Br	CHCH ₂ C ₆ H ₅	CH ₃	76,5	138	0,72	49,55	6,33	5,27	C ₂₃ H ₂₅ N ₂ O ₃ BrCl ₂	49,29	4,64	5,00
IVл	CClBr ₂	CHCH ₂ C ₆ H ₅	CH ₃	77	121—123	0,77	45,58	4,25	4,71	C ₂₃ H ₂₇ N ₂ O ₃ Br ₂ Cl	45,66	4,14	4,83

ют из петролейного эфира или нонана и получают соединения IVa-г (табл.). ИК спектр, ν , см^{-1} для IVa: 1690 ($\text{CO}_{\text{амид}}$), 1740 ($\text{CO}_{\text{эфир}}$), 3300—3200 (NH). Спектр ПМР, (CDCl_3), δ , м.д., 1,3 т (CH_3), 2,2 д (CH_2), 2,7 д (CH_2), 3,2 с (CH), 4,2 к (CH_2), 7,4 с (NH).

ЛИТЕРАТУРА

1. Greenstein J. P., Wintz M. — Chemistry of the Amino acids, John Wiley and Sons, New York, 1961, v. 3, p. 2548.
2. Diemann K., Lioret C., Asselineau — Bull. Soc. Chim. Biol., 1960, v. 42, p. 979.
3. Goldmann A., Thomas D. W., Morel C. — C. R. Acad. Sci. Ser. D., 1969, v. 268, p. 852.
4. Takahashi Y., Naganawa H., Takita T. — J. Antibiot., 1976, v. 29, p. 1120.
5. Sangster A. W., Thomas S. E., Tingling N. L. — Tetrah., 1975, v. 31, p. 1135.
6. Miyazawa T. — Bull. Chem. Soc. Jpn., 1980, v. 53, № 9, p. 2555.
7. Miyazawa T. — Bull. Chem. Soc., Jpn., 1980, v. 53, № 12, p. 3661.
8. Гукасян А. О., Гукасян Н. Т., Галстян Л. Х., Аветисян А. А. — Арм. хим. ж., 1992, т. 45, № 1—2, с. 79.
9. Шахнizarян Г. М. — Молекулярные перегруппировки при окислении галондипиновых соединений. Автореферат дисс. на соиск. уч. ст. доктора хим. наук, Ереван, 1979, с. 38.
10. Гукасян А. О., Галстян Л. Х., Аббас Ш. С., Аветисян А. А., Карапетян А. А., Антипин М. Ю., Стручков Ю. Т. — Арм. хим. ж., 1990, т. 43, № 1, с. 33.
11. Гринштейн Дж., Виниц М. — Химия аминокислот и пептидов. М. Мир, 1965, с. 425.

Химический журнал Армении, т. 49, № 1—3, стр. 120—124 (1996 г.)

УДК 615.31+547.811.1+547.7.891.1

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ГЕТЕРОЦИКЛЫ СИНТЕЗ НЕКОТОРЫХ ОКСАДИАЗОЛИЛИЗОХРОМАНОВ И 1,4-БЕНЗОДИОКСАНОВ

А. Г. САМОДУРОВА, С. О. ВАРТАНЯН и Э. А. МАРКАРЯН

Институт тонкой органической химии им. А. Л. Миджояна НАН РА, Ереван

Поступило 20 IV 1993

Поиск биологически активных веществ, действующих на различные типы адренорецепторов, привел к синтезу новых производных изохромена и 1,4-бензодиоксана, связанных с разнообразными азот- и кислородсодержащими пятичленными гетероциклическими остатками [1, 2], проявляющими α_2 -адреноблокирующую активность. В продолжение этих исследований нами синтезированы соединения с оксадиазольным кольцом в положении 1 изохромена и в положении 2 1,4-бензодиоксана.