МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ЛАКТОНОВ ПРИ
ЭМУЛЬСИОННОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ СТИРОЛА.
II. ИНИЦИАТОР – ПЕРСУЛЬФАТ КАЛИЯ

А. С. ХАЧАТРЯН, Дж. Д. ГРИГОРЯН, Р. С. АРУТЮНЯН и Н. М. БЕЙЛЕРЯН

Ереванский государственный университет

Поступило 22 V 1996

Изучено влияние ненасыщенных лактонов (2-аллил-2-карбэтокси-4-бутенолид и 3-циано-4,5,5-триметил- Δ^3 -бутенолид) на кинетику эмульсионной полимеризации стирола с применением в качестве инициатора персульфата калия. Показано, что с ростом концентрации лактонов скорость полимеризации и средние молекулярные массы полистирола уменьшаются. Установлено, что лактоны участвуют в стадиях роста и передачи цепи и не участвуют в стадии иницирования. Кинетические закономерности объясняются, учитывая возможности реакции, протекающие в водной среде.

Рис. 2, библиографических ссылок 14.

Ранее нами были изучены кинетические закономерности эмульсионной полимеризации (ЭП) стирола в присутствии ненасыщенных лактонов (2-аллил-2-карбэтокси-4-бутенолид-АЛ и 3-циано-4,5,5-триметил- Δ^3 -бутенолид-ЦЛ) с применением масло-растворимого инициатора – динитрила азобисизомаасляной кислоты (ДЛК) [1].

Данная работа посвящена изучению кинетических закономерностей ЭП стирола в присутствии указанных лактонов, иницированного водорастворимым инициатором – персульфатом калия (ПК).

Кинетика ЭП стирола изучена методом дилатометрии [2], соотношение фаз вода:стирол = 2:1. Средние молекулярные массы (СММ) полистирола определены вискозиметрически, расчеты проводились по известной формуле [3]:

$$[\eta] = 1,23 \cdot 10^{-4} M^{0,74}$$

Спектральные исследования образцов полистирола проводились на спектрометре "UR-20".

В качестве эмульгатора применялся алкисульфонат натрия среднего состава $C_{15}H_{31}SO_3Na$ (ПДСН), очищенный согласно [4]. Синтезированные и очищенные лактоны были предоставлены кафедрой органической химии ЕГУ. Стирол и ПК очищались согласно [2].

Полученные экспериментальные данные указывают на то, что механизм действия лактонов на кинетику ЭП стирола во многом обусловлен природой инициатора. Как было установлено нами [1], в случае с ДАК с ростом концентрации лактонов скорость ЭП (W_n) и СММ полистирола проходят через максимум. Однако в случае ПК с увеличением концентрации изученных лактонов W_n и СММ уменьшаются (рис.1) и, начиная с концентрации лактона 2-3%, W_n и СММ изменяются незначительно. Математическая обработка кривых зависимости $W_n = f[L]$ приводит к следующей эмпирической зависимости:

$$W_n = W_{n_0} - \frac{a[L]}{[L] + b}, \quad (1)$$

где для АЛ значения a и b соответственно равны 0,3 и 1,3, а для ЦЛ — 0,4 и 0,5.

Изучение зависимости W_n от концентрации ПК показало, что с увеличением концентрации ПК W_n увеличивается (рис.2). В случае ЦЛ, начиная с концентрации ПК 0,012 моль/л, W_n практически не изменяется. Подобная закономерность установлена в работе [2] (при ЭП стирола в присутствии аминов) и в [5] (при ЭП хлоропрена), что объясняется либо обрывом в водной фазе через первичные радикалы [2], либо насыщенностью адсорбционных слоев ПМЧ первичными радикалами [5]. Как следует из данных рис.2, в присутствии обоих типов лактонов порядок по ПК составляет ~0,5, что находится в полном соответствии с тео-

рическими представлениями. Кинетическое уравнение W_n имеет следующий вид:

$$W_n = K[\text{ПСН}]^{0,5 \pm 0,05} [\text{ПК}]^{0,5 \pm 0,05} [C] - \frac{a|L|}{[L] + b}, \quad (2)$$

где $[C]$ — концентрация стирола.

Из температурной зависимости скорости ЭП определены $E_{\text{эф}}$ и предэкспоненциальный множитель (A). В присутствии ЦЛ они соответственно равны 70 кДж/моль и $2,6 \cdot 10^{10} \text{ моль/л}\cdot\text{с}$, а в присутствии АЛ — 71 кДж/моль и $4,9 \cdot 10^{10} \text{ моль/л}\cdot\text{с}$ (в отсутствие лактонов $E_{\text{эф}} = 71 \text{ кДж/моль}$) и практически не зависит от природы лактонов.

Для объяснения полученных кинетических закономерностей были изучены некоторые стадии полимеризации.

В первую очередь нами изучена стадия инициирования, т.к. в литературе отсутствуют какие-либо данные о взаимодействии изученных нами лактонов с ПК. Влияние лактонов на стадию инициирования было изучено методом ингибиторов [6]. Кроме того, непосредственная реакция ЦЛ + ПК изучалась йодометрически. Было выяснено, что практически отсутствует биомолекулярная реакция ПК + лактон, т.е. изученные лактоны не влияют на стадию инициирования.

В молекулах лактонов имеются ненасыщенные связи и, естественно, они могут сополимеризоваться [7].

Из кинетических и спектроскопических исследований выяснено следующее: при полимеризации стирола в массе в присутствии лактонов последние практически не влияют на скорость процесса и на СММ полистирола, т.е. лактон практически не участвует в процессе полимеризации стирола в массе. Однако при ЭП картина иная. Исследования показали, что независимо от природы лактона в макромолекулах полистирола присутствует лактоновое кольцо. В случае АЛ двойная связь $\text{СН}=\text{СН}_2$ раскрыта (она имеет максимум поглощения при 1640 см^{-1} и практически отсутствует в полистироле), а лактоновое кольцо сохраняется независимо от природы лактона.

Лактоны, как и любой компонент эмульсионной полимеризационной системы, распределяются в трех зонах: в водной фазе, поверхностном слое и объеме ПМЧ. Необходимо подчеркнуть, что растворимость лактонов в водной фазе, по сравнению с

растворимостью в мономерной фазе, мала. С увеличением растворимости лактона между этими тремя зонами практически одновременно устанавливается равновесие. Полученные нами экспериментальные данные позволяют заключить, что акт

($L_{с\lambda}$ – молекулы лактона в поверхностном слое ПМЧ) протекает в поверхностном слое, который по своим свойствам отличается от мономерной фазы [8,9]. Как известно [9,10], с увеличением доли этого слоя в ПМЧ скорость полимеризации или окисления в эмульсиях увеличивается.

Из полученных экспериментальных данных вытекает также, что лактоны могут быть передатчиками полимерной цепи, т.к. они действуют на среднюю степень полимеризации ($\bar{P}$). Из зависимости $1/\bar{P}$ от соотношения $[L]/[M]$ определены константы передачи цепи через молекулу лактона. Для ЦЛ она равна $5,0 \cdot 10^{-4}$, а для АЛ – $2,3 \cdot 10^{-4}$.

Однако, как будет показано в дальнейшем, участие лактона в акте передачи цепи не является единственной причиной уменьшения СММ. Во всяком случае, W_n и СММ симбатно изменяются с ростом концентрации лактонов. Процесс передачи также протекает в поверхностном слое ПМЧ и, естественно, после насыщения этого слоя лактоном дальнейшее уменьшение СММ от роста концентрации лактона практически не должно наблюдаться, что подтверждается экспериментом (рис.1).

Рис.1. Зависимость скорости ЭП стирола (1,3) и СММ полистирола (2,4) от концентрации ЦЛ (1,2) и АЛ (3,4). $[PK] = 0,006$ моль/л. $T = 313^{\circ}K$.

Нами установленное различие в кинетике ЭП стирола, инициированной водо- и маслорастворимыми инициаторами, по-видимому, связано с различной природой инициатора. ДАК разлагается, в основном, в мономерной фазе, а ПК – в водной. В случае последнего следует учитывать реакции, которые могут протекать в водной фазе:

Поскольку лактоны обладают определенной растворимостью в воде, возможно протекание следующих реакций:

C_n и L_n — молекулы стирола и лактона, растворенные в воде.

В первом приближении предполагалось, что лактоновый радикал (L^*) пассивен (из литературы известно [12,13], что радикалы в водной среде очень пассивны) и, входя в ПМЧ, участвуют только в актах обрыва полимерной цепи.

Гибель макрорадикалов в ПМЧ происходит в основном по квадратичному механизму (рис.2). Следовательно, учитывая и (7), имеем:

$$K_1[R_o^*][C_n] - K_3[R^*][L_n] - K_{об}[R^*]^2 = 0, \quad (8)$$

где $K_{об}$ — константа скорости обрыва в ПМЧ. $[R_o^*]$ можно определить из следующего соотношения:

$$W_{ин} - K_1[R^*][C_n] - K_2[R_o^*][L_n] = 0. \quad (9)$$

Из (8) и (9) получим:

$$[R^*]_{ст} = \frac{-K_3[L_n] \pm \left\{ (K_3[L_n])^2 + 4K_{об} \frac{K_1[C_n]W_{ин}}{K_1[C_n] + K_2[L_n]} \right\}^{1/2}}{2K_{об}} \quad (10)$$

Из двух возможных значений $[R^*]_{ст}$ рассмотрим случай, когда второе слагаемое положительно. Тогда очевидно, что при

$[L_n] = 0$ $[R^*]_{ст} = \left(\frac{W_{ин}}{K_{об}} \right)^{1/2}$. Так как концентрация стирола примерно

на 2 порядка больше концентрации лактона, то лактон рассматривается в качестве добавки. Скорость ЭП пропорциональна $[R^*]_{ст}$ и концентрации мономера (в данном случае стирола — C) [14], следовательно:

$$W_n = K_p [C] \left[\frac{\left\{ (K_3 [L_B])^2 + 4K_{OG} \frac{K_1 [C_B] W_{III}}{K_1 [C_B] + K_2 [L_B]} \right\}^{1/2} - K_3 [L_B]}{2K_{OG}} \right] \quad (11)$$

Рассмотрены следующие частные случаи:

1. В отсутствие лактона ($[L_B] = 0$), получим:

$$W_n = K_p [C] (W_{III} / K_{OG})^{1/2} \quad (12)$$

2. В присутствии лактона. В этом случае с увеличением его концентрации W_n , согласно (11), уменьшится. Однако концентрация лактона в воде имеет предельное значение и, следовательно,

Рис.2. Зависимость скорости ЭП стирола от концентрации ПК в степени 0,5 в присутствии АЛ (1) и ЦЛ (2). $[L] = 5\%$, $T = 313^\circ K$.

начиная с этой концентрации "насыщения", дальнейшее изменение W_n должно быть незначительно, что и наблюдается экспериментально (рис.2). Ввиду того, что растворимость ЦЛ в воде больше, чем

АЛ, то количество ЦЛ и его радикалов, участвующих в актах (6,7), больше по сравнению с АЛ, а значит и уменьшение W_n должно быть более значительно, что также соответствует нашим наблюдениям.

ՍՏԵՐԱԼԻ ԷՄՈՒԼՍԻՈՆ ԳՈՒԼՍԵՐՄԱՆ ՎՐԱ ԼԱԿՏՈՆՆԵՐԻ

ԱՉԳԵՑՈՒԹՅԱՆ ՍԵԽԱՆԻՉՈՒՐ:

Ո. ՀԱՐՈՒՅԻՉ ԿԱԼԻՈՒՄԻ ԳԵՐՍՈՒՆԵԱՏ

Ա. Ս. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ, Ջ. Դ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ,

Ռ. Ս. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ և Ե. Մ. ԲԵՅԼԵՐՅԱՆ

Ուսումնասիրվել է չհազեցած լակտոնների (2-ալիլ-2-կարբէթօքսի-4-բուտենոլիդ և 3-ցիան-4,5,5-տրիմեթիլ- Δ^3 -բուտենոլիդ) ազդեցությունը սաիրոլի էմուլսիոն պոլիմերման կինետիկայի վրա՝ որպես հարուցիչ օգտագործելով կալիումի պերսուլֆատը: Յույց է տրված, որ լակտոնների կոնցենտրացիայի աճին զուգընթաց փոքրանում են պոլիմերման արագությունը և պոլիսաիրոլի միջին մոլեկուլային գանգվածը: Լակտոնները մասնակցում են շղթայի աճի և փոխանցման փուլերին

և չեն մասնակցում հարուցմանը: Կինետիկական օրինաչափությունները բացատրվում են, հաշվի առնելով այն հնարավոր ունակցիաները, որոնք ընթանում են ջրային միջավայրում:

MECHANISM OF LACTONES ON EMULSION POLYMERIZATION OF STYRENE. II. POTASSIUM PERSULFATE AS INITIATOR

A. S. KHACHATRIAN, G. D. GRIGORIAN,
R. S. HAROUTIOUNIAN and N. M. BEYLERIAN

The influence of unsaturated lactones (2-allyl-2-carboxy-4-butenolide and 3-cyano-4,5,6-trimethyl- Δ^1 -butenolide) on styrene emulsion polymerization kinetics has been studied. Potassium persulfate has been used as initiator. It has been shown that with the increase of lactones initial concentration both the polymerization rate and the mean molecular weight decrease. The lactones participate in the acts of chain growth and chain transfer, but do not participate in the initiation act. Kinetic regularities can be explained considering the reactions which take place in water phase.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Խաչատրյան Ա.Տ., Գրիգորյան Ժ.Ժ., Արուտյոնյան Բ.Տ., Բեյլերյան Ն.Մ.* – Механизм действия лактонов при эмульсионной полимеризации стирола. II. Инициатор – динитрил азоизомасляной кислоты. Рук. деп. в АрмНИИНТИ 25.12.1995.
2. *Բեյլերյան Ն.Մ., Գրիգորյան Ժ.Ժ.* – ВМС, 1974, №7, с.540.
3. *Липатов Ю.С., Нестеров А.Е., Гриценко Т.М., Веселовский Р.А.* – Справочник по химии полимеров. К., Наукова думка, 1971, с.117.
4. *Неволин Ф.В.* – ЖВХО, 1966, т.11, №4, с.445.
5. *Мелконян А.Г.* – Арм. хим.ж., 1966, т.19, №5, с.338.
6. *Эмануэль Н.М., Денисов Е.Т., Майзус З.К.* – Цепные реакции окисления углеводородов в жидкой фазе. М., Наука, 1965 с.274.
7. *Меликян Г.С.* – Исследования в области ненасыщенных γ -лактонов. Автореферат дисс.на соиск.уч.ст.канд.хим.наук, Ереван, 1972.
8. *Русанов А.И.* – Фазовые равновесия и поверхностные явления. Л., Химия, 1967, с.206, 367.
9. *Адамсон А.* – Физическая химия поверхностей. М., Мир, 1979, с.401.
10. *Արուտյոնյան Բ.Տ., Նալբանդյան Ժ.Մ., Բեյլերյան Ն.Մ.* – Кин. и кат., 1985, т.26, №6, с.1475.
11. *Արուտյոնյան Բ.Տ., Բեյլերյան Ն.Մ.* – Уч.зап. ЕГУ (естеств. науки), 1982, №2, с.79.
12. *Эмануэль Н.М., Зайков Г.Е., Майзус З.К.* – Роль среды в радикально-цепных реакциях окисления органических соединений. М., Наука, 1973 с.167.
13. *Еголян Р.В.* – Свободно-радикальная полимеризация винилацетата в водно-органических бинарных растворителях. Автореферат дисс. на соиск. уч.ст.канд.хим.наук, Ереван, 1975.
14. *Smith W.V., Ewart R.H.* – J. Chem.Phys., 1948, v.16, №3, p.592 .