Надо отметить, что, согласно литературным данным [8], β-гидроксиэтилбензалимин находится в линейной форме, и как показали наши исследования (ПМР), эта форма не меняется в зависимости от природы используемого амина. Очевидно, что амбидентность иминов I объяснить таутомерией невозможно. На наш взгляд, полученные данные объясняются тем, что комплексы, образующиеся при взаимодействии пиридина (относительно слабого основания) с хлорангидридами являются, по-видимому, мягкой кислотой и поэтому должны реагировать с атомом азота, являющимся более мягким основанием по сравнению с атомом кислорода. В случае же относительно сильного основания — триэтиламина, образуется жесткая кислота и она должна реагировать с жестким основанием — атомом кислорода.

При справедливости наших предположений при взаимодействии иминов I с уксусным ангидридом должно происходить N-ацилирование, поскольку ангидрид является мягкой кислотой.

Проведенные исследования показали, что, действительно, в результате взаимодействия указанных иминов с уксусным ангидридом получают продукты только N-ацилирования. Более того, в присутствии и пиридина, и триэтиламина, не образующих устойчивых комплексов с ангидридами, получают те же продукты.

Экспериментальная часть

ПМР спектры сняты на приборе "Perkin-Elmer R 12B" (60 МГц) в CCl_4 , в качестве стандарта использован ТМС, а также на приборе "Bruker" AC-200 в CDCl_3 .

Взаимодействие иминов Ia,б с хлорангидридами в присутствии пиридина. К смеси 0,05 моля шиффового основания Ia,б в 30 мл бензола и 25 мл сухого пиридина при температуре 0-5°C и непрерывном перемешивании прибавляют в течение 1,5 ч

Выходы, физико-химические константы и данные ПМР спектров N-ацил-2-фенил-1,3-оксазолидинов (II а-в) и N-ацил-2-фенил-1,3-оксазинов (II г-е)

Соединение	II	R	Выход, %	Т. кип., °С/мм	П _Д ²⁰	Найдено, %	Вычислено, %	Данные ПМР спектров, δ, м.д.
						N	N	
II а	2	CH ₃	74	143-145/1	1,5400	—	—	1,58 с и 1,87 с (3H, CH ₃), 3,41 м и 3,78 м (2H, CH ₂ -N) и (2H, CH ₂ -O), 5,84 с и 6,13 с (1H, CHC ₆ H ₅), 7,09-7,19 м (5H, C ₆ H ₅)
II б	2	C ₂ H ₅	51	142-143/0,5	1,5370	6,42	6,85	1,11 д.т. (3H, CH ₃ , J=4 Гц), 2,15 д.кв. (2H, CH ₂ -CH ₃ , J=4 Гц), 3,33-4,31 м (4H, CH ₂ -CH ₂), 6,26ш (1H, CHC ₆ H ₅), 7,33 м (5H, C ₆ H ₅)
II в	2	C ₆ H ₅	75	193-195/1	1,5860	5,92	6,38	3,31-4 м (4H, -CH ₂ -CH ₂), 6,26 с (1H, CHC ₆ H ₅), 7,22 м (10H, 2C ₆ H ₅)
II г	3	CH ₃	80	140/1	1,5442	6,71	6,85	1,75-2,13 м (2H, -CH ₂ -CH ₂ -), 2,0 с (3H, CH ₃), 2,44-3,4м и 3,77-4,13 м (2H, O-CH ₂), 3,5-4,1 д.д. (2H, CH ₂ -N), 6,55 ш (1H, CHC ₆ H ₅), 7,22 м (5H, C ₆ H ₅)
II д	3	C ₂ H ₅	67	158-160/2	1,5382	5,92	6,38	1,29 т (3H, CH ₃ , J=4 Гц), 1,52-2,17 м (2H, CH ₂ -CH ₂ -CH ₂), 2,4 кв. (2H, CH ₂ CH ₃ , J=4 Гц), 2,88-3,51 м и 4,04-4,48 м (2H, CH ₂ -O), 3,73-4,04 д.д. (2H, CH ₂ -N), 6,71 ш (1H, CHC ₆ H ₅), 7,37 м (5H, C ₆ H ₅)
II е	3	C ₆ H ₅	61	т. пл. 121	—	5,82	5,24	1,09-2,41 м (2H, CH ₂ -CH ₂ -CH ₂), 2,78-3,36 д.т. и 4,11-4,55 д.м. (2H, CH ₂ -O), 6,56ш.с. (1H, CHC ₆ H ₅), 3,58-3,83 д.д. (2H, CH ₂ -N), 7,11-7,45 м (10H, 2C ₆ H ₅)

Выходы, физико-химические константы и данные ПМР спектров сложных эфиров (III а-е)

Соединение	II	R	Выход, %	Т. кип., °C/мм	n _D ²⁰	Найдено, %	Вычислено, %	Данные ПМР спектров, δ, м.д.
						N	N	
III а	2	CH ₃	75	118-120/1,5	1,5265	6,92	7,38	1,96 с (3H, CH ₃); 3,77 т (2H, CH ₂ -N, J=5,2 Гц); 4,24 т (2H, CH ₂ -O, J=5,2 Гц); 7,24-7,82 д.м. (5H, C ₆ H ₅); 8,13 с (1H, CH=N)
III б	2	C ₂ H ₅	53	125-128/1,5	1,5260	6,37	6,85	1,02 т (3H, CH ₃ , J=6 Гц); 2,2 кв (2H, CH ₂ -CH ₃ , J=6 Гц); 3,69 т (2H, N-CH ₂ , J=4 Гц); 4,31 т (2H, O-CH ₂ , J=4 Гц); 7,2-7,73 д.м. (5H, C ₆ H ₅); 8,17 с (1H, CH=N)
III в	2	C ₆ H ₅	84	180-182/1,5	1,5750	5,12	5,53	3,77т (2H, CH ₂ -N, J=5,2 Гц); 4,49т (2H, CH ₂ -O, J=5,2 Гц); 7,04-8 м (10H, 2C ₆ H ₅); 8,17 с (1H, CH=N)
III г	3	CH ₃	62	139/3	1,5270	6,40	6,85	1,93 с (3H, CH ₃); 1,62-2,08 м (2H, CH ₂ -CH ₂ -CH ₂); 3,66 т (2H, N-CH ₂ , J=5,3 Гц); 4,06 т (2H, O-CH ₂ , J=5,3 Гц); 7,08-7,84 д.м. (5H, C ₆ H ₅); 8,13 с (1H, CH=N)
III д	3	C ₂ H ₅	77	136-140/2	1,5256	5,92	6,38	1,15т (3H, CH ₃ , J=6 Гц); 2,26кв (2H, CH ₂ -CH ₃ , J=6 Гц); 1,91м (2H, CH ₂ -CH ₂ -CH ₂); 3,69т (2H, CH ₂ -N, J=4 Гц); 4,17 т (2H, CH ₂ -O, J=4 Гц); 7,22-7,8 д.м. (5H, C ₆ H ₅); 8,22 с (1H, CH=N)
III е	3	C ₆ H ₅	70	194/1,5-2	1,5736	6,32	5,24	1,93-2,35 к (2H, CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ , J=6,6 Гц); 3,71 т (2H, N-CH ₂ , J=6,6 Гц); 4,4 (2H, CH ₂ -O, J=6,6 Гц); 7,13-8,15 м (10H, 2C ₆ H ₅); 8,26 с (1H, CH=N)

0,07 моля хлорангидрида, после чего перемешивание при той же температуре продолжают еще 2 ч. На следующий день смесь выливают в холодную воду, экстрагируют хлороформом, экстракт промывают водой, сушат $MgSO_4$ и после удаления растворителя остаток перегоняют под вакуумом. Физико-химические данные и выходы продуктов указаны в табл. 1.

Взаимодействие имина Ia,б с хлорангидридами в присутствии триэтиламина. К 0,05 моля имина Ia,б в 30 мл бензола с 25 мл сухого триэтиламина прибавляют при 0-5°C при перемешивании 0,07 моля хлорангидрида в течение 1,5 ч, после чего перемешивание при той же температуре продолжают еще 2 ч. На следующий день отфильтровывают выделившуюся соль, промывают ее абсолютным эфиром. Из фильтрата удаляют растворители, остаток перегоняют под вакуумом. Физико-химические данные и выходы продуктов приведены в табл. 2.

Взаимодействие β -гидроксиэтилбензалимина (Ia) с уксусным ангидридом. К 0,03 моля имина Ia в 15 мл бензола при охлаждении холодной водой добавляют по каплям 4,1 г (0,04 моля) уксусного ангидрида, после чего смесь перемешивают при комнатной температуре еще 2 ч. После отгонки растворителя и перегонки получают 4,88 г (85%) оксазолидина IIa с т.кип. 141-142°C/1,5 мм, n_D^{20} 1,5385 [9].

Взаимодействие γ -гидроксипропилбензалимина (Iб) с уксусным ангидридом. Аналогичным образом из имина Iб получают 4,92 г (80%) N-ацил-2-фенил-1,3-оксазина (IIб) с т.кип. 140°C/1 мм, n_D^{20} 1,5442.

ЛИТЕРАТУРА

1. Uray Y., Ziegler E. — Z. Naturforsch, 1975, v.30 b(2), p.245.
2. Cusman M., Gentry J. and Dekow F.W. — J. Org. Chem., 1977, v.42, p.1111.
3. Astudillo M.E. Alva, Chokotho N.C., Jarvis T.C., Jonson C.D., Lewis C.C. and McDonnell D. — Tetrah. 1985, v.41, №24, p.5919. РЖХ, 1986, 14 ж 2.
4. Рахманкулов Д.А., Зорин В.В., Латыпова Ф.Н., Злотский С.С., Караханов Р.А. — ХГС, 1982, №4, с.435.
5. Konosu Toshiyuki, Tajima Yawara, Takeda Noriko, Miyaoka Tokeo, Kasahara Mayumi, Yaouda Hiras — Oida Sadao-Chem. and Pharm. Bull., 1990, v.38, №9, p.2476.
6. Pat. 655931 (1986), Swiss / Alig Leo, Muller Mareel — РЖХ, 1986, 24 0 86.
7. Baldwin D.E. — J. Chem. Soc., Chem. Commun., 1976, p.734.
8. Zen-inchi Horii, Tareshi Inoi — Chem. Pharm. Bull., 1965, v.13, p.1151.
9. Дашкевич А.Б., Шепель Ф.Г. — ХГС, 1965, №5, с.654.