ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ
АРМЕНИЯ

Հայաստանի քիմիական հանդես 55, №1-2, 2002 Химический журнал Армении

УДК 547.841.07+615.31

СИНТЕЗ N-АРИЛАЛКИЛЗАМЕЩЕННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 1,4-
БЕНЗОДИОКСАН-2-ИЛЭТИЛ- И МЕТИЛАМИНОВ И ИЗУЧЕНИЕ ИХ
АНТИГИПОКСИЧЕСКОГО СВОЙСТВА

С. О. ВАРТАНЯН, А. С. АВАКЯН, Э. А. МАРКАРЯН,
Э. А. ШИРИНЯН и Т. Г. ГУКАСЯН

Институт тонкой органической химии им. А. Л. Мнджояна
НАН Республики Армения, Ереван

Поступило 18 V 2000

С целью изучения биологической активности взаимодействием 1,4-бензодиоксан-2-ил-метил- и (1,4-бензодиоксан-2-ил)-1-этиламинов с нитро-, гидрокси-, ди- и триметоксибензальдегидами синтезированы основания Шиффа. Последние восстановлены боргидридом натрия до соответствующих аминов. Изучены их антигипоксические свойства.

Табл. 2, библиограф. ссылок 8.

Ранее нами был получен целый ряд биологически активных соединений, сочетающих арилалкиламинные фрагменты с разнообразными гетероциклами, в том числе и кислородсодержащими [1,2]. Среди них особый интерес представляют производные 1,4-бензодиоксана (Б. д.), многие из которых проявляют высокую биологическую активность в отношении сердечно-сосудистой системы [3,4]. Исходя из этого нами предпринят синтез новых производных 1,4-бензодиоксана XIII-XXII через имины III-XII, которые представляют также интерес с точки зрения биологической активности [5]. Синтеза их осуществлен по схеме:

$R = H, CH_3, Ar = C_6H_4 - p - NO_2, C_6H_4 - m - NO_2, C_6H_4 - p - OH, C_6H_3 - 2,4(OCH_3)_2, C_6H_2 - 2,4,5(OCH_3)_3$

Взаимодействием аминов I и II с бензальдегидами содержащими электронодонорные и электроноакцепторные заместители, получены основания Шиффа III-XII, которые являются устойчивыми кристаллическими веществами. Для получения целевых аминов XIII-XX в качестве восстановителя нами выбран боргидрид натрия, т.к. он является избирательным восстановителем.

В ИК спектрах целевых аминов XIII-XXII имеются полосы поглощения в области $1510, 1600 \text{ см}^{-1}$, характерные для ароматического кольца, 3320 см^{-1} для N-H связи и отсутствуют полосы поглощения в области $1660-1680 \text{ см}^{-1}$, характерные для C=N связи оснований Шиффа III-XII. Строение и чистота синтезированных соединений подтверждены также данными ПМР спектров и хроматографически.

Антигипоксическое свойство производных 1,4-бензодиоксана изучали на 96 белых мышах массой 23-26 г на модели нормобарической гипоксической гипоксии по [6]. Испытуемые соединения в виде взвеси (твин 80 + физ. раствор) вводились в дозе 50 мг/кг за 15 мин до воздействия однократно, внутрибрюшно в объеме $0,2 \text{ мл}$. В качестве препарата сравнения использовали известное лекарственное средство Кавинтон. Полученные данные показали, что у целевых аминов XIII-XX антигипоксические свойства выражены значительно меньше, чем у аминов III-XII. Так, соединения VIII, X, XI достоверно повышают длительность жизни животных к недостатку кислорода во вдыхаемом воздухе на 58-83%. В аналогичных условиях антигипоксическая активность кавинтона составляла 35-40%.

Экспериментальная часть

ИК спектры сняты на спектрометре "UR-20", спектры ЯМР¹H – на приборе "Varian", "Меркурий 300" с частотой 300 МГц в DMSO-d⁶ в рамках программы USCRDF RESC 17-5. ТСХ проведено на пластинках марки "Silufol-UV-254", проявитель – пары йода. Температуры плавления определены на микронагревательном столике "Бозеиус".

1,4-Бензодиоксан-2-ил метиламин (I) получен по [7] с выходом 60%.

1,4-Бензодиоксан-2-ил-1-этиламин (II) получен по [8] с выходом 75%.

Основания Шиффа III-XII. Смесь $0,01 \text{ моля}$ амина I или II с $0,01 \text{ моля}$ замещенного бензальдегида в 50 мл абс. бензола кипятят в аппарате Дина-Старка до прекращения выделения воды 8-10 ч. Отгоняют растворитель, остаток кристаллизуют из абс. эфира и перекристаллизовывают из смеси абс. бензол-абс. эфир (1:5) (табл. 1).

Таблица 1

Основания Шиффа III-XII

Соединение	R	Ar	Выход, %	Т. пл., °C	Найдено, %			Брутто-формула	Вычислено, %		
					C	H	N		C	H	N
III	H	n-NO ₂	62,1	126–	64,81	4,31	9,72	C ₁₆ H ₁₄ N ₂ O ₄	64,42	4,62	9,39
IV	H	m-NO ₂	55,6	127	64,62	4,50	9,10	C ₁₆ H ₁₄ N ₂ O ₄	64,42	4,62	9,39
V	H	n-OH	56,6	80–	64,21	5,31	5,01	C ₁₆ H ₁₅ NO ₃	64,82	5,51	5,20
VI	H	2,4(CH ₃ O) ₂	62,0	81	69,31	6,41	4,52	C ₁₈ H ₁₉ NO ₄	69,00	6,01	4,47
VII	H	2,4,5(CH ₃ O) ₃	57,2	166–	65,45	6,70	4,38	C ₁₉ H ₂₁ NO ₅	65,25	6,34	4,22
VIII	CH ₃	n-NO ₂	64,1	168	65,67	5,11	9,05	C ₁₇ H ₁₆ N ₂ O ₄	65,38	5,13	8,97
IX	CH ₃	m-NO ₂	50,0	100–	65,59	5,38	9,13	C ₁₇ H ₁₆ N ₂ O ₄	65,38	5,13	8,97
X	CH ₃	n-OH	51,0	103	71,92	5,87	5,20	C ₁₇ H ₁₇ NO ₃	72,08	6,00	4,95
XI	CH ₃	2,4(CH ₃ O) ₂	60,0	82–	65,33	6,71	4,55	C ₁₉ H ₂₁ NO ₄	69,72	6,42	4,28
XII	CH ₃	2,4,5(CH ₃ O) ₃	51,3	83	67,48	6,21	3,76	C ₂₀ H ₂₃ NO ₅	67,22	6,44	3,92
				116–							
				117							
				84–							
				85							
				183–							
				185							
				64–							
				65							
				105–							
				107							

Таблица 2

Оксалаты бензодииоксанилалкиламинов XIII-XXII

Соединение	R	Ar	Выход, %	Т. пл., °C	Найдено	Брутто-формула	Вычислено, %	R _f осн.*
					N		N	
XIII	H	n-NO ₂	50,1	193 –	8,51	C ₁₇ H ₁₇ N ₂ O ₆	8,11	0,60
XIV	H	m-NO ₂	48,2	194	8,32	C ₁₇ H ₁₇ N ₂ O ₆	8,11	0,51
XV	H	n-OH	60,0	175 –	4,52	C ₁₇ H ₁₈ NO ₅	4,46	0,42
XVI	H	2,4(CH ₃ O) ₂	50,2	176	3,58	C ₁₉ H ₂₂ NO ₆	3,88	0,47
XVII	H	2,4,5(CH ₃ O) ₃	50,0	196 –	3,38	C ₂₀ H ₂₄ NO ₇	3,20	0,61
XVIII	CH ₃	n-NO ₂	48,5	197	8,12	C ₁₈ H ₁₉ N ₂ O ₆	7,80	0,53
XIX	CH ₃	m-NO ₂	46,6	180 –	8,00	C ₁₈ H ₁₉ N ₂ O ₆	7,80	0,52
XX	CH ₃	n-OH	25,5	181	4,50	C ₁₈ H ₂₀ NO ₅	4,23	0,48
XXI	CH ₃	2,4(CH ₃ O) ₂	57,3	145 –	4,0	C ₂₀ H ₂₄ NO ₆	4,24	0,43
XXII	CH ₃	2,4,5(CH ₃ O) ₃	56,0	146	3,75	C ₂₁ H ₂₆ NO ₇	3,46	0,35
				141 –				
				142				
				169 –				
				170				
				175 –				
				176				
				131 –				
				132				
				77 –				
				78				

* R_f – бутанол-уксусная кислота-вода (5:3:3).

ПМР спектр III, δ , м.д.: 8,6 с (1H, CH=N); 8,3 д (2H, аром.), 8,0 д (2H, аром.), 6,85 с (4H, аром. Б.д.), 4,5 д (2H, O-CH₂-), 4,15 м (1H, O-CH-), 3,95 д (2H, CH₂-N). ПМР спектр IV, δ , м.д.: 8,6 с (1H, CH=N); 8,3 д (2H, аром.), 8,05 д (2H, аром.), 6,85 с (4H, аром.), 4,3 д (2H, O-CH₂-), 4,0 м (O-CH-), 3,8 т (1H, CH-N), 1,4 д (3H, CH₃).

Оксалаты бензодioxанилалкиламинов XIII-XX. К 0,01 моля основания Шиффа в 50 мл метанола при 0°C маленькими порциями прибавляют 0,05 моля боргидрида натрия. Оставляют на ночь при комнатной температуре, отгоняют растворитель. К остатку прибавляют 20 мл воды и дважды экстрагируют эфиром. Сушат сернокислым натрием, отгоняют эфир. Остаток растворяют в 50 мл абс. эфира и действием эфирного раствора безводной щавелевой кислоты получают оксалаты, которые перекристаллизовывают из ацетона (табл. 2). ПМР спектр оксалата XV, δ , м.д.: 7,3 д (2H, NH₂), 6,8 м (8H, аром.), 4,5-4,3 д (2H, CH₂-O-), 4,0 м (3H, CH₂-N и CH-O-), 3,15 м (2H, CH₂-Ar). ПМР спектр XIX, δ , м.д.: 7,7-8,35 с (4H, C₆H₄NO₂), 6,85 с (4H, аром.), 4,0-4,5 м (5H, o-CH₂-CH-O- и CH₂N), 1,3 д (4H, CH-CH₃).

**N-ԱՐԻԼԱԼԿԻԼԱՍԻՆԱԱԾԱՆՑՅԱԼՆԵՐԻ, 1,4-ԲԵՆԶՈՂԻՌՈՔՍԱՆ-2-ԻԼ
ԷԹԻԼԻ ԵՎ ՄԵԹԻԼԱՍԻՆՆԵՐԻ ՄԻՆԹԵԶԸ ԵՎ ՆՐԱՆՅ ԱՆՏԻԶԻՊՈՔՍԻԿ
ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ**

**Ս. Օ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ, Ա. Ս. ԱՎԱԳՅԱՆ, Է. Ա. ՄԱՐԿԱՐՅԱՆ,
Է. Ա. ՇԻՐԻՆՅԱՆ և Տ. Գ. ԴՈՒԿԱՍՅԱՆ**

(1,4-Բենզոդիոքսան-2-իլ)-մեթիլ և (1,4-բենզոդիոքսան-2-իլ)-1-էթիլամինների և նիտրո-, օրսի-, դի և տրիմեթօրսի բենզալդեհիդների փոխազդմամբ ստացված են Շիֆֆի հիմքեր: Վերջիններս վերականգնված են մինչև համապատասխան ամիններ: Ուսումնասիրված են նրանց անտիհիպօրսիկ հատկությունները:

**SYNTHESIS OF SOME N-ARYLALKYLSUBSTITUTED DERIVATIVES
OF 1,4-BENZODIOXAN-2-YL-ETHYL AND METHYLAMINES**

**S. O. VARTANYAN, A. S. AVAKYAN, E. A. MARKARYAN,
E. A. SHIRINYAN and T. G. GUKASYAN**

Recently we obtained a series of biologically active derivatives of 1,4-benzodioxan and many of them display activity in relation to cardiovascular system. In the present work N-arylalkylamine derivatives of 1,4-benzodioxan-2-yl-ethyl and methylamines are synthesized by us. The interaction of (1,4-benzodioxan-2-yl)-1-ethyl and (1,4-benzodioxan-2-yl)-methylamines with nitro-, hydroxy-, di- and trimethoxybenzaldehydes leads to Schiff bases, which were reduced by NaBH₄ to the corresponding amines.

Studies of antihypoxic properties of synthesized compound showed that amine oxalates did not display antihypoxic effect. Schiff bases displayed a marked antihypoxic effect.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Айрапетян Г.К., Арустамян Ж.С., Маркарян Р.Э., Арзанунц Э.М., Саркисян Л.М., Погосян А.В., Маркарян Э.А. // Хим.-фарм. ж., 1990, т.24, №55, с.33.
- [2] Маркарян Э.А., Вартамян С.О., Авакян О.М., Цатинян А.С. // Арм. хим. ж., 1975, т.28, №4, с.323.
- [3] Авакян А.С., Вартамян С.О., Маркарян Э.А. // Хим.-фарм. ж., 1988, т.22, №8, с.897.
- [4] Маркарян Э.А., Вартамян С.О., Авакян О.М. Взаимосвязь химическая структура–биологическая активность. Ереван, Изд. ООО “Апага”, 1997, с.27.
- [5] Karlap J.P., Raizon B.M. // J. Med. Chem., 1980, v.23, №6, p.702.
- [6] Ширинян Э.А., Мартиросян О.М., Арутюнян С.А., Атаян Т.К. // Физиол. журнал СССР, 1990, т.76, №9, с.1197ю
- [7] Landi-Vittory R., Marini-Bettolo G. // Croat. chem. acta, 1957, v.29, p.363. // С. А. 53, 16137d (1959).
- [8] Mlsitl D., de Marchi, Rosnati V., Bovet D.J. // Med. Pharm. chem., 1962, v.5, №6, p.1285.