ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՎԱԴԵՍԻԱ
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ
АРМЕНИЯ

Հայաստանի քիմիական հանդես 59, №4, 2006 Химический журнал Армении

УДК 541.69 + 547.435

СИНТЕЗ ГИДРОХЛОРИДОВ 1-(4-БРОМФЕНИЛ)-1-АЛКИЛ(АРИЛ)-2-(4'-ХЛОРФЕНИЛ)-3-МОРФОЛИНОПРОПАН-1-ОЛОВ

Г. А. ГЕВОРГЯН

Институт тонкой органической химии им. А.Л.Мнджояна
НАН Республики Армения, Ереван

Поступило 28 XII 2005

Аминометилированием 4-бромфенил-4'-хлорбензилкетона параформальдегидом и морфолином получен α -(4'-хлорфенил)- β -морфолино-4-бромпропиофенон. Взаимодействием последнего с различными реактивами Гриньяра получен большой ряд третичных аминоспиртов – 1-(4-бромфенил)-1-алкил(арил)-2-(4'-хлорфенил)-3-морфолинопропан-1-олов – аналогов циклодола.

Табл. 3, библиографические ссылки 4.

В продолжение наших исследований по изучению зависимости физиологической активности от структуры в ряду аминокетонов и продуктов их восстановления – аминоспиртов, нами предпринят синтез аналогов циклодола – гидрохлорида 1-фенил-1-циклогексил-3-пиперидинопропанола-1[1-3]. Несмотря на сильное центральное и периферическое холинолитическое действие циклодол оказывает нежелательные побочные действия. Ввиду этого обстоятельства создание новых избирательно действующих препаратов представляет актуальную задачу.

Нами взаимодействием α -(4'-хлорфенил)- β -морфолино-4-бромпропиофенона с различными реактивами Гриньяра осуществлен синтез 1-(4-бромфенил)-1-алкил(арил)-2-(4'-хлорфенил)-3-морфолинопропан-1-олов(2-11) и их гидрохлоридов(12-21) по схеме:

2, 12: R = C₂H₅; 3, 13: R=C₃H₇; 4,14: R=i-C₃H₇; 5, 15: R=C₄H₉;
 6,16: R=i- C₄H₉; 7, 17: R=C₅H₁₁; 8, 18: R=C₆H₁₁; 9,19: R=CH₂CH=CH₂;
 10,20: R=CH₂C₆H₅; 11,21: R=C₆H₅.

Необходимый для синтеза аминпропанолов 2-11 α-(4'-хлорфенил)-β-морфолино-4-бромпропиофенон(1) получен аминметилированием 4-бромфенил-4'-хлорбензилкетона параформом и морфолином в среде этанола [3]. Строение полученных веществ подтверждено методом спектроскопии ЯМР¹H и ¹³C (табл. 2,3). Спектры ЯМР¹H сложны из-за неэквивалентности атомов водорода морфолина и наличия заторможенных движений ввиду стерических препятствий при кватернизации атома азота. Поэтому более характерны спектры ЯМР ¹³C. Для отнесения сигналов использованы методы COSY, HMQC, ДЕРТ, а также спектры ЯМР¹³C, полученные в режиме неподавления спин-спинового взаимодействия с протонами. О биологической активности синтезированных соединений будет сообщено отдельно.

Экспериментальная часть

ИК спектры синтезированных соединений сняты на приборе «UR-20» в вазелиновом масле, спектры ЯМР¹H – на спектрометре “Mercury-300, Varian” в ДМСО-d₆; внутренний стандарт – тетраметилсилан. Индивидуальность соединений контролировали на пластинках «UV-254» в системе ацетон–гексан (3:5), проявитель – пары йода.

4-Бромфенил-4'-хлорбензилкетон. К охлажденной льдом и солью смеси 13,3 г (0,1 моля) AlCl₃ в среде 50 мл CCl₄ (или бромбензола) и 15,7 г (0,1 моля) бромбензола медленно прикапывают 18,9 г (0,1 моля) хлорангидрида 4-хлорфенилуксусной кислоты. Затем реакционную смесь нагревают на водяной бане в течение 2-3 ч. Охлаждают до комнатной температуры и содержимое выливают в подкисленную соляной кислотой ледяную воду. Отфильтровывают образовавшийся

Таблица 1

Характеристики соединений 12-21

Соеди-нение	R	Вы-ход, %	Т.пл, °С	Найдено, %				Брутто-формула	Вычислено, %			
				C	H	N	Cl		C	H	N	Cl
12	C ₂ H ₅	81	210-211	53,04	5,57	2,88	7,52	C ₂₁ H ₂₅ BrClNO ₂ ·HCl	53,07	5,51	2,95	7,46
13	C ₃ H ₇	83	190-192	54,10	5,82	2,91	7,18	C ₂₂ H ₂₇ BrClNO ₂ ·HCl	54,00	5,77	2,86	7,25
14	iC ₃ H ₇	53	182-184	54,06	5,71	2,84	7,27	C ₂₂ H ₂₇ BrClNO ₂ ·HCl	54,00	5,77	2,86	7,25
15	C ₄ H ₉	72	177-179	54,82	6,10	2,83	7,13	C ₂₃ H ₂₉ BrClNO ₂ ·HCl	54,88	6,01	2,78	7,04
16	iC ₄ H ₉	41	176-178	54,95	6,08	2,85	7,11	C ₂₃ H ₂₉ BrClNO ₂ ·HCl	54,88	6,01	2,78	7,04
17	C ₅ H ₁₁	59	193-194	55,67	6,31	2,78	6,94	C ₂₄ H ₃₁ BrClNO ₂ ·HCl	55,72	6,23	2,71	6,85
18	C ₆ H ₅	59	199-202	57,43	5,09	2,73	6,83	C ₂₅ H ₂₅ BrClNO ₂ ·HCl	57,37	5,01	2,68	6,77
19	C ₆ H ₅ CH ₂	62	246-248	58,20	5,32	2,65	6,63	C ₂₆ H ₂₇ BrClNO ₂ ·HCl	58,11	5,25	2,61	6,60
20	C ₆ H ₁₁	53	212-214	56,78	6,14	2,72	6,75	C ₂₅ H ₃₁ BrClNO ₂ ·HCl	56,72	6,09	2,65	6,70
21	CH ₂ =CH-CH ₂	42	179-180	54,31	5,43	2,93	7,33	C ₂₂ H ₂₅ BrClNO ₂ ·HCl	54,23	5,38	2,87	7,28

Спектры ЯМР ^1H соединений 12-21 в ДМСО- d_6 , δ , м.д. (J, Гц)

Соединение	
12	0,67 т (3H, J=7,2, CH ₃), 1,98 м (2H, CH ₂ CH ₃), 2,65 м (1H), 2,87-3,09 м (2H), 3,20 м (1H), 3,42 м (1H), 3,70 ш.д (1H, J=12,5), 3,79-4,07 м (5H), 5,25 ш (1H, OH), 6,95 м (4H, H _{Ar}), 7,13 м (2H, H _{Ar}), 7,29 м (2H, H _{Ar}), 12,02 ш (1H, HCl),
13	0,82 м (1H) и 1,39 м (1H, CH ₂ CH ₃), 0,84 м (3H, CH ₃), 1,90 м (2H, CH ₂), 2,65 м (1H), 2,86-3,07 м (2H), 3,19 м (1H), 3,42 ш.д (1H, J=12,0), 3,70 ш.д (1H, J=12,5), 3,76-4,07 м (5H), 5,29 ш (1H, OH), 6,95 ш.д (4H, J=8,5, H _{Ar}), 7,14 м (2H, H _{Ar}), 7,28 м (2H, H _{Ar}), 12,03 ш (1H, HCl),
14	0,61 д (3H, J=6,6, CH ₃), 1,20 д (3H, J=6,6, CH ₃), 2,00 сп (1H, J=6,6, CH), 2,55 м (1H), 2,88-3,11 м (3H), 3,32-3,50 м (2H), 3,64-4,05 м (4H), 4,23 ш.д (1H, J=7), 5,08 ш (1H, OH), 7,01 ш (4H, H _{Ar}), 7,20 ш.д (2H, J=8,5, H _{Ar}), 7,32 ш.д (2H, J=8,5, H _{Ar}), 11,98 м (1H, HCl),
15	0,75 м (1H) и 1,35 м (1H, CH ₂), 0,83 т (3H, J=7,2, CH ₃), 1,24 м (2H, CH ₂), 1,92 м (2H, CH ₂), 2,65 м (1H), 2,86-3,07 м (2H), 3,17 м (1H), 3,42 м (1H), 3,66-4,06 м (6H), 5,27 ш (1H, OH), 6,94 ш.д (4H, J=8,5, H _{Ar}), 7,14 м (2H, H _{Ar}), 7,28 м (2H, H _{Ar}), 12,02 ш (1H, HCl),
16	0,62 д (3H, J=6,6, CH ₃), 0,91 д (3H, J=6,6, CH ₃), 1,44 м (1H, CH), 1,89 м (2H, CH ₂), 2,66 м (1H), 2,85-3,06 м (3H), 3,11 м (1H), 3,44 ш.д (1H, J=12,0), 3,68-4,07 м (5H), 5,29 ш (1H, OH), 6,90 м (2H, H _{Ar}), 6,95 ш.д (2H, J=8,5, H _{Ar}), 7,14 ш.д (2H, J=8,5, H _{Ar}), 7,29 ш.д (2H, J=8,5, H _{Ar}), 11,89 ш (1H, HCl),
17	0,76 м (1H) и 1,36 м (1H, CH ₂), 0,83 т (3H, J=6,8, CH ₃), 1,14-1,26 м (4H, CH ₂ CH ₂), 1,90 м (2H, CH ₂), 2,65 м (1H); 2,96 ш (2H), 3,17 м (1H), 3,42 ш. д (1H, J=12,0), 3,67-4,06 м (6H), 5,26 ш (1H, OH), 6,93 ш. д (4H, J=8,2, H _{Ar}), 7,14 м (2H, H _{Ar}), 7,28 м (2H, H _{Ar}), 12,02 ш (1H, HCl),
18	2,53 м (1H), 2,68 м (1H), 2,98 м (2H), 3,32 ш.д (1H, J=13,9), 3,61 ш.д (1H, J=13,3), 3,68 ш (1H), 3,78 ш.д (1H, J=12,5); 3,92 ш.т (1H, J=12,0), 4,08 м (1H) 5,01 д (1H, J=10,1), 6,03 ш (1H, OH), 7,04-7,15 м (6H), 7,25 м (1H, пара-C ₆ H ₅), 7,33 м (2H), 7,40 м (2H, мета-C ₆ H ₅), 7,95 м (2H, орто-C ₆ H ₅), 12,85 ш (1H, HCl)
19	2,33-2,40 м (3H) и 2,60 м (1H, N(CH ₂) ₂), 2,60 м (1H) и 2,82 дд (1H, J=12,9 и 10,0, NCH ₂), 2,98 д (1H, J=13,7) и 3,23 д (1H, J=13,7, CH ₂ Ph), 3,46 дд (1H, J=10,0 и 4,3, CH); 3,58-3,70 м (4H, O(CH ₂) ₂), 6,84-6,93 м (4H, H _{Ar}), 6,98 с (5H, C ₆ H ₅), 7,15 м (2H, H _{Ar}), 7,24 м (2H, H _{Ar}),
20	0,90-1,34 м (6H), 1,51-1,65 м (3H), 1,92 м (1H), 2,31 м (1H, C ₆ H ₁₁), 2,90-3,13 м (3H) и 2,55 м (1H, N(CH ₂) ₂); 3,41 ш. д (1H, J=12,0), 3,65-3,76 м (2H), 3,82-3,90 м (2H), 3,98 ш, т (1H, J=12,0), 4,29 ш.д (1H, J=7,2), 5,06 ш (1H, OH), 6,99 ш (4H, H _{Ar}), 7,20 м (2H, H _{Ar}), 7,30 м (2H, H _{Ar}), 11,97 ш (1H, HCl),
21	2,44 м (1H), 2,59-2,85 м (2H), 2,85-3,07 м (2H), 3,23 м (1H), 3,44 м (1H); 3,70 ш.д (1H, J=12,5), 3,79-4,06 м (5H), 4,91 д д (1H, J=10,3 и 1,8) и 4,98 дд (1H, J=17,2 и 1,8, =CH ₂), 5,58 ддт (1H, J=17,2, 10,3 и 6,5, =CH), 6,96 ш.д (4H, J=8,4, H _{Ar}), 7,14 м (2H, H _{Ar}), 7,28 м (2H, H _{Ar}), 12,0 ш (1H, HCl),

Таблица 3

Спектры ЯМР ^{13}C соединений 12-20 в ДМСО- d_6 /CCl $_4$

Соединение	
12	7,3(CH $_3$), 32,0(CH $_2$), 50,3(CH), 51,2 и 52,2(N(CH $_2$) $_2$), 58,22(NCH $_2$), 62,8 и 62,9(O(CH $_2$) $_2$) 119,6, 131,9,138,0и 140,7 (C* $_{Ar}$), 127,1, 128,6, 129,5 и 131,2(CH $_{Ar}$)
13	13,9(CH $_3$), 16,1(CH $_2$), 41,7(CH $_2$), 50,4(CH), 51,2 и 52,2(N(CH $_2$) $_2$), 58,18(NCH $_2$), 62,7 и 62,9 (O(CH $_2$) $_2$), 77,2(OC), 119,5, 131,9, 137,9 и 141,0 (C* $_{Ar}$), 127,2, 128,5 , 129,5 и 131,2(CH $_{Ar}$)
14	16,9(CH $_3$), 17,4(CH $_3$), 32,3(CH), 45,99(CH), 51,0 и 52,3(N(CH $_2$) $_2$), 58,01(NCH $_2$), 62,8 и 63,0 (O(CH $_2$) $_2$), 79,19(OC), 119,8, 132,2, 137,3 и 139,7 (C* $_{Ar}$), 127,2, 129,2 , 129,4 и 131,4(CH $_{Ar}$)
15	13,7(CH $_3$), 22,4(CH $_2$), 22,4(CH $_2$), 25,0(CH $_2$), 50,5(CH), 51,2 и 52,2(N(CH $_2$) $_2$), 58,2(NCH $_2$), 62,7 и 62,9(O(CH $_2$) $_2$), 77,1(OC), 119,6, 131,9, 137,9 и 141,0 (C* $_{Ar}$), 127,2, 128,5 , 129,5 и 131,2(CH $_{Ar}$)
16	23,7(CH $_3$), 23,7(CH), 24,2(CH $_3$), 47,5(CH $_2$), 51,4(CH), 51,2 ш (N(CH $_2$) $_2$), 58,3(NCH $_2$), 62,9 ш (O(CH $_2$) $_2$), 77,7(OC), 119,7, 132,0, 137,8 и 140,8 (C* $_{Ar}$), 127,2, 128,7, 129,5 и 131,5(CH $_{Ar}$)
17	13,6(CH $_3$), 21,9(CH $_2$), 22,4(CH $_2$), 31,6(CH $_2$), 39,4(CH $_2$), 50,5(CH), 51,2 и 52,2(N(CH $_2$) $_2$), 58,12(NCH $_2$), 62,8 и 62,9 (O(CH $_2$) $_2$), 77,1(OC), 119,6, 131,9, 137,9 и 140,9 (C* $_{Ar}$) и 127,2, 128,5, 129,5 и 131,2 (CH $_{Ar}$)
18	46,9(CH), 52,0 и 52,8(N(CH $_2$) $_2$), 60,1(NCH $_2$), 62,4 и 62,9 (O(CH $_2$) $_2$), 80,1(OC), 119,0, 131,8, 137,3,144,4 и 145,4 (C* $_{Ar}$), 126,3, 126,4, 127,3, 127,4, 128,0, 129,7 и 131,6(CH $_{Ar}$)
19	46,1(CH $_2$), 49,7(CH), 53,2(N(CH $_2$) $_2$), 60,0(NCH $_2$), 65,9 (O(CH $_2$) $_2$), 79,2(OC), 119,6, 131,7, 137,9 и 141,7(C* $_{Ar}$), 126,9, 129,2 , 130,4 и 131,0(CH $_{Ar}$), 125,1, 126,6 и 129,2(CH $_{ph}$) и 136,5(C $_{ph}$)
20	25,8, 25,9, 26,0, 26,6, 26,9 и 42, 9(C $_6$ H $_{11}$), 45,1(CH), 50,9 и 52,3(N(CH $_2$) $_2$), 58,0(NCH $_2$), 62,8 и 63,0(O(CH $_2$) $_2$),79,2(OC), 119,8, 132,2, 137,4 и 139,6 (C* $_{Ar}$), 127,4, 129,2 , 129,3 и 131,4(CH $_{Ar}$)

* - В скобках приведено число эквивалентных ядер углерода

осадок, перекристаллизовывают из этанола. Выход 24,76 г (80%); т.пл. 137-139; R_f 0,71 (на закрепленном слое силикагель-гипс; элюент – смесь хлороформ-этанол, 30:1). Найдено, %: С 54,28; Н 3,23. $C_{14}H_{10}BrClO$. Вычислено, %: С 54,45; Н 3,19. ИК спектр, ν , cm^{-1} : 1680 (C=O), 1605 (C-C аром.).

α -(4'-Хлорфенил)- β -морфолино-4-бромпропиофенон(1). Смесь 7,7 г (0,025 моля) 4-бромфенил-4'-хлорбензилкетона, 4,5 г (0,15 моля) параформальдегида и 2,2 г (0,025 моля) морфолина в среде этанола нагревают на водяной бане в течение 6-8 ч. После отгонки этанола остаток растворяют в воде и экстрагируют эфиром для удаления не вступившего в реакцию кетона; к водному слою добавляют 40% раствор едкого натра до pH 8-9 и экстрагируют эфиром (3x100 мл). Эфирные вытяжки сушат над сухим серноокислым натрием и отгоняют эфир. Осадок отфильтровывают и перекристаллизовывают из этанола.

Получают 7,67 г (75%); т. пл. 100-102°C; R_f 0,69. Найдено, %: С 55,65; Н 4,87; N 3,64. $C_{19}H_{19}BrClNO_2$. Вычислено, %: С 55,81; Н 4,65; N 3,43. ИК спектр, ν , cm^{-1} : 1685 (C=O), 1605 (C-C аром.).

1-(4-Бромфенил)-1-алкил(арил)-2-(4'-хлорфенил)-3-морфолинопропан-1-олы(2-11). К реактиву Гриньяра, приготовленному из 1 г (0,04 моля) металлического магния, 0,044 моля алкил(арил) галогенида в 25 мл абсолютного эфира, прикапывают 0,004 моля α -(4'-хлорфенил)- β -морфолино-4-бромпропиофенона в 15 мл абсолютного эфира. Содержимое колбы нагревают в течение 3 ч и оставляют на ночь. Затем после нагревания еще в течение 2 ч реакционную смесь охлаждают льдом и медленно прикапывают холодную воду до образования на стенках колбы вазелиноподобной массы. Эфирный слой сливают, остаток дважды промывают эфиром (2x20 мл). Объединенные эфирные экстракты сушат над карбонатом натрия. После удаления эфира получают соединения, представляющее собой густую массу.

Гидрохлориды 1-(4-бромфенил)-1-алкил(арил)-2-(4'-хлорфенил)-3-морфолинопропан-1-олов(12-11). К эфирным растворам 1-(4-бромфенил)-1-алкил(арил)-2-(4'-хлорфенил)-3-морфолинопропан-1-олов (2-11) медленно прикапывают эфирный раствор хлористого водорода до pH 1. Выпавший осадок отфильтровывают, промывают сухим эфиром, перекристаллизовывают из сухого этанола. Константы приведены в табл. 1, спектры ЯМР ^1H соединений 12-21 – в табл. 2, а спектры ЯМР ^{13}C соединений 12-20 – в табл. 3.

1-(4-ԲՐՈՄՖԵՆԻԼ)-1-ԱԼԿԻԼ(ԱՐԻԼ)-2-(4'-ՔԼՈՐՖԵՆԻԼ)-3-ՍՈՐՖՈԼԻՆԱՊՐՈՊԱՆ-1-ՈՒՆԵՐԻ ՀԻՂՐՈՔԼՈՐԻՂՆԵՐԻ ՍԻՆԹԵԶԸ

Գ. Ա. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

α -(4-Բրոմֆենիլ)- β -մորֆոլինա-4-բրոմպրոպիոնֆենոնը ստացվել է 4-բրոմֆենիլ-4'-քլորբենզիլկետոնի ամինամեթիլացմամբ պարաֆորմալդեհիդով և մորֆոլինով էթանոլի միջավայրում: Գրինյարի տարբեր րեագենտների հետ փոխազդելով α -(4-բրոմֆենիլ)- β -մորֆոլինա-4-բրոմպրոպիոնֆենոնը վեր է ածվել 1-(բրոմֆենիլ)-1-ալկիլ(արիլ)-2-(4'-քլորֆենիլ)-3-մորֆոլինապրոպան-1-ոլերի հիդրոքլորիդների:

SYNTHESIS OF THE HYDROCHLORIDES OF 1-(4-BROMPHENYL)-1-ALKYL(ARYL)-2-(4'-CHLOROPHENYL)-3-MORPHOLINOPROPAN-1-OLS

G. A. GEVORGYAN

α -[4'-Chlorophenyl]- β -morpholino-4-bromopropiophenone have been synthesized by aminomethylation of 4-bromphenyl-4'-chlorobenzylketones with paraformaldehyde and morpholine. 1-(4-Bromphenyl)-1-alkyl(aryl)-2-(4'-chloro-phenyl)-3-morpholino-propanols were synthesized by interaction of α -[4'-chlorophenyl]- β -morpholino-4-ethoxypropiophenones with Grignard reagents.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] *Геворгян Г.А., Агабабян А.Г., Мнджоян О.Л.* // Успехи химии, 1984, т. 53, №6, с. 971.
- [2] *Исаханян А.У.* Автореф. дисс. “Синтез и биологическая активность арилатифатических β -аминокетонов и их производных” канд. хим. наук. Ереван, 2005.
- [3] *Машковский М.Д.* Лекарственные средства. Ч.1, М., Медицина, 1993, с. 168.
- [4] *Мнджоян О.Л., Геворгян Г.А., Пахлеванян М.З., Асратян С.Н.* // Арм. хим. ж., 1969, т. 22, №8, с. 693.