ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՇԱԴԵՍԻԱ
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ
АРМЕНИЯ

Հայաստանի քիմիական հանդես 60, №1, 2007 Химический журнал Армении

УДК 547.415.3+547.77+547.867+547.29.02

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИМИНОСПИРТОВ С ЭФИРАМИ АКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ

**С. Г. КОНЬКОВА, А. Х. ХАЧАТРЯН, А. Э. БАДАСЯН,
Ф.С. КИНОЯН и М. С. САРГСЯН**

Институт органической химии НАН Республики Армения, Ереван

Поступило 16 V 2006

С целью синтеза новых производных 1,3-оксазолидинов и тетрагидро-1,3-оксазинов изучено взаимодействие эфиров акриловой кислоты с иминоспиртами, способными образовать кольчатый таутомер. Показано, что реакция протекает региоселективно с участием кольчатого таутомера.

Табл. 1, библиограф. ссылок 7.

β - и γ -иминоспирты из-за возможности кольчато-цепной таутомерии [1] являются доступными соединениями для синтеза производных 1,3-оксазолидина и тетрагидро-1,3-оксазина [2,3]. Интерес к последним двум типам соединений обусловлен их биологической активностью [4,5]. Для целенаправленного синтеза с участием таутомерных систем необходим подбор условий и реагентов, способствующих реагированию одного из таутомеров. Недавно нами было установлено, что при взаимодействии иминоспиртов I с акрилонитрилом в реакцию вступает только циклический таутомер II с образованием N-цианоэтил-1,3-оксазациклоалканов [6].

В данном сообщении с целью синтеза новых производных 1,3-оксазолидинов и тетрагидро-1,3-оксазинов изучено взаимодействие иминоспиртов I с эфирами акриловой кислоты. Проведенные опыты показали, что реакция протекает в спирте при нагревании с образованием соответствующих продуктов присоединения III с участием циклических таутомеров. Синтезированные продукты III являются лабильными соединениями и при стоянии, вследствие гидролиза, превращаются в соответствующие эфиры 2-гидроксиалкиламинопропионовой кислоты IVa-г. Этим, по всей вероятности, можно объяснить присутствие соединений IV в продуктах реакции.

Строение полученных соединений подтверждено методами ЯМР¹H и ИК спектроскопии, а также встречным синтезом по следующей схеме:

Экспериментальная часть

Спектры ЯМР ¹H сняты на приборе "Mercury 300" (300 МГц на протонах при 303 К) в ДМСО-d₆ в качестве стандарта использован ТМС. ИК спектры паст соединений в вазелиновом масле сняты на приборе "Specord 75-IR."

Общее описание взаимодействия гидросииминов I с эфирами акриловой кислоты. Смесь 0,02 моля имина I, 0,03 моля алкилакрилата, стабилизированного гидрохиноном, и 10 мл абсолютного соответствующего спирта кипятят 8 ч. После отгонки спирта и перегонки остатка получают смесь III и IV. Выходы, ЯМР ¹H и ИК спектральные данные приведены в таблице.

Таблица

Выходы и данные ИК и ЯМР¹H спектров смеси 2-алкил-3-карбалкоксиэтил-1,3-оксазациклоканов (III) и эфиров гидроксилалкиламинопропионовой кислоты (IV)

Соединение III/IV	R	R ¹	n	Выход, % III/IV	ИК, ν, см ⁻¹ (характерные поглощения)	ЯМР ¹ H, δ м.д. (характерные поглощения)						
						III				IV		
						CH ₂ COO	COOCH ₂	NCHO	Ar	CH ₂ COO	COOCH ₂	CH ₂ OH
IIIa / IVa	C ₆ H ₅	CH ₃	2	47,5 26	1720, 690, 750, 1180, 1200 – 1230, 3100 – 3500, 1710	т,38т	3,59 с R ¹ = CH ₃	4,85 с	7,25-7,4 м (5H)	т,4 т	3,65 с R ¹ = CH ₃	3,45 т
IIIб / IVб	C ₆ H ₅	C ₇ H ₅	т	44,т т4,8	17т0, 700, 760, 1т00 – 1т30, 1740, 3340, 3600, 1040	т,4 м	4,04 кв	4,85 с	7,25-7,40 м (5H)	т,39 м	4,08 кв	3,45 т
IIIв / IVв	C ₆ H ₅	C ₄ H ₉	т	5т 16,4	1740, 650, 760, 1180, 1т00 – 1т80, 1730, 3310 – 3500	т,4 м	3,95 т	4,85 с	7,25-7,40 м (5H)	т,39 м	4,05 т	3,45т
IIIг / IVг	C ₆ H ₅	C ₇ H ₅	3	54 18,8	1710, 695, 765, 1т00 – 1т30, 17т0, 3т00 – 3500	т,18 м	3,98 кв	4,98 с	7,25-7,40 м (5H)	т,38 м	4,1т кв	3,62 т
IIIд / IVa	n – Nn-1C ₆ H ₄	CH ₃	т	56,4 10	1710, 680, 730, 810, 840, 1180, 1730, 3350 – 3530	т,45м	3,6т с R ¹ = CH ₃	5,1 с	7,62-д (2H) 8,19д (2H)	т,4 м	3,65 с R ¹ = CH ₃	3,45 т

3-(2-Карбэтокси)этил-2-фенил-1,3-оксазолидин (III б). Смесь 2,42 г (0,015 моля) этилового эфира 2-(2-гидроксиэтил)аминопропионовой кислоты (IVб) [7], 1,6 г (0,015 моля) бензальдегида, 0,1 г п-толуолсульфокислоты и 30 мл бензола нагревают с насадкой Дина-Старка до прекращения выделения воды. После удаления бензола остаток перегоняют в вакууме и получают 2,5 г (65%) IIIб с т. кип. 155-157⁰/4-5 мм, n_D^{20} 1,5112. Найдено, %: С 66,92; Н 7,15; N 5,8. C₁₄H₁₉NO₃. Вычислено, %: С 67,46; Н 7,63; N 5,62. ЯМР¹H спектр δ , м.д.: 1,21 т (3H, CH₃CH₂, J= 7,1 Гц); 2,32-2,48 м (2H, CH₂COO); 2,61 ддд (1H, NCH₂CH₂COO, J= 12,1; 7,3; 5,7 Гц); 2,69 дт (1H, NCH₂CH₂COO, J= 9,5; 7,6 Гц); 2,83 дт (1H, NCH₂CH₂O, J= 12,1; 7,5 Гц); 3,26 дт (1H, NCH₂CH₂O, J= 9,5; 4,7 Гц); 3,93 м (2H, CH₂O); 3,97-4,12 м (2H, OCH₂CH₃); 4,86 с (1H, NCHO); 7,27-7,41 м (5H, C₆H₅). ИК спектр, ν , см⁻¹: 1510; 690; 760; 3040; 3060; (C₆H₅); 1740(COO); 1170-1200 (C-O-C).

3-(2-Карббутокси)этил-2-фенил-1,3-оксазолидин (III в). Аналогично из 3,78 г (0,02 моля) бутилового эфира 2-(2-гидроксиэтил)аминопропионовой кислоты (IVв) [7], 2,12 г (0,02 моля) бензальдегида получают 3,94 г (71,2%) IIIв с т. кип. 173-178⁰C/5 мм, n_D^{20} 1,5020. Найдено, %: С 68,92; Н 7,91; N 4,76. C₁₆H₂₃NO₃. Вычислено, %: С 69,31; Н 8,30; N 5,05. ЯМР¹H спектр, δ , м.д.: 0,94 т (3H, CH₃, J= 7,3 Гц); 1,36 м (2H, CH₃CH₂); 1,55 м (2H, CH₃CH₂CH₂); 2,32-2,46 м (2H, CH₂COO); 2,57-2,76 м (2H, NCH₂CH₂COO); 2,83 дт (1H, NCH₂CH₂O, J= 12,2; 7,5 Гц); 3,25 ддд (1H, NCH₂CH₂O, J=11,1; 5,9; 5,3 Гц); 3,92 м (2H, NCH₂CH₂O); 3,99 м (2H, OCH₂); 4,86 с (1H, NCHO); 7,26-7,40 м (5H, C₆H₅). ИК спектр, ν , см⁻¹: 1500; 1510; 1580; 690; 760; 3040; 3060; (C₆H₅); 1730 (COO); 1170-1200 (C-O-C).

**ԻՄԻՆՈՍՊԻՐՏԵՐԻ ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱԿՐԻԼԱԹԵՐԻ
ԷՍԹԵՐՆԵՐԻ ՀԵՏ**

**Ս.Գ. ԿՈՆԿՈՎԱ, Ա.Խ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ, Ա.Է. ԲԱԴԱՍՅԱՆ,
Ֆ.Ս. ԲԻՆՈՅԱՆ և Մ.Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ**

1,3-Օքսազոլիդինների և տետրահիդրո-1,3-օքսազինների նոր ածանցյալների սինթեզի նպատակով ուսումնասիրվել է ակրիլաթթվի էսթերների փոխազդեցությունը այնպիսի իմինոսպիրտների հետ, որոնք ընդունակ են առաջացնելու օղակային տաուտոմեր: Ցույց է տրվել, որ ռեակցիան ընթանում է ռեգիոսելեկտիվ միայն օղակային տաուտոմերի մասնակցությամբ:

**THE INTERACTION OF THE IMINOALCOHOLS WITH
THE ESTERS OF ACRYLIC ACID**

**S. G. KONKOVA, A. Kh. KHACHATRYAN, A. E. BADASYAN,
F. S. KINOYAN and M. S. SARGSYAN**

For the purpose of synthesis of the new derivatives of 1,3-oxazolidines and tetrahydro-1,3-oxazines the interaction of the iminoalcohols, which are able to form ring-form tautomers, with esters of acrylic acid, has been studied. It has been shown, that the regio-selective reaction takes place with participation of ring-form tautomer.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] *Саргсян М.С., Конькова С.Г.* // Хим. ж. Армении, 2005, т. 58, №3, с. 45.
- [2] *Рахманкулов Д.Л., Зорин В.В., Латыпина Ф.Н., Злотский С.С., Караханов Р.А.* // ХГС, 1982, №4, с. 435.
- [3] *Вальтер Р.Э.* // Успехи химии, 1982, т. 51, вып. 5, с. 1374.
- [4] *Chalina E., Dantchev D., Georgiev A., Mitova K.* // J.Arch.Parm., 1986, v. 319, №7, p. 593, РЖХим., 1986, 24 ж 294.
- [5] *Бредихин А.А., Новикова В.Г., Бредихина З.А.* // ЖОрХ, 1997, т.33, вып.3, с. 427.
- [6] *Конькова С.Г., Абовян Г.М., Хачатрян А.Х., Бадасян А.Э., Паносян Г.А., Саргсян М.С.* // ЖОрХ, 2005, т. 41, вып. 7, с. 1064.
- [7] *Сануй Кохэй, Огата Наоя* // J.Chem.Soc. Japan, Indust.Chem.Sec., 1967, v. 70, №11, p. 2051. РЖХим., 1968, 16 с 130.