ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

УДК 547.26"118

**К ВОПРОСУ О РАВНОВЕСИИ МЕЖДУ ГИДРОБРОМИДОМ
ТРИФЕНИЛФОСФИНА И ТРИФЕНИЛФОСФИНОМ И БРОМИСТЫМ
ВОДОРОДОМ**

Нами установлено, что винилпиридинийбромид реагирует с раствором трифенилфосфина в водном растворе бромистоводородной кислоты при нагревании при 70°C с образованием продукта присоединения по винильной группе с невысоким выходом (18%), подвергающегося в условиях реакции дальнейшим трансформациям, приводящим к 1,2- бис(трифенилфосфонийбромидо)этану.

Тот же продукт с таким же выходом был получен нами ранее при взаимодействии винилпиридинийфосфоний бромида с трифенилфосфином в растворе ацетонитрила [1].

Попытка осуществить аналогичную реакцию кипячением винилпиридиний бромида с гидробромидом трифенилфосфина в растворе ацетонитрила не увенчалась успехом. Исходные компоненты без изменений вернулись обратно. Между тем, ранее нами была осуществлена в ацетонитриле реакция гидробромида

трифенилфосфина с α - хлоракриловой кислотой, приведшая к образованию 2- карбоксивинилтрифенилфосфоний хлорида, и было показано, что гидрохлорид триметиламина не вступает в эту реакцию [2]. Полученные данные были объяснены наличием в случае гидробромида трифенилфосфина равновесия с трифенилфосфином и бромистоводородной кислотой.

Полученные в настоящей работе данные по винилпиридиний бромиду свидетельствуют о том, что наличие такого равновесия зависит от природы растворителя.

В соответствии со сказанным нами установлено, что аллилбромид не реагирует с гидробромидом трифенилфосфина при кипячении в ацетонитриле, с раствором же трифенилфосфина в воде или спирте в присутствии эквимольного количества бромистого водорода образует трифенилаллилфосфоний бромид с высокими выходами 73 и 72%, соответственно.

Образование же аддукта в реакции α -хлоракриловой кислоты с гидрохлоридом трифенилфосфина в ацетонитриле объясняется, по всей вероятности, предварительным протонированием карбонильной группы по схеме:

С аналогичного протонирования начинаются и реакции оксосоединений с солями азотистых нуклеофилов.

ՏՐԻՖԵՆԻԼՖՈՍՖԻՆԻ ՀԻՂՐՈՔՐՈՄԻԴԻ ԵՎ ՏՐԻՖԵՆԻԼՖՈՍՖԻՆԻ ՈՒ ԲՐՈՄՍՎՈԴՐՍՏԻ ՄԻՋԵՎ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԻ ՄԱՍԻՆ

Ս. Լ. ԴԱՎԹՅԱՆ

Ապացուցված է, որ տրիֆենիլֆոսֆինի հիդրոբրոմիդի և տրիֆենիլֆոսֆինի ու բրոմաջրածնի միջև հավասարակշռությունը սերտորեն կախված է լուծիչի բևեռացվածության աստիճանից:

**ON THE QUESTION OF THE BALANCE BETWEEN TRYPHENYLPHOSPHINE
HYDROGENEBROMIDE
AND TRYPHENYLPHOSPHINE AND HYDROGENEBROMIDE**

S. L. DAVTYAN

It is established that the balance between triphenylphosphine hydrobromide and triphenylphosphine and hydrogenebromide depends strongly on the polarity of the solvent.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] *Хачикян Р.Дж., Давтян С.Л., Инджикян М.Г.* // Хим. ж. Армении, 2006, т. 59, №8, с. 110
[2] *Хачатрян Р.А., Котикян С.Ю., Хачикян Р.Дж., Паносян Г.А., Мирзаханян М.Р., Инджикян М.Г.* // ЖОХ, 2003, т. 73, вып. 10, с. 1594.

Институт органической химии
НАН Республики Армения, Ереван

С. Л. ДАВТЯН

Поступило 28 XII 2006