ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՎԱԴԵՍԻԱ
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ
АРМЕНИЯ

Հայաստանի քիմիական հանդես **61, №3-4, 2008** Химический журнал Армении

УДК 541-471.1

СИНТЕЗ N-ЗАМЕЩЕННЫХ АМИДОВ 3-(5-ФТОР-2-ГИДРОКСИФЕНИЛ)-3-ФЕНИЛПРОПИОНОВОЙ КИСЛОТЫ

Ր. Ս. БАЛАЯՆ^ա, Թ. Օ. ԱՏԱՏՐՅԱՆ^ա, Ա. Վ. ԳՐԻԳՐՅԱՆ^ա, Կ. Զ. ՄԱՐԿԱՐՅԱՆ^ա,
Ա. Գ. ԽԱՇԱՏՐՅԱՆ^բ և Ջ. Ա. ՄԱՐԿԱՐՅԱՆ^ա

Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии
НАН Республики Армения

^а Институт тонкой органической химии им. А.Л.Мнджояна
Армения, 0014, Ереван, пр.Азатутян, 26
Факс: (28-83-37) E-mail: NARA54@mail.ru

^б Ереванский государственный университет
Армения, 0049, Ереван, ул.А.Манукяна, 1
Факс: (374-10)559355 E-mail: sagusv@netsys.am

Поступило 5 XII 2007

Взаимодействием коричной кислоты с *l*-фторфенолом в кислой среде получен 6-фтор-4-фенилхроман-2-он, на основании которого синтезирован ряд N-замещенных амидов. Изучена их антиаритмическая активность на хлоридкальциевой и аконитиновой моделях.

Библ. ссылок 6.

В продолжение поисков биологически активных веществ антиаритмического действия среди N-замещенных диарилпропанамидов [1-3], содержащих в одном из ароматических ядер, наряду с гидроксильной группой, атом галогена [3], нами осуществлен синтез амидов 3-(5-фтор-2-гидрокси-фенил)-3-фенилпропионовой кислоты (**3-13**) по следующей схеме:

2: R = OH; **3:** Am = N(C₂H₅)₂; **4:** Am = HNC(CH₃)₃; **5:** Am = (C₃H₇)₂;

6: Am = HNCH(C₂H₅)CH₂OH; **7:** Am = N(C₂H₅)CH₂CH₂OH;

8: Am = HNCH(CH₃)C₆H₅; **9:** Am = HNCH(CH₃)CH₂C₆H₅;

10: Am = HNCH₂C₆H₄(Cl-4); **11:** Am = N(CH₂)₄O;
12: Am = HNC₆H₁₁; **13:** Am = NH₂.

Арилированием ненасыщенной связи коричной кислоты *l*-фторфенолом в кислой среде получен 6-фтор-4-фенилхроман-2-он (**1**), что подтверждает орто-ориентацию фенольного гидроксила в реакции арилирования, в частности *l*-галюидфенолами [2-5].

Омылением **1** 10% раствором NaOH выделена соответствующая диарилпропионовая кислота **2**, строение которой подтверждено масс-спектрометрически. Конденсацией **1** с некоторыми алифатическими, ароматическими и циклическими аминами в инертном растворителе получены амиды **3-12**, а кипячением **1** с 30% NH₄OH – незамещенный амид **13**.

Строение соединений **1-13** подтверждено данными ИК- и ЯМР¹H спектров, чистота проверена хроматографически.

Изучено действие соединений **3-13** на хлоридкальциевой и аконитиновой моделях аритмии у самцов белых крыс весом 180-200 г [6]. Исследования показали, что только соединения **3** и **9** в дозе 5 мг/кг при внутривенном введении проявляют едва заметную активность на хлоридкальциевой модели аритмии, предупреждая гибель животных от фибриляции сердца при использовании аритмогена (хлорид кальция, 200 мг/кг) в 25% опытов, тогда как в контроле это наблюдается в 10% экспериментов.

На аконитиновой модели аритмии (аконитин, 30 мг/кг) соединения **3-13** антиаритмического действия не проявляли.

Экспериментальная часть

ИК-спектры сняты на спектрометре “UR-20” в вазелиновом масле, спектры ЯМР¹H на “Varian Mercury-300” в DMSO-d₆, внутренний стандарт – ТМС. ТСХ проведена на пластинках “Silufol UV-254” в системе бензол–ацетон, 3:1. Проявитель – пары йода.

6-Фтор-4-фенилхроман-2-он (1). К 8 г (0.054 моля) коричной кислоты и 9 г (0.1 моля) *l*-фторфенола прикапывают смесь 10 мл H₂SO₄ и 10 мл ледяной AcOH. Смесь нагревают 15 ч при 90°C после чего выливают раствор на 200 мл холодной H₂O. Образовавшийся маслообразный слой при стоянии твердеет и кристаллизуется. Кристаллы отфильтровывают и на фильтре промывают 200 мл H₂O, затем 200 мл 10% раствора NaHCO₃, снова H₂O. Выход соединения **1** 13 г (88.4%), т.пл. 64-67°C (из EtOH). R_f 0.9. Найдено, %: С 75.92; Н 4.62. С₁₅Н₁₁FO₂. Вычислено, %: С 75.60; Н 4.50. Спектр ЯМР¹H, δ, м.д., Гц: 3.02 (д.д., 1H, J = 15.9 и 7.4) и 3.04 (д.д., 1H, J = 15.9 и 6.5, CH₂); 4.46 (д.д., 1H, J = 7.4 и 6.5, CH); 6.72 (д.д., 1H, J = 8.7 и 2.9); 6.99÷7.20 (м, 4H, Ar); 7.24÷7.38 (м, 3H, Ar).

3-(5-Фтор-2-гидроксифенил)-3-фенилпропионовая кислота(2) получена омылением **1** 10% раствором NaOH и дальнейшим осаждением **2** разбавленной соляной кислотой. Выход 1.96 г (75.4%), т.пл. 135-136°C (EtOH-H₂O, 1:1). R_f 0.52. Найдено, %: С 70.00; Н 5.32. С₁₅Н₁₃FO₃. Вычислено, %: С 69.21; Н 5.01. . Спектр ЯМР¹H, δ, м.д., Гц: 2.86 (д.д., 1H, J = 15.8 и 8.7) и 2.92 (д.д., 1H, J = 15.8 и 7.4, CH₂), 4.76 (д.д., 1H, J = 8.7 и 7.4, CH); 6.62÷6.77 (м, 3H) и 7.09÷7.28 (м, 5H, Ar); 9.08 (с, 1H, OH); 11.73 (ш, 1H, COOH).

3-(5-Фтор-2-гидроксифенил)-3-фенил-N-(диэтил)пропанамид(3). Смесь 2.4 г (0.01 моля) **1** и 0.7 г (0.01 моля) диэтиламина в 50 мл C₆H₆ кипятят 10-11 ч, после чего раствор промывают 5% HCl до кислой реакции, затем H₂O, отфильтровывают осевшие кристаллы и на фильтре промывают смесью Et₂O-C₆H₁₄, 1:2. Выход соединения **3** 2.0 г (66.1%), т.пл. 126-127°C. Найдено, %: С 72.10; Н 7.30; N 4.44. С₁₉H₂₂FNO₂. Вычислено, %: С 72.37; Н 7.00; N 4.40. R_f 0.6, ИК спектр (CCl₄), ν, см⁻¹: 1640 (C=O); 3400-3500 (ОН фен.). Все остальные производные пропанамиды получены аналогично.

3-(5-Фтор-2-гидроксифенил)-3-фенил-N-(2-метилпропан-2-ил)пропанамид(4) получен из 2.4 г (0.01 моля) **1** и 0.3 г (0.01 моля) трет. бутиламина. Выход соединения **4** 1.7 г (55.0%); т.пл. 243-245°C. Найдено, %: С 72.00; Н 7.20; N 4.75. С₁₉H₂₂FNO₂. Вычислено, %: С 72.37; Н 7.00; N 4.40. R_f 0.65. ИК-спектр (CCl₄), ν, см⁻¹: 1625 (C=O); 3250 (NH); 3400-3500 (ОН фен.).

3-(5-Фтор-2-гидроксифенил)-3-фенил-N-ди(пропан-3-ил)пропанамид(5) получен из 2.4 г (0.01 моля) **1** и 1.0 (0.01 моля) дипропиламина. Выход соединения **5** 2.38 г (70.0%); т.пл. 90-91°C. Найдено, %: С 73.80; Н 7.50; N 4.09. С₂₁H₂₆FNO₂. Вычислено, %: С 73.46; Н 7.31; N 4.08. R_f 0.64. ИК-спектр (CCl₄), ν, см⁻¹: 1635 (C=O); 3400-3450 (ОН фен.).

3-(5-Фтор-2-гидроксифенил)-3-фенил-N-(1-гидроксибутан-2-ил)пропанамид (6) получен из 2.4 г (0.01 моля) **1** и 0.89 г (0.01 моля) 1-гидроксибутан-2-иламина. Выход соединения **6** 2.3 г (72.6%); т.пл. 104-105°C. Найдено, %: С 63.00; Н 6.80; N 4.15. С₁₉H₂₂FNO₃. Вычислено, %: С 62.84; Н 6.64; N 4.20. R_f 0.65. . Спектр ЯМР¹H, δ, м.д., Гц: (смесь двух диастереоизомеров, 58 и 42%), 0.97 и 1.13 (оба т, 3H, J = 7.0, CH₃); 2.94(3.53 (м, 8H, CH₂, N(CH₂)₂ и OCH₂); 4.22 и 4.58 (оба ш, 1H, ОН- CH₂); 4.83 и 4.84 (оба т, 1H, J = 7.5, CH); 6.60(6.79 (м, 3H) и 7.07(7.26 (м, 5H, Ar); 9.04 (ш, 1H, OH).

3-(5-Фтор-2-гидроксифенил)-3-фенил-N-этил-N-(1-гидроксиэтан-2-ил)пропанамид(7) получен из 2.4 г (0.01 моля) **1** и 0.89 г (0.01 моля) N-этил-N-(1-гидроксиэтан-2-ил)амина. Выход соединения **7** 2.7 г (84.6%); т.пл. 105-107°C. Найдено, %: С 62.60; Н 6.90; N 4.32. С₁₉H₂₂FNO₃. Вычислено, %: С 62.84; Н 6.64; N 4.20. R_f 0.7. ИК-спектр (CCl₄), ν, см⁻¹: 1620 (C=O); 3400-3500 (ОН фен.).

3-(5-Фтор-2-гидроксифенил)-3-фенил-N-(1-фенилэтан-1-ил)пропанамид(8) получен из 2.4 г (0.01 моля) **1** и 1.2 г (0.01 моля) 1-фенилэтан-1-иламина. Выход соединения **8** 2.6 г (72.2%); т.пл. 70-72°C. Найдено, %: С 76.50; Н 6.30; N 3.65. С₂₃H₂₂FNO₂. Вычислено, %: С 76.30; Н 6.06; N 3.85. R_f 0.6.

3-(5-Фтор-2-гидроксифенил)-3-фенил-N-(1-фенилпропан-2-ил)пропанамид (9) получен из 2.4 г (0.01 моля) **1** и 1.3 г (0.01 моля) 1-фенилпропан-2-иламина. Выход соединения **9** 2.18 г (59.0%); т.пл. 140-142°C. N 3.94. Найдено, %: С 74.50; Н 6.60; N 3.94. С₂₄H₂₄FNO₂. Вычислено, %: С 74.27; Н 6.36; N 3.77. R_f 0.65. . Спектр ЯМР¹H, δ, м.д., Гц: (смесь двух диастереоизомеров, 55% и 45%), 0.90 и 0.91 (оба д, 3H, J = 6.7, CH₃); 2.39(2.47 и 2.64(2.80 (м, 4H, CH₂CO и CH₂Ph); 3.91 (м, 1H, CHCH₃); 4.80 и 4.81 (оба т, 1H, J = 7.7, CH Ph); 6.61(6.85 (м, 3H) и 7.03(7.27 (м, 10H, Ar); 7.45 (д, 1H, J = 8.0, NH); 9.00 (уш, 1H, OH).

3-(5-Фтор-2-гидроксифенил)-3-фенил-N-[1-(п-хлорфенил)этан-1-ил]пропанами́д (10) получен из 2.4 г (0.01 моля) **1** и 1.4 г (0.01 моля) (п-хлорфенил)этан-1-иламина. Выход соединения **10** 2.66 г (70.0%); т.пл. 136-138°C. Найдено, %: С 69.00; Н 5.20; N 5.04. $C_{22}H_{19}FCINO_2$. Вычислено, %: С 68.93; Н 4.96; N 4.94. R_f 0.7. . Спектр ЯМР¹H, δ , м.д., Гц: 2.80 (д.д., 1H, J = 14.3 и 8.1) и 2.87(д.д., 1H, J = 14.3 и 8.1 $CH-CH_2$); 6.65(6.75 (м, 2H); 6.87(6.91 (м, 3H) и 7.10(7.31 (м, 7H, Ar); 8.16 (т, 1H, J = 6.0, NH); 9.04 (с, 1H, OH).

3-(5-Фтор-2-гидроксифенил)-3-фенил-(морфолин-4-ил)пропанами́д(11) получен из 2.4 г (0.01 моля) **1** и 0.87г (0.01 моля) морфолина. Выход соединения **11** 2.48 г (75.4%); т.пл. 154-157°C. Найдено, %: С 70.00; Н 5.40; N 4.51. $C_{19}H_{20}FNO_3$. Вычислено, %: С 69.29; Н 5.22; N 4.24. R_f 0.6. . Спектр ЯМР¹H, δ , м.д., Гц: 2.96 (д.д., 1H, J = 15.3 и 6.9) и 3.03 (д.д., 1H, J = 15.3 и 8.2, CH_2); 3.36(3.53 (м, 8H, C_4H_8NO); 4.79 (д.д., 1H, J = 8.2 и 6.9, CH); 6.62(6.74 (м, 2H); 6.82 (д.д., 1H, J = 9.7 и 2.9) и 7.19(7.28 (м, 5H, Ar); 9.07 (с, 1H, OH).

3-(5-Фтор-2-гидроксифенил)-3-фенил-N-(циклогексил)пропанами́д(12) получен из 2.4 г (0.01 моля) **1** и 0.35 г (0.01 моля) циклогексиламина. Выход соединения **12** 2.5 г (72.0%); т.пл. 185-187°C. Найдено, %: С 72.00; Н 6.63; N 4.55. $C_{21}H_{24}FNO_2$. Вычислено, %: С 71.79; Н 6.83; N 4.28. R_f 0.63. Спектр ЯМР¹H, δ , м.д., Гц: 0.96(1.33 (м, 5H); 1.51(1.70 (м, 5H) и 3.45 (м, 1H, C_6H_{11}); 2.69 (д.д., 1H, J = 14.3 и 8.0) и 2.74 (д.д., 1H, J = 14.3 и 8.0, $CH-CH_2$); 4.78 (т, 1H, J = 8.0, $CH-CH_2$); 6.61(6.72 (м, 2H); 6.82 (д.д., 1H, J = 9.9 и 2.9); 7.09 (м, 1H) и 7.17 (7.25 (м, 4H, Ar); 7.30 (д, 1H, J = 8.0, NH); 8.99 (с, 1H, OH).

3-(5-Фтор-2-гидроксифенил)-3-фенилпропанами́д(13) получен кипячением 8 г (0.02 моля) **1** с 30 мл 30% NH_4OH в течение 8-9 ч. Образовавшиеся кристаллы отфильтровывают, промывают на фильтре водой, C_6H_{14} . Выход соединения **13** 3.0 г (60.0%); т.пл. 155-158°C. Найдено, %: С 70.20; Н 5.74; N 5.60. $C_{15}H_{14}FNO_2$. Вычислено, %: С 70.00; Н 5.44; N 5.45. R_f 0.55. Спектр ЯМР¹H, δ , м.д., Гц: 2.75 (д.д., 1H, J = 14.9 и 7.8) и 2.79 (д.д., 1H, J = 14.9 и 8.0, CH_2); 4.80 (д.д., 1H, J = 8.0 и 7.8, CH); 6.44 (ш, 1H) и 7.13 (ш, 1H, NH_2); 6.62(6.73 (м, 2H); 6.81 (д.д., 1H, J = 9.9 и 2.9) и 7.07(7.27 (м, 5H, Ar); 9.04 (с, 1H, OH).

Работа выполнена при финансовой поддержке МНТЦ (грант А-960).

N-ՏԵՂԱԿԱԼՎԱԾ 3-(5-ՖՏՈՐ-2-ՀԻԴՐՕՔՍԻՖԵՆԻԼ)-3-ՖԵՆԻԼՊՐՈՊԻՈՆԱԹՎԻ ԱՍԻԴՆԵՐԻ ՄԻՆԹԵԶԸ

**Ռ. Ս. ԲԱԼԱՅԱՆ, Տ. Հ. ԱՍԱՏՐՅԱՆ, Հ. Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ, Կ. Ժ. ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ,
Հ. Գ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ և Է. Ա. ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ**

Ուսումնասիրվել է դարչնաթթվի և պ-ֆտորֆենոլի կոնդենսացիան քաղցախաթթվի և ծծմբական թթվի ներկայությամբ: Անջատված 6-ֆտոր-4-ֆենիլ-խրոման-2-ոնը վերածվել է 3-(5-ֆտոր-2-հիդրօքսիֆենիլ)-3-ֆենիլպրոպիոնաթթվի և ամիդների: Ուսումնասիրվել է ամիդների հակաարիթմիկ հատկությունը:

SYNTHESIS OF N-SUBSTITUTED AMIDES OF 3-(5-FLUORO-2-HYDROXYPHENYL)-3-PHENYLPROPIONIC ACID

**R. S. BALAYAN, T. O. ASATRYAN, H. V. GRYGORYAN, K. J. MARKARYAN,
H. G. KHACHATRYAN and E. A. MARKARYAN**

Scientific and Technological Centre
of Organic and Pharmaceutical Chemistry NAS RA

A. L. Mnjoyan Institute of Fine Organic Chemistry
Armenia, 0014, Yerevan, Azatutyan str., 26

E-mail: NARA54@mail.ru

The condensation of cinnamic acid and p-fluorophenol was studied in presence of acetic and sulfuric acids. Separated 6-fluoro-4-phenylchromane-2-one was transferred into N-substituted amides of 3-(5-fluoro-2-hydroxyphenyl)-3-phenylpropionic acid. Antiarhythmic properties of amides were studied.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] *Балаян Р.С., Асатрян Т.О., Маркарян К.Ж., Маркарян Э.А.* // Хим. ж. Армении, 2004, т. 57, №4, с. 83.
- [2] *Балаян Р.С., Маркарян Э.А.* // Арм. хим. ж., 1979, т. 32, №8, с. 673.
- [3] *Балаян Р.С., Маркарян Э.А., Хачатрян А.Г.* // Хим. ж. Армении, 2004, т. 59, №4, с. 125.
- [4] *Erhart G.* // Arch.Pharm., 1962, v.295, p.196.
- [5] *Simpson I.D.* // J.Chem.Soc., 1956, v.53, p.1382
- [6] *Каверина Н.В., Бердяев С.Ю., Кищук Е.П., Ласкина О.Е.* / В сб. “Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ”. М., 2000, с. 209.