ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՎԱԴԵՍԻԱ
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ
АРМЕНИЯ

Հայաստանի քիմիական հանդես 63, №2, 2010 Химический журнал Армении

УДК 547.833.7.

СИНТЕЗ N-ЗАМЕЩЕННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ
(1-МЕТИЛ-3-ФЕНИЛПРОПИЛ)АМИНА

А. П. МИКАЕЛЯН

Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии
НАН Республики Армения

Институт тонкой органической химии им.А. Л. Мнджояна

Армения, 0014, Ереван, пр. Азатутян, 26

Факс: (28-83-37) E-mail: anush27@mail.ru

Поступило 31 III 2010

С целью синтеза ряда N-замещенных соединений – аминоспиртов, эфиров и N-ацетилпроизводных, конденсацией (1-метил-3-фенилпропил)амина с цианистым натрием, ацетоном или формалином в водной среде в присутствии кислоты, а также с акрилонитрилом в бензоле в присутствии гидрохлорида диэтиламина получены соответствующие аминонитрилы.

Библ. ссылок 9.

Производные аминокислот с нитрильными, арилалканольными и другими фармакофорными группами широко используются как ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента [1, 2].

Цель настоящей работы – синтез веществ с вышеуказанными фармакофорными группами, являющихся нециклическими аналогами ранее полученных изохинолинов [3, 4].

В качестве исходного вещества был использован (1-метил-3-фенилпропил)амин (1), взаимодействием которого с акрилонитрилом в бензоле в присутствии гидрохлорида диэтиламина (а), а также цианэтированием его эквимолярными количествами цианистого натрия и ацетона или формалина в кислом водном растворе (б) с хорошими выходами получены соответствующие аминонитрилы 2-4 по следующей схеме:

В ИК-спектрах полученных нитрилов имеются полосы поглощения при 2210 и 2220 cm^{-1} , характерные для C-N-группы, а также при 3310 и 3340 cm^{-1} – для N-H-группы, соответственно.

Полученные нитрилы, содержащие вторичную аминогруппу, были введены во взаимодействие с оксиранами – 3-фенокси-1,2-эпоксипропаном (А) и окисью *m*-нитростирола (Б), этилакрилатом и ацетилхлоридом. В результате были получены соответствующие аминоспирты 5-8, эфиры 9-11 и N-ацетилпроизводные 12, 13.

5-7. R = CH₂CN, CH₂CH₂CN, C(CH₃)₂CN; R' = CH₂OC₆H₅

8. R = CH₂CH₂CN; R' = (*m*-NO₂)C₆H₄

9. R = CH₂CN

10, 12. R = CH₂CH₂CN;

11, 13. R = C(CH₃)₂CN

Для однозначного проведения реакции с окисями в предыдущих работах были соблюдены определенные условия, обеспечивающие максимальный эффект реакции: молярное соотношение реагентов [5], полярность растворителя, присутствие катализатора (H₂O, кислоты или ультразвука [6,7] и т.д.).

Исходя из вышеизложенного в настоящей работе для раскрытия эпоксидного кольца оксираны **A** и **B** были взяты в двухкратном избытке, что привело к целевым продуктам с высокими выходами. В случае не замещенных в α -положении аминонитрилов **2** и **3**, из-за сильного отрицательного индуктивного эффекта нитрильной группы, реакционная способность аминной группы занижена, вследствие чего они реагирует с этилакрилатом и оксиранами **A** и **B** лишь при дальнейшем кипячении в присутствии кислого катализатора. Раскрытие эпоксидного кольца оксирана **A** аминонитрилом **4**, а также взаимодействие **4** с этилакрилатом было осуществлено под действием ультразвука [8,9] с выходами порядка 70-90%.

Строение соединений **2-13** подтверждено данными ИК- и ЯМР ¹H-спектров, чистота проверена хроматографически.

Экспериментальная часть

ИК-спектры сняты на приборе "UR-20" в вазелиновом масле, спектры ЯМР ¹H – на спектрометре "Вариан Т-60" с рабочей частотой 60 МГц, внутренний стандарт – тетраметилсилан. ТСХ проведена на силуфоле "UV-254" в системе бензол–ацетон, 4:1. Проявитель – пары йода. Температуры плавления определяли на микронагревательном столике марки "Voetius".

Синтез 3-[(1-метил-3-фенилпропил)амино]пропионитрила (2). Смесь 14.9 г (0,1 моля) соединения **1** и 5.3 г (0.1 моля) акрилонитрила в 100 мл бензола держат 48 ч при комнатной температуре. После этого делается хроматографический контроль реакционной смеси на силуфоле. Реакционную смесь промывают водой, бензол отгоняют, остаток перегоняют в вакууме. Выход соединения **2** 8.7 г (43.0%), т.кип. 165-168°C/3 мм, R_f 0.72. ИК-спектр, ν , см⁻¹: 1650 (C=C, аром.), 2220 (C(N), 3100 (N-H). Спектр ЯМР ¹H, δ , м.д., Гц: 1.08 (д, 3H, CH₃, J = 6.8); 1.50-1.83 (м, 4H, PhCH₂CH₂); 2.52 (т, 2H, CH₂CH₂CN, J = 7.0); 2.7 (уш. с, 1H, NH); 2.83 (т, 2H, CH₂CH₂NH, J = 7.0); 3.06-3.12 (м, 1H, CHCH₃); 7.12-7.30 (м, 5H, Ar).

Синтез гидрохлорида [(1-метил-3-фенилпропил)амино]ацетонитрила (3). К 50.7 г (0.34 моля) соединения **1** в 680 мл воды при перемешивании по каплям добавляют 10.2 мл HCl до pH 2-3, затем прибавляют 34 мл (0.34 моля) формалина и в течение 30 мин по каплям добавляют 16.6 г (0,34 моля) цианистого натрия в 25 мл воды. Реакционную смесь оставляют на ночь, экстрагируют эфиром (2(50 мл), промывают водой, растворитель отгоняют, остаток растворяют в абс. эфире и под действием эфир-

ного раствора HCl переводят в гидрохлорид. Выход соединения **3** 30.0 г (46.2%), т.пл. 138-141°C (из ацетона), R_f 0.74. Найдено, %: С 76.58; Н 8.70; N 15.02. $C_{12}H_{17}ClN_2$. Вычислено, %: С 76.55; Н 8.50; N 14.8. ИК-спектр, ν , cm^{-1} : 1650 (C=C, аром.), 2210 (C(N), 3340 (N-H). Спектр ЯМР 1H , δ , м.д., Гц: 0.96 (уш. с, 1H, NH); 1.16 (д, 3H, CH_3 , $J = 7.0$); 1.72-1.99 (м, 2H, $PhCH_2CH_2$); 2.68-2.71 (м, 2H, $PhCH_2CH_2$); 2.73-2.89 (м, 1H, $CHCH_3$); 3.30-3.45 (к, 2H, $NHCH_2CN$, $J = 7.0$); 7.10-7.30 (м, 5H, Ar).

Гидрохлорид 2-метил-2-[(1-метил-3-фенилпропил)амино]пропионитрила (4) получен аналогично **3** из 0.16 моля соединения **1**, 0.16 моля ацетона и 0.16 моля цианистого натрия. Выход соединения **4** 31.4 г (90.9%), т.пл. 143-144°C (из ацетона), R_f 0.62. Найдено, %: С 78.06; Н 9.11; N 13.20. $C_{14}H_{21}ClN_2$. Вычислено, %: С 77.73; Н 9.31; N 12.95. ИК-спектр, ν , cm^{-1} : 1690 (C=C, аром.), 2220 (C(N), 3310 (N-H). Спектр ЯМР 1H , δ , м.д., Гц: 0.44 (уш. с, 1H, NH); 1.19 (д, 3H, CH_3 , $J = 7.0$); 1.45 (с, 6H, 2 CH_3); 1.72-1.98 (м, 2H, $PhCH_2CH_2$); 2.68-2.73 (м, 2H, $PhCH_2CH_2$); 3.07-3.15 (м, 1H, CH_3CH); 7.20-7.35 (м, 5H, Ar).

Синтез гидрохлорида [(2-гидрокси-3-феноксипропил)(1-метил-3-фенилпропил)амино]ацетонитрила (5). К раствору 5.64 г (0.03 моля) соединения **3** в 100 мл бензола прибавляют 9.01 г (0.06 моля) оксирана **A** и 3.28 г (0.03 моля) гидрохлорида диэтиламина. Смесь кипятят при перемешивании 12 ч. Растворитель отгоняют, остаток растворяют в абс. эфире и под действием эфирного раствора HCl переводят в гидрохлорид. Выход соединения **5** 6.1 г (60.0%), т.пл. 126-128°C (из ацетона), R_f 0.53. Найдено, %: N 7.10; Cl 9.0. $C_{21}H_{27}ClN_2O$. Вычислено, %: N 7.47; Cl 9.45. ИК-спектр, ν , cm^{-1} : 3200-3400 (O-H); 2240 (C(N); 1600 (C=C, аром). Спектр ЯМР 1H , δ , м.д., Гц: 1.10 (д, 3H, CH_3 , $J = 7.0$); 2.44-2.79 (м, 6H, $PhCH_2CH_2$, NCH_2CH); 3.54 (к, 2H, NCH_2CN , $J = 7.8$); 3.04 (м, 1H, $CHCH_3$); 3.65 (уш. с, 2H, $CHOH$, $NCHOH$); 3.79-4.02 (м, 2H, CH_2OPh); 6.72-7.28 (10 H, Ar).

Синтез гидрохлорида 3-[(2-гидрокси-3-феноксипропил)(1-метил-3-фенилпропил)амино]пропионитрила (6). Смесь 3.84 г (0.019 моля) соединения **2** и 5.7 г (0.038 моля) оксирана **A** в изопропиловом спирте кипятят с обратным холодильником 12 ч. Растворитель отгоняют, перегоняют в вакууме, т.кип. 228-230°C/1 мм, растворяют в абс. эфире и под действием эфирного раствора HCl переводят в гидрохлорид. Выход соединения **6** 4.0 г (59.7%), т.пл. 124-126°C (из ацетона), R_f 0.62. Найдено, %: N 6.89; Cl 9.50. $C_{22}H_{29}ClN_2O_2$. Вычислено, %: N 7.20; Cl 9.11. Спектр ЯМР 1H , δ , м.д., Гц: 0.96 (д, 3H, CH_3 , $J = 7.0$); 2.25-2.55 (м, 2H, $PhCH_2CH_2$); 2.64-2.81 (м, 8H, $PhCH_2CH_2$, NCH_2CH_2 , NCH_2CH); 3.24 (уш. с, 1H, $CHCH_3$); 3.36 (д, 1H, $CHOH$, $J = 7.0$); 3.65 (уш. с, 1H, $CHOH$); 3.79-4.02 (м, 2H, CH_2OPh); 6.71-7.28 (м, 10H, Ar).

Синтез цитрата 2-[(2-гидрокси-3-феноксипропил)(1-метил-3-фенилпропил)амино]-2-метилпропионитрила (7). Смесь 3.24 г (0.015 моля) соединения **4** и 4.5 г (0.03 моля) оксирана **A** в 30 мл изопропилового спирта подвергают действию ультразвука (УЗ), поддерживая температуру не выше 35°C (ход реакции контролируют с

помощью ТСХ на силуфоле). В качестве источника УЗ использован аппарат “УЗТ-101”, режим работы нормальный, частота колебаний 0.88 МГц, интенсивность 1.0 Вт/см². По окончании реакции растворитель отгоняют, остаток растворяют в абс. эфире и под действием эфирного раствора лимонной кислоты переводят в цитрат. Выход соединения **7** 4.3 г (78.3%), т.пл. 107-108°C (из этанола), R_f 0.57. Найдено, %: С 75.87; Н 7.75; N 7.57. C₂₃H₃₀N₂O₂·1/3 C₆H₈O₇. Вычислено, %: С 75.37; Н 8.25; N 7.64. Спектр ЯМР ¹H, δ, м.д., Гц: 1.20 (д, 3H, CH₃, J=7.0); 1.53 (с, 6H, 2CH₃); 1.96-2.25 (м, 2H, PhCH₂CH₂); 2.62-2.78 (м, 4H, PhCH₂CH₂, NCH₂CHOH); 3.15-3.19 (м, 1H, CHCH₃); 3.65 (уш. с, 1H, OH); 3.83 (д, 1H, CHOH, J = 7.0); 3.99-4.03 (м, 2H, PhOCH₂); 6.72-7.28 (м, 10H, Ar).

Гидрохлорид 3-[[2-гидрокси-2-(4-нитрофенил)этил]-(1-метил-3-фенилпропил)амино]пропионитрила (8) получен аналогично **7** из 0.019 моля соединения **2**, 0.038 моля оксирана **Б** и 2 мл воды. Выход соединения **8** 6.5 г (93.1%), т.пл. 162-164°C (из ацетона), R_f 0.36. Найдено, %: N 10.10; Cl⁻ 8.41. C₂₁H₂₆ClN₃O₃. Вычислено, %: N 10.40; Cl⁻ 8.77. Спектр ЯМР ¹H, δ, м.д., Гц: 0.95 (д, 3H, CH₃, J = 7.0); 2.30-2.50 (м, 2H, PhCH₂CH₂); 2.65-2.85 (м, 8H, PhCH₂CH₂CHN(CH₂)₃); 3.25 (м, 1H, CHCH₃); 3.9 (уш. с, 1H, CHOH); 4.65 (т, 1H, PhCHOH, J = 7.0); 7.160-7.96 (м, 10H, Ar).

Гидрохлорид этилового эфира N-(цианоэтил)-N-(1-метил-3-фенилпропил)-β-аланина (9) получен аналогично **5** из 0.03 моля соединения **3**, 0.03 моля этилакрилата и 0.03 моля гидрохлорида диэтиламина. Выход соединения **9** 4.2 г (48.5%), т.пл. 106-108°C (из ацетона), R_f 0.8. Найдено, %: N 8.30; Cl⁻ 10.60. C₁₇H₂₅ClN₂O₂. Вычислено, %: N 8.62; Cl⁻ 10.91. ИК-спектр, ν, см⁻¹: 3300-3400 (>N-H); 2240 (C(N)); 1720 (сложн. эфир); 1600 (C=C, аром.). Спектр ЯМР ¹H, δ, м.д., Гц: 1.12 (д, 3H, CH₃CH, J = 7.0); 1.22 (т, 3H, CH₃CH₂O, J = 7.0); 2.50-2.72 (м, 2H, PhCH₂CH₂); 2.58 (т, 2H, NCH₂CH₂, J = 7.0); 2.73-2.89 (м, 4H, PhCH₂CH₂, NCH₂CH); 3.2 (уш. с, 1H, CHCH₃); 3.65 (с, 2H, NCH₂CN); 4.10 (к, 2H, OCH₂CH₃, J = 7.0); 7.10-7.35 (м, 5H, Ar).

Гидрохлорид этилового эфира N-(2-цианоэтил)-N-(1-метил-3-фенилпропил)-β-аланина (10) получен аналогично **5** из 0.024 моля соединения **2**, 0.024 моля этилакрилата и 0.024 моля гидрохлорида диэтиламина. Выход соединения **10** 3.64 г (50.2%), т.пл. 129-131°C (из ацетона), R_f 0.6. Найдено, %: N 7.90; Cl⁻ 10.10. C₁₈H₂₇ClN₂O₂. Вычислено, %: N 8.26; Cl⁻ 10.46. Спектр ЯМР ¹H, δ, м.д., Гц: 0.96 (д, 3H, CH₃CH, J = 7.0); 1.22 (т, 3H, CH₃CH₂O, J = 7.0); 1.45-2.10 (м, 4H, PhCH₂CH₂); 2.20-2.90 (м, 8H, NCH₂CH₂CN, NCH₂CH₂CO), 2.82-2.84 (м, 1H; CH₃CH); 4.10 (к, 2H, OCH₂CH₃, J = 7.0); 7.10-7.25 (м, 5H, Ar).

Гидрохлорид этилового эфира N-(1-циано-1-метилэтил)-N-(1-метил-3-фенилпропил)-β-аланина (11) получен аналогично **7** из 0.015 моля соединения **4** и 0.022 моля этилакрилата в 110 мл бензола. Выход соединения **11** 2.54 г (53.5%), т.пл. 139-141°C (из ацетона), R_f 0.68. Найдено, %: С 71.80; Н 8.50; N 9.18. C₁₉H₂₉ClN₂O₂. Вычислено, %: С 72.11; Н 8.91; N 8.85. Спектр ЯМР ¹H, δ, м.д., Гц: 1.16 (т, 3H, CH₃CH₂O, J =

7.0); 1.20 (д, 3H, CH_3CH , $J = 6.5$); 1.37 (с, 3H, CH_3); 1.40 (с, 3H, CH_3); 1.45-2.10 (м, 4H, PhCH_2CH_2); 2.50 (т, 2H, $\text{CH}_2\text{COOC}_2\text{H}_5$, $J = 7.0$); 2.75 (т, 2H, CH_2N , $J = 7.0$); 3.30-3.60 (м, 1H, CHN); 4.04 (к, 2H, $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}$, $J = 7.0$); 7.7 (уш. с, 5H, Ar).

Синтез N-(2-цианоэтил)-N-(1-метил-3-фенилпропил)ацетамида (12). К смеси 6.06 г (0.03 моля) соединения **2** в 100 мл бензола и 4.89 мл (0.06 моля) пиридина при перемешивании по каплям добавляют 4.28 мл (0.06 моля) ацетилхлорида. Оставляют на ночь, на следующий день нагревают при 40°C, фильтруют, фильтрат промывают водой, бензол отгоняют, остаток кристаллизуют из эфира. Выход соединения **12** 5.51 г (75.1%), т.пл. 127-129°C (из ацетона), R_f 0.44. Найдено, %: С 73.41; Н 7.96; N 11.21. $\text{C}_{15}\text{H}_{20}\text{N}_2\text{O}$. Вычислено, %: С 73.73; Н 8.25; N 11.46. Спектр ЯМР ^1H , δ , м.д., Гц: 1.35 (д, 3H, CH_3CH , $J = 7.0$); 1.80-2.09 (м, 2H, PhCH_2CH_2); 2.20 (с, 3H, COCH_3); 2.48-2.52 (м, 2H, PhCH_2CH_2); 2.72 (д, 2H, $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CN}$, $J = 6.9$); 3.25 (д, 2H, $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CN}$, $J = 6.9$); 4.70-4.80 (м, 1H, CHCH_3); 7.02-7.25 (м, 5H, Ar).

N-(1-Циано-1-метилэтил)-N-(1-метил-3-фенилпропил)ацетамид (13) получен аналогично **12** из 0.029 моля соединения **4** в 100 мл бензола, 0.058 моля пиридина и 0.058 моля ацетилхлорида. Выход соединения **13** 6.9 г (92.1%), т.пл. 134-137°C (из ацетона), R_f 0.74. Найдено, %: С 70.8; Н 7.86; N 9.87. $\text{C}_{16}\text{H}_{22}\text{N}_2\text{O}$. Вычислено, %: С 71.1; Н 8.08; N 9.7. Спектр ЯМР ^1H , δ , м.д., Гц: 1.2 (д, 3H, CH_3 , $J = 7.0$); 1.58 (с, 6H, 2 CH_3 , CH_3CHCH_3); 1.8-2.1 (м, $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}$); 2.22 (с, 3H, CH_3CO); 2.50-2.55 (м, PhCH_2CH_2); 3.4 (д, 1H, CHCH_3 , $J = 7.0$); 7.0-7.2 (м, 5H, Ar).

(1-ՄԵԹԻԼ-3-ՖԵՆԻԼՊՐՈՊԻԼ)ԱՄԻՆԻ N-ՏԵՂԱԿԱԼՎԱԾ ԱԾԱՆՑՑԱԼՆԵՐԻ ՄԻՆԹԵԶԸ

Հ. Պ. ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ

Իրականացվել է (1-մեթիլ-3-ֆենիլպրոպիլ)ամինի կոնդենսացիան նատրիումի ցիանիդի, ացետոնի կամ ֆորմալինի հետ ջրային միջավայրում, ինչպես նաև ակրիլոնիտրիլի հետ՝ բենզոլում դիէթիլամինի հիդրոքլորիդի ներկայությամբ: Ստացված են համապատասխան ամինոնիտրիլներ, որոնց հիման վրա սինթեզվել են N-տեղակալված միացություններ: Ու-սուլմնասիրվել են ռեակցիայի ընթացքի համար անհրաժեշտ այն օպտիմալ պայմանների առկայության ապահովումը, որոնց դեպքում ռեակցիայի էֆեկտիվությունը և ելքը կլինեն առավելագույնը: Այդ պայմաններից են լուծիչի բևեռայնությունը, ելանյութերի քանակական հարաբերությունը, կատալիզատորի (թթվի, ջրի կամ ուլտրաձայնի) առկայությունը:

SYNTHESIS OF N- SUBSTITUTED DERIVATIVES OF (1-METHYL-3- PHENYLPROPYL)AMINE

H. P. MIQAELYAN

The Scientific Technological Center of Organic
and Pharmaceutical Chemistry NAS RA
A. L. Mnjoyan Institute of Fine Organic Chemistry
26 Azatutyun Str., 0014, Yerevan, Armenia
Fax: (28-83-37) E-mail: anush 27@ mail.ru

By condensation of 1-methyl-3-phenylpropylamine with sodium cyanide, acetone or formaline in the water solution in the presence of acid, as well as with acrylonitrile in benzene in the presence of diethylamine hydrochloride were obtained corresponding aminonitriles based on which a series of N-substituted compounds were synthesized. To provide the efficiency of the reaction and high yield, optimal conditions should be maintained: ie polarity of the solvent, the proportion of initial substances, the presence of a catalyst (acid, water, or ultrasound, etc.).

ЛИТЕРАТУРА

- [1] *Сидоренко Б.А., Преображенский Д.Б., Савина Н.М.* // Кардиология, 1998, т. 6, с.82.
- [2] *Никифоров В.С., Свистов А.С.* // ФАРМиндекс-Практик, 2005, т.7, с.21.
- [3] *Маркарян Э.А., Айрапетян Г.К., Микаелян А.П.* // Тезисы докладов VIII Международной конференции по синтезу биологически активных соединений, Ереван, 1986, 16-20 сентября.
- [4] *Маркарян Э.А., Айрапетян Г.К., Микаелян А.П., Маркарян К.Ж., Асатрян Т.О., Норавян О.С.* // Хим.- фарм. ж., 1997, т. 31, №2, с. 20.
- [5] *Маркарян Э.А., Айрапетян Г.К., Микаелян А.П., Маркарян К.Ж., Норавян О.С.* // Хим.- фарм. ж., 1994, т. 28, №1, с. 22.
- [6] *Айрапетян Г.К., Арустамян Ж.С., Норавян О.С., Маркарян К.Ж., Маркарян Э.А.* // Арм. хим. ж., 1987, т. 40, №1, с. 40.
- [7] *Бархударян М.Р., Вартамян А.А., Норавян О.С., Авакян О.М.* // Арм. хим. ж., 1984, т., 37, №10, с. 703.
- [8] *Айрапетян Г.К., Маркарян Р.Э., Арзанунц Э.М., Саркисян И.С., Сафразбекян Р.Р., Маркарян Э.А.* // Хим.- фарм. ж., 1984, №6, с. 686.
- [9] *Маркарян Э.А., Айрапетян Г.К., Маркарян Р.Э.* // Арм. хим. ж., 1987, т. 40, №12, с. 761.