ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ
АРМЕНИЯ

Հայաստանի քիմիական հանդես 64, №2, 2011 Химический журнал Армении

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 547.816:547859:547•834 + 615•213

СИНТЕЗ НОВЫХ КОНДЕНСИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ПИРАНО[3',4':5,6]ПИРИДО[3,2:4'',5'']ФУРО[3'',2''-d]ПИРИМИДИНОВ

В. В. ДАБАЕВА, М. Р. БАГДАСАРЯН, А. С. НОРАВЯН,
И. А. ДЖАГАЦПАНЯН и М. А. МАНУШАКЯН

Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии
НАН Республики Армения
Институт тонкой органической химии им. А. Л. Мнджояна
Армения, 0014, Ереван, пр. Азатутян, 26
E-mail: noravyan@mail.ru

Поступило 3 XI 2010

На основе 2-оксо-3-цианопроизводного пирано[4,3-b]пиридина осуществлен синтез новых аминопроизводных пирано[3',4':5,6]пиридо[3,2:4'',5'']фууро[3'',2''-d]пиримидинов и исследована их нейротропная активность.

Библ. ссылок 3.

Конденсированные тиеноаналоги фуоропиримидинов обладают ценными биологическими свойствами, в том числе высокой противосудорожной и транквилизирующей активностью [1,2].

Целью настоящего исследования была разработка метода синтеза производных новой гетеросистемы — конденсированного фууро[3'',2''-d]пиримидина, и изучение их фармакологической активности. В качестве исходного соединения было использовано 2-оксо-3-цианопроизводное пирано[4,3-b]пиридина (1) [3], взаимодействием которого с этиловым эфиром хлоруксусной кислоты был синтезирован эфир (2). Последний при кипячении в спиртовом растворе алкоголята натрия циклизуется в аминоефир конденсированного фууро[2,3-b]пиридина (3). Реакция Ниментовского, проведенная нагреванием в формамиде, приводит к образованию пиримидинового кольца. Для установления влияния характера заместителей в положении 4 на биологическую активность получен-

ных соединений была проведена реакция хлордегидроксилирования под действием хлорокси фосфора, причем установлено, что присутствие пиридина значительно повышает выход соответствующего хлорпроизводного. Дальнейшее нуклеофильное замещение атома хлора различными аминами идет гладко и позволяет получать целевые продукты с высоким выходом.

Биологические исследования выявили соединения **2**, **3** и **6d** со способностью удлинять сон, вызываемый гексоналом, а также со слабым антикоразоловым действием. По степени выраженности антикоразоловой активности они уступают диазепаму, но значительно эффективнее последнего по снотворному действию.

Экспериментальная часть

ИК-спектры сняты на спектрометре “UR-20” в вазелиновом масле, спектры ЯМР¹H – на “Mercury 300” в ДМСО-d₆. Масс-спектры получены на приборе “MX-1320” с системой прямого ввода образца в источник ионов. ТСХ проведена на пластинках “Silufol UV-254” в системах этилацетат–петролейный эфир, 1:1 (**2**, **3**, **6**) и пиридин–бутанол, 1:3 (**5**). Проявитель – пары йода.

Этил-2-(7,7-диметил-3-циано-7,8-дигидро-5H-пирано[4,3-b]пиридинил-2-окси)-ацетат (2). К раствору 2.04 г (0.01 моля) соединения **1** в 15 мл абсолютного ДМФ добавляют 1.5 г (0.01 моля) поташа и при перемешивании прикапывают 1.22 г (0.01 моля) этилового эфира хлоруксусной кислоты. Смесь нагревают при 75°C 2 ч. После охлаждения содержимое колбы, постепенно перемешивая, выливают на лед, выпавшие кристаллы отфильтровывают, промывают водой и перекристаллизовывают из этанола. Выход 1.7 г (59.4%), т. пл. 86–87°C. R_f 0.75. ИК-спектр, ν, см⁻¹: 1580, 1620 (аром.); 1680 (C=O); 2240 (CN). Спектр ЯМР¹H, δ, м. д., Гц: 1.26 [с, 6H, -(CH₃)₂]; 1.27 (т, 3H, OCH₂CH₃, J=7.1); 2.69 (с, 2H, 8-CH₂); 4.19 (к,

2H, OCH_2CH_3 , $J=7.1$); 4.66 (с, 2H, 5- CH_2); 4.93 (с, 2H, $\text{O}=\text{C}-\text{CH}_2$); 7.88 (с, 1H, 4-CH).
Найдено, %: С 62.11; Н 6.41; N 9.58. $\text{C}_{15}\text{H}_{18}\text{N}_2\text{O}_4$. Вычислено, %: С 62.05; Н 6.25; N 9.65.

3-Амино-7,7-диметил-2-этоксикарбонил-7,8-дигидро-5Н-пирано[3,4-*b*]фу-ро-[2,3-*b*]пиридин (3). К этилату натрия, приготовленному из 0.28 г (0.012 моля) натрия и 45 мл абсолютного этанола прибавляют 2.9 г (0.01 моля) соединения 2 и смесь перемешивают при 50°C в течение 1 ч. Затем кипятят 10 мин и после охлаждения добавляют воду. Выпавшие кристаллы отфильтровывают, промывают водой, этанолом. Выход 1.8 г (62.1%), т. пл. 222-223°C (этанол). R_f 0.58. ИК-спектр, ν , см^{-1} : 1540, 1580 (аром.); 3180; 3280, 3410 (NH_2). Спектр ЯМР¹H, δ , м. д., Гц: 1.29 [с, 6H, $-(\text{CH}_3)_2$]; 1.41 (т, 3H, CH_2-CH_3 , $J=7.1$); 2.86 (с, 2H, 8- CH_2); 4.33 (к, 2H, OCH_2 , $J=7.1$); 4.82 (с, 2H, 5- CH_2); 6.15 (с, 2H, NH_2); 7.99 (с, 1H, 4-CH). Найдено, %: С 62.22; Н 6.38; N 9.71. $\text{C}_{15}\text{H}_{18}\text{N}_2\text{O}_4$. Вычислено, %: С 62.05; Н 6.25; N 9.65.

8,8-Диметил-4-оксо-3,4,7,8-тетрагидро-10Н-пирано[3',4':5,6]пиридо[3,2:4'',5''']-фууро[3'',2''-d]пиримидин (4). 2.9 г (0.01 моля) амина 3 в 22 мл формамида кипятят в течение 3 ч. После охлаждения к реакционной смеси добавляют воду, выпавшие кристаллы отфильтровывают, промывают водой, этанолом. Выход 2.3 г (84.8%), т. пл. 310-311°C (этанол). ИК-спектр, ν , см^{-1} : 1550, 1600 (аром., $\text{C}=\text{C}$, $\text{C}=\text{N}$ сопр.); 1680 ($\text{C}=\text{O}$); 3110 (NH). Спектр ЯМР¹H, δ , м. д.: 1.32 [с, 6H, $-(\text{CH}_3)_2$]; 2.96 (с, 2H, 7- CH_2); 4.90 (с, 2H, OCH_2); 8.04 (с, 1H, 2-CH); 8.13 (с, 1H, 11-CH); 12.90 (уш. с, 1H, NH). Масс-спектр, m/z , %: 271 (11) (M^+), 256 (8), 215 (6), 214 (27), 213 (100), 197 (22), 130 (8), 43 (7), 28 (6). Найдено, %: С 62.10; Н 4.89; N 15.29. $\text{C}_{14}\text{H}_{13}\text{N}_3\text{O}_3$. Вычислено, %: С 61.98; Н 4.83; N 15.49.

8,8-Диметил-4-хлоро-7,8-дигидро-10Н-пирано[3',4':5,6]пиридо[3,2:4'',5'''] фууро[3'',2''-d]пиримидин (5). К смеси 2.7 г (0.01 моля) соединения 4 добавляют 16 мл POCl_3 и 1.6 мл пиридина и нагревают при 105°C в течение 3 ч. Избыток хлорокиси фосфора и пиридина удаляют при пониженном давлении, остаток обрабатывают льдом и раствором водного аммиака до слабощелочной реакции. Кристаллы отфильтровывают, промывают водой, эфиром. Выход 1.7 г (58.6%), т. пл. 179-180°C (этанол). R_f 0.53. ИК-спектр, ν , см^{-1} : 1520, 1560, 1600 (аром., $\text{C}=\text{C}$, $\text{C}=\text{N}$ сопр.). Спектр ЯМР¹H, δ , м. д.: 1.34 [с, 6H, $-(\text{CH}_3)_2$]; 3.01 (с, 2H, 7- CH_2); 4.94 (с, 2H, OCH_2); 8.39 (с, 1H, 11-CH); 8.93 (с, 1H, 2-CH). Масс-спектр, m/z , %: 290 (81) (M^+), 232 (100), 204 (24), 186 (26), 160 (28), 130 (12), 77 (9), 43 (10). Найдено, %: С 58.23; Н 4.05; Cl 12.36; N 4.33. $\text{C}_{14}\text{H}_{12}\text{ClN}_3\text{O}_2$. Вычислено, %: С 58.04; Н 4.17; Cl 12.24, N 14.50

Общая методика получения соединений ба-f. Смесь 2.9 г (0.01 моля) соединения 5 и 0.03 моля соответствующего амина в 30 мл абсолютного этанола кипятят с обратным холодильником в течение 6 ч. Этанол удаляют, к остатку приливают воду, образовавшиеся кристаллы отфильтровывают.

вают, промывают водой, эфиром и высушивают. Перекристаллизовывают из этанола. ИК-спектр, ν , см^{-1} : 1600, 1560, 1520 (C=N сопр., C=C аром.).

4-(β -Диэтиламиноэтил)амино-8,8-диметил-7,8-дигидро-10Н-пирано[3',4':5,6]-пиридо[3,2:4'',5'']фууро[3'',2''-d]пиримидин (6a). Выход 76%, т. пл. 209-210°C. R_f 0.66. Спектр ЯМР¹H, δ , м. д., $G\text{ц}$: 1.05 [т, 6H, N-(CH₂CH₃)₂], J=7.1]; 1.3 [с, 6H, -(CH₃)₂]; 2.60 (м, 4H, N-(CH₂CH₃)₂); 2.71 (м, 2H, NCH₂); 2.93 (с, 2H, 7-CH₂); 3.62 (к, 2H, NHCH₂, J=6.5); 4.90 (с, 2H, 10-CH₂); 7.55 (м, 1H, NH); 8.16 (с, 1H, 11-CH); 8.35 (с, 1H, 2-CH). Найдено, %: С 65.27; Н 7.24; N 19.12. C₂₀H₂₇N₅O₂. Вычислено, %: С 65.10; Н 7.38; N 18.98.

8,8-Диметил-4-(N-морфолилэтил)амино-7,8-дигидро-10Н-пирано[3',4':5,6]пиридо[3,2:4'',5'']фууро[3'',2''-d]пиримидин (6b). Выход 82%, т. пл. 248-249°C. R_f 0.67. Спектр ЯМР¹H, δ , м. д., $G\text{ц}$: 1.32 [с, 6H, -(CH₃)₂]; 2.51 [м, 4H, N(CH₂)₂]; 2.62 (т, 2H, NCH₂, J=6.6); 2.94 (с, 2H, 7-CH₂); 3.61 [м, 4H, O(CH₂)₂]; 3.68 (т, д, 2H, NHCH₂, J=6.6 и J=6.0); 4.90 (с, 2H, 10-CH₂); 7.72 (т, 1H, NH, J=6.0); 8.16 (с, 1H, 11-CH); 8.34 (с, 1H, 2-CH). Найдено, %: С 62.68; Н 6.39; N 18.21. C₂₀H₂₅N₅O₃. Вычислено, %: С 62.64; Н 6.57; N 18.26.

8,8-Диметил-4-(γ -метоксипропил)амино-7,8-дигидро-10Н-пирано[3',4':5,6]пиридо[3,2:4'',5'']фууро[3'',2''-d]пиримидин (6c). Выход 71%, т. пл. 182-183°C. R_f 0.59. Спектр ЯМР¹H, δ , м. д., $G\text{ц}$: 1.32 [с, 6H, -(CH₃)₂]; 1.91 (оба т по 1H, OCH₂CH₂, J=6.2); 2.94 (с, 2H, 7-CH₂); 3.30 (с, 3H, OCH₃); 3.46 (т, 2H, OCH₂CH₂, J=6.2); 3.61 (т, д, 2H, NHCH₂, J=6.2 и J=5.9); 4.90 (с, 2H, 10-CH₂); 7.85 (т, 1H, NH, J=5.8); 8.16 (с, 1H, 11-CH); 8.34 (с, 1H, 2-CH). Найдено, %: С 63.31; Н 6.39; N 16.35. C₁₈H₂₂N₄O₃. Вычислено, %: С 63.14; Н 6.48; N 16.36.

8,8-Диметил-4-изоамиламино-7,8-дигидро-10Н-пирано[3',4':5,6]пиридо[3,2:4'',5'']фууро[3'',2''-d]пиримидин (6d). Выход 76%, т. пл. 214-215°C. R_f 0.72. Спектр ЯМР¹H, δ , м. д., $G\text{ц}$: 0.98 [д, 6H, CH-(CH₃)₂, J=6.5]; 1.32 [с, 6H, -(CH₃)₂]; 1.57 (м, 2H, CHCH₂); 1.74 (м, 1H, CHCH₂); 2.94 (с, 2H, 7-CH₂); 3.56 (м, 2H, NHCH₂); 4.90 (с, 2H, 10-CH₂); 7.83 (т, 1H, NH, J=5.9); 8.16 (с, 1H, 11-CH); 8.33 (с, 1H, 2-CH). Найдено, %: С 67.12; Н 7.30; N 16.39. C₁₉H₂₄N₄O₂. Вычислено, %: С 67.08; Н 7.11; N 16.46.

8,8-Диметил-4-циклогексиламино-7,8-дигидро-10Н-пирано[3',4':5,6]пиридо-[3,2:4'',5'']фууро[3'',2''-d]пиримидин (6e). Выход 83%, т. пл. 207-208°C. R_f 0.71. Спектр ЯМР¹H, δ , м. д.: 1.32 [с, 6H, -(CH₃)₂]; 1.18-1.52 (м, 5H); 1.70 (м, 1H); 1.83 (м, 2H); 1.99 (м, 2H) и 4.11 (м, 1H), C₆H₁₁. Найдено, %: С 68.23; Н 6.67; N 15.79; C₂₀H₂₄N₄O₂. Вычислено, %: С 68.19; Н 6.87; N 15.90.

4-N-Бензилэтаноламино-8,8-диметил - 7,8-дигидро-10Н-пирано [3',4':5,6]пиридо-[3,2:4'',5'']фууро[3'',2''-d]пиримидин (6f). Выход 70%, т. пл. 174-175°C. R_f 0.58. Спектр ЯМР¹H, δ , м. д.: 1.31 [с, 6H, -(CH₃)₂]; 2.92 (с, 2H, 7-CH₂); 3.79 (м, 2H, HOCH₂); 3.90 (м, 2H, NCH₂); 4.57 (м, 1H, OH); 4.91 (с, 2H, 10-

CH₂); 5.24 (с, 2H, NCH₂Ph); 7.19-7.34 (м, 5H, C₆H₅); 8.19 (с, 1H, 11- CH); 8.42 (с, 1H, 2-CH). Найдено, %: С 68.45; Н 6.12; N 13.99; C₂₃H₂₄N₄O₃. Вычислено, %: С 68.35; Н 5.98; N 13.86.

**ՊԻՐԱՆՈ[3Բ,4Բ:5,6]ՊԻՐԻԴՈ[3,2:4ԲԲ,5ԲԲ]ՖՈՒՐՈ[3ԲԲ,2ԲԲ-
d]ՊԻՐԻՄԻԴԻՆՆԵՐԻ ՆՈՐ ԱԾԱՆՑՑԱԼՆԵՐԻ ՍԻՆԹԵԶ**

**Վ. Վ. ԴԱԲԱԵՎԱ, Մ. Բ. ԲԱԴԱՏՍԱՐՅԱՆ, Ա. Ս. ՆՈՐԱՎՅԱՆ,
Ի. Ա. ԶԱԴԱՑՊԱՆՑԱՆ և Մ. Ա. ՄԱՆՈՒՇԱԿՅԱՆ**

Պիրանո[4,3-b]պիրիդինի 2-օքսո-3-ցիանոածանցյալների հիման վրա իրագործվել է պիրանո[3',4':5,6]պիրիդո[3,2:4'',5'']ֆուրո[3'2''-d]պիրիմիդինների նոր ամինածանցյալների սինթեզ և ուսումնասիրվել է նրանց նեյրոտրոպ ակտիվությունը:

**SYNTHESIS OF NEW DERIVATIVES OF PYRANO[3',4':5,6]-
PYRIDO[3,2:4'',5'']FURO[3'',2''-d]PYRIMIDINES**

**V. V. DABAEVA, M. R. BAGDASARYAN, A. S. NORAVYAN,
I. A. JAGATSSPANYAN and M. A. MANUSHAKYAN**

The Scientific and Technological Centre of Organic
and Pharmaceutical Chemistry NAS RA
A.L.Mnjoyan Institute of Fine Organic Chemistry
26, Azatutyan Str., Yerevan, 0014, Armenia
E-mail: noravyan@mail.ru

The synthesis of new amino derivatives of pyrano[3',4':5,6]pyrido[3,2:4'',5'']furo[3'2''-d]pyrimidines on the basis of 2-oxo-3-cyano derivatives of pyrano[4,3-b]pyridines was realized. The neurotropic activity of synthesized compounds has been investigated.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] *Пароникян Е.Г., Акопян Ш.Ф., Норавян А.С., Паносян Г.А., Степанян Г.М., Гарибджанян Б.Т., Джагацпанян И.А., Назарян И.М., Акопян А.Г.* // Хим.-фарм. ж., 2009, т. 43, №3, с. 59.
- [2] *Мкртчян А.П., Казарян С.Г., Норавян А.С., Акопян Р.А., Джагацпанян И. А., Назарян И.М., Акопян А.Г.* // Хим.-фарм. ж., 1998, т. 32, №9, с. 15.
- [3] *Дабаяева В.В., Пилосян С.Г., Енокян Б.Д., Абгарян Э.А., Норавян А.С.* // Арм. хим. ж., 1988, т. 41, №11, с. 687.