ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ
АРМЕНИЯ

Հայաստանի քիմիական հանդես 66, №2, 2013 Химический журнал Армении

УДК 547.787

СИНТЕЗ 4-АРИЛИДЕН-2-АРИЛ-1-(ТИАЗОЛ-2-ИЛ)-
1H-ИМИДАЗОЛ-5(4H)-ОНОВ

С. Р. ТОСУНЯН

Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии
НАН Республики Армения

Институт тонкой органической химии им. А.Л. Мнджояна
Армения, 0014, Ереван, пр.Азатутян, 26
E-mail: syuzitos@mail.ru

Поступило 20 III 2013

Исследована реакция циклизации 2-(N-бензоил- α,β -дегидрофенилаланил)аминотиазола с применением триметилхлорсилана, 1,1,1,3,3,3-гексаметилдисилазана или смеси триметилхлорсилана с триэтиламином как в условиях кипячения, так и микроволнового облучения реакционной смеси. Установлено, что сравнительно высокий выход (56.5%) целевого продукта – 4-бензилиден-2-фенил-1-(тиазол-2-ил)-1H-имидазол-5(4H)-она, получается при применении гексаметилдисилазана при облучении реакционной смеси (120 Вт) в течение 2.5 мин. Аналогично синтезирован ряд 4-арилиден-2-арил-1-(тиазол-2-ил)-1H-имидазол-5(4H)-онов.

Библ. ссылок 11.

1,2,4-Тризамещенные 5-имидазолы представляют большой интерес как физиологически активные вещества [1-4]. Обычно синтез этих веществ осуществляется многочасовым кипячением в пиридине ненасыщенных 5(4H)-оксазолонов с соответствующим амином [5] или циклизацией амидов ненасыщенных α,β -дегидроаминокислот с помощью дегидратирующих агентов. В качестве последних использовались ацетат натрия [6], хлорид цинка [7] или 1,1,1,3,3,3-гексаметилдисилазан (ГМДС) [8]. С целью разработки метода синтеза 5-имидазолонов, содержащих в положении 1 тиазольный остаток, мы исследовали реакцию циклизации 2-(N-бензоил- α,β -дегидрофенилаланил)аминотиазола в присутствии ГМДС, триметилхлорсилана (ТМХС) и смеси ТМХС с триэтиламином. Синтез 1-(2-тиазолил)-2-фенил-4-бензилиден-5-имидазолон (7) нами осуществлен двумя путями – нагреванием или микроволновым облучением реакционной смеси в ДМФА.

1, 7. $R^1 = R^2 = C_6H_5$; **4, 10.** $R^1 = C_6H_5$, $R^2 = C_6H_4NO_2-3$; **2, 8.** $R^1 = C_6H_5$, $R^2 = C_6H_4OCH_3-4$; **5, 11.** $R^1 = C_6H_4OCH_3-4$, $R^2 = C_6H_4Br-4$; **3, 9.** $R^1 = C_6H_5$, $R^2 = C_6H_4Cl-4$; **6, 12.** $R^1 = C_6H_4Br-4$, $R^2 = C_6H_5$.

HN

Так, кипячением смеси тиазолиламида N-бензоил- α,β -дегидрофенилаланина (**1**) с ГМДС в ДМФА в течение одного часа получен целевой продукт **7** с выходом 53.9%. Тот же продукт с выходом 56.5% получен нами микроволновым облучением реакционной смеси в ДМФА при 120 Вт в течение 2.5 мин. При замене ГМДС на ТМХС оказалось, что как при кипячении, так и микроволновом облучении реакция циклизации амида **1** сопровождается образованием 4-бензил-4-бензилиден-5(4H)-оксазолона. Отметим, что образование последнего в качестве побочного продукта наблюдается также при циклизации первичных амидов N-замещенных α,β -дегидроаминокислот с применением ТМХС [9].

Синтез имидазолонов **8-12** осуществляли микроволновым облучением смеси амида с ГМДС при 120 Вт в течение 5 мин, при этом выходы соединений **8-12** колеблются в пределах 51-91%.

Изучены антибактериальные свойства синтезированных имидазолонов **7-12**. При этом установлено, что, кроме соединения **9**, которое обладает слабым антибактериальным свойством, остальные имидазолы лишены активности в отношении грамположительных стафилококков (*St. aureus* 1 и 209p) и грамотрицательных палочек (*Sh. Dysenteriae Flexneri* 6858 и *E. Coli* 0-55).

Таким образом, нами разработан удобный метод синтеза 4-арилиден-2-арил-1-(тиазол-2-ил)-1H-имидазол-5(4H)-онов.

Экспериментальная часть

ИК-спектры сняты на спектрометре "Nicolet Avatar 330 FT-IR" в вазелиновом масле, спектры ЯМР 1H – на "Varian Mercury-300" в растворе ДМСО- d_6 . ТСХ проведено на пластинках "Силуфол UV-254", элюент – толуол-гексан-этанол (1:1:1), проявитель – пары йода и УФ-лучи. Микроволновое облучение осуществлено в бытовой микроволновой печи. Исходные тиазолиламиды **1-6** синтезированы согласно [10].

(Z)-4-Бензилиден-2-фенил-1-(тиазол-2-ил)-1H-имидазол-5(4H)-он (7).

А) К раствору 0.5 г (0.0014 моля) тиазолиламида N-бензоил- α,β -дегидрофенилаланина (**1**) в 10 мл ДМФА добавляют 0.89 мл (0.0042 моля) ГМДС и смесь кипятят 1 ч. К реакционной смеси добавляют 50 мл воды, образовавшийся осадок фильтруют и перекристаллизовывают из этанола. Выход 0.25 г (53.9%).

Б) Смесь 0.5 г (0.0014 моля) тиазолиламида N-бензоил- α,β -дегидрофенилаланина (**1**) и 0.89 мл (0.0042 моля) ГМДС в 2 мл ДМФА облучают при 120 Вт 2.5 мин в микроволновой печи. Обработку опыта осуществляют согласно методу **А**. Выход 0.26 г (56.5%), т.пл. 175-177°C, R_f 0.78. ИК-спектр, ν , см⁻¹: 1639 (C=C); 1716 (СО-цикл.). Спектр ЯМР ¹H, δ , м.д., Гц: 7.31 (с, 1H, C=CH); 7.37-7.54 (м, 6H, C₆H₅); 7.60-7.64 (м, 2H, C₆H₅); 7.62 (д, 1H, J=3.5, =CH тиазол.); 7.65 (д, 1H, J=3.5, =CH тиазол.); 8.27-8.32 (м, 2H, C₆H₅); Найдено, %: С 68.23; Н 4.14; N 12.84; S 9.32. С₁₉H₁₃N₃OS. Вычислено, %: С 68.88; Н 3.93; N 12.69; S 9.67.

Взаимодействие амида 1 с ТМХС или смесью ТМХС-триэтиламин.

В) К раствору 0.3 г (0.00086 моля) тиазолиламида **1** в 5 мл ДМФА добавляют 0.28 г (0.33 мл, 0.0026 моля) ТМХС или 0.46 мл (0.0017 моля) эквимольной смеси ТМХС-NEt₃ и кипятят 2 ч. После добавления 60 мл воды образовавшийся осадок отфильтровывают, промывают водой и сушат. Получено 0.18 г смеси амида **1** с R_f 0.48, имидазолон **7** с R_f 0.80 и 2-фенил-4-бензилиден-5-оксазолон с R_f 0.88. ИК-спектр смеси, ν , см⁻¹: 1643 и 3245 (C=O и NH группы амида **1**); 1715 (цикл. C=O имидазолон **7**); 1790 (цикл. C=O 2-фенил-4-бензилиден-5-оксазолон).

Смесь растворяют в 5 мл этанола, нерастворимую часть отфильтровывают и сушат. Получено 0.09 г 2-фенил-4-бензилиден-5-оксазолон. Т.пл. 165-166°C, лит. [11] 166°C. ИК-спектр, ν , см⁻¹: 1652 (C=C); 1794 (СО-цикл.).

Г) К смеси 0.3 г (0.00086 моля) тиазолиламида **1** в 1 мл ДМФА добавляют 0.28 г (0.33 мл, 0.0026 моля) ТМХС или 0.46 мл (0.0017 моля) эквимольной смеси ТМХС-NEt₃ и облучают при 120 Вт 5.5 мин. Обработку осуществляют аналогично опыту **В**. При этом полученная смесь продуктов, по данными ТСХ и ИК-спектра, аналогична полученной в предыдущем опыте.

Аналогичным образом – облучением при 120 Вт в течение 5 мин, получены имидазолон **8-12**.

(Z)-4-(4-Метоксибензилиден)-2-фенил-1-(тиазол-2-ил)-1H-имидазол-5(4H)-он (8). Выход 68%, т.пл. 167-170°C, R_f 0.8. ИК-спектр, ν , см⁻¹: 1635 (C=C); 1720 (СО-цикл.). Спектр ЯМР ¹H, δ , м.д., Гц: 3.88 (с, 3H, CH₃O); 6.99 и 8.28 (оба м по 2H, C₆H₄); 7.28 (с, 1H, =CH); 7.36-7.42 (м, 2H, C₆H₅); 7.46-7.52 (м, 1H, C₆H₅); 7.58-7.62 (м, 2H, C₆H₅); 7.60 (д, 1H, J=3.5, =CH тиазол.); 7.62 (д, 1H, J=3.5, =CH тиазол.). Найдено, %: С 66.03; Н 3.91; N 11.84; S 9.30. С₂₀H₁₅N₃O₂S. Вычислено, %: С 66.48; Н 4.16; N 11.63; S 8.86.

(Z)-4-(4-Хлорбензилиден)-2-фенил-1-(тиазол-2-ил)-1H-имидазол-5(4H)-он (9). Выход 53.2%, т.пл. 207-210°C, Rf 0.79. ИК-спектр, ν , cm^{-1} : 1644 (C=C); 1719 (СО-цикл.). Спектр ЯМР 1H , δ , м.д., Гц: 7.31 (с, 1H, =CH); 7.37-7.54 (м, 5H, C₆H₅); 7.58-7.63 (м, 2H, C₆H₄); 8.28-8.33 (м, 2H, C₆H₄); 7.62 (д, 1H, J=3.5, =CH тиазол.); 7.65 (д, 1H, J=3.5, =CH тиазол.); Найдено, %: С 62.44; Н 3.51; N 11.68; S 8.27. C₁₉H₁₂ClN₃OS. Вычислено, %: С 62.38; Н 3.28; N 11.49; S 8.76.

(Z)-4-(3-Нитробензилиден)-2-фенил-1-(тиазол-2-ил)-1H-имидазол-5(4H)-он (10). Выход 91.8%, т.пл. 130-133°C, Rf 0.77. ИК-спектр, ν , cm^{-1} : 1632 (C=C); 1713 (СО-цикл.). Спектр ЯМР 1H , δ , м.д., Гц: 7.34 (с, 1H, =CH тиазол.); 7.42 и 7.49 (м, 3H, C₆H₅); 7.52-7.58 (м, 3H, C₆H₅); 7.59 (д, 1H, J=3.5, =CH тиазол.); 7.62 (д, 1H, J=3.5, =CH тиазол.); 8.26-8.31 (м, 2H, C₆H₅). Найдено, %: С 60.73; Н 3.41; N 14.63; S 8.11. C₁₉H₁₂N₄O₃S. Вычислено, %: С 60.64; Н 3.19; N 14.89; S 8.51.

(Z)-4-(4-Бромбензилиден)-2-(4-метоксифенил)-1-(тиазол-2-ил)-1H-имидазол-5(4H)-он (11). Выход 51.02%, т.пл. 200-203°C, Rf 0.79. ИК-спектр, ν , cm^{-1} : 1639 (C=C); 1718 (СО-цикл.). Спектр ЯМР 1H , δ , м.д., Гц: 3.85 (с, 3H, CH₃O); 6.90 и 8.22 (оба м по 2H, C₆H₄); 7.19 (с, 1H, =CH); 7.55-7.59 (оба м по 2H, C₆H₄); 7.67 (д, 1H, J=3.5, =CH тиазол.); 7.69 (д, 1H, J=3.5, =CH тиазол.). Найдено, %: С 54.33; Н 3.00; N 9.13; S 6,97. C₂₀H₁₄BrN₃O₂S. Вычислено, %: С 54.54; Н 3.18; N 9.55; S 7.29.

(Z)-4-Бензилиден-2-(4-бромфенил)-1-(тиазол-2-ил)-1H-имидазол-5(4H)-он (12). Выход 51%, т.пл. 192-195°C, Rf 0.79. ИК-спектр, ν , cm^{-1} : 1644 (C=C); 1723 (СО-цикл.); Спектр ЯМР 1H , δ , м.д., Гц: 7.34 (д, 1H, =CH); 7.42-7.50 (м, 3H, C₆H₅); 8.26-8.31 (м, 2H, C₆H₅); 7.53-7.58 (м, 4H, C₆H₄); 7.59 (д, 1H, J=3.5, =CH тиазол.); 7.62 (д, 1H, J=3.5, =CH тиазол.). Найдено, %: С 55.41; Н 3.10; N 9.96; S 7.65. C₁₉H₁₂BrN₃OS. Вычислено, %: С 55.62; Н 2.93; N 10.25; S 7.81.

4-ԱՐԻԼԻԴԵՆ-2-ԱՐԻԼ-1-(ԹԻԱԶՈՒ-2-ԻԼ)-1H-ԻՄԻԴԱԶՈՒ-5(4H)-ՈՆՆԵՐԻ ՄԻՆԹԵԶԸ

Ս. Ո. ԹՈՍՈՒՆՅԱՆ

Հետազոտվել է N-բենզոիլ- α,β -դեհիդրոֆենիլալանինի 2-ամինոթիազոլիլամիդի ցիկլացման ռեակցիան 1,1,1,3,3,3-հեքսամեթիլդիսիլազանի, տրիմեթիլքլորսիլանի և վերջինիս ու տրիէթիլամինի խառնուրդի ներկայությամբ ինչպես սովորական եռացման, այնպես էլ միկրոալիքային ճառագայթման պայմաններում: Արդյունքում պարզվել է, որ նպատակային 4-բենզոիլդեհեն-2-ֆենիլ-1-(թիազոլ-2-իլ)-1H-իմիդազոլ-5(4H)-ոնը համեմատաբար բարձր ելքով (56.5%) ստացվում է հեքսամեթիլդիսիլազանի մասնակցությամբ ռեակցիոն խառնուրդի 2.5 բոպե ճառագայթման պայմաններում: Այս եղանակով սինթեզվել են ևս հինգ իմիդազոլոններ և ուսմնասիրվել է դրանց հակաբակտերիալ ակտիվությունը:

SYNTHESIS OF 4-ARYLIDENE-2-ARYL-1-(THIAZOL-2-YL)-1H-IMIDAZOL-5(4H)-ONES

S. R. TOSUNYAN

The Scientific Technological Centre of Organic
and Pharmaceutical Chemistry NAS RA
A.L. Mnjoyan Institute of Fine Organic Chemistry
26, Azatutyan Str., Yerevan, 0014, Armenia
E-mail: syuzitos@mail.ru

The cyclization reaction of 2-(N-benzoyl- α,β -dehydrophenylalanyl)aminothiazole using trimethylchlorosilane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane or a mixture of trimethylchlorosilane with triethylamine under conditions of both boiling and microwave irradiation of the reaction mixture was studied. As a result it was established that a relatively high yield (56.5%) of the target product – 4-benzylidene-2-phenyl-1-(thiazol-2-yl)-1H-imidazol-5(4H)-one was obtained in the case of using hexamethyldisilazane when irradiating the reaction mixture (120 wt) for 2.5 min. This method was used in synthesis of some 4-arylidene-2-aryl-1-(thiazol-2-yl)-1H-imidazol-5(4H)-ones and their antibacterial properties were studied.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] *Girges M.M., El-Zahab M.M.A., Hanna M.A.* // Collect. Czech. Chem. Commun., 1989, v. 54, p. 1096.
- [2] *Singh R., Pandey V.K., Srimal R.C.* // Indian J. Pharm. Sci., 1992, v. 54, p. 4.
- [3] *Gupta J.K., De B., Saravanan V.S.* // Indian J. Pharm. Sci., 2006, v. 45, p. 2580.
- [4] *Solankee A., Patel G., Patel K.* // Indian J. Chem., 2011, v. 50B, p. 949.
- [5] *Sathe B.S., Jaychandran E., Sreenivasa G.M., Jagtap V.A.* // E-Journal of Chem., 2011, v. 8, №2, p. 830.
- [6] *Islam A.M., Khalil A.A., Abd El-Gawad I.I.* // Austr. J. Chem., 1973, v. 26, 14, p. 827.
- [7] *Agarwal R., Chaudhary Ch., Misra V.S.* // Indian J. Chem., 1983, v. 22B, p. 308.
- [8] *Топузьян В.О., Арутюнян Л.Г., Оганесян А.А.* // ЖОрХ, 2008, т. 44, 13, с. 474.
- [9] *Топузьян В.О., Арутюнян Л.Г.* // Информационные технологии и управления, 2004, 14, с. 68.
- [10] *Топузьян В.О., Тосунян С.Р., Пароникян Р.В.* // Хим. ж. Армении, 2012, т. 65, 14, с. 519.
- [11] *Топузьян В.О., Хачванкян Г.Ю.* // Хим.ж.Армении, 1996, т. 59, 11-3, с. 138.