ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ
АРМЕНИЯ

Հայաստանի քիմիական հանդես 66, №2, 2013 Химический журнал Армении

УДК 247.72:547.72.8

СИНТЕЗ S- И N-ЗАМЕЩЕННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ
ПИРИМИДОФУРО[2,3-b] ХИНОЛИНОВ

В. В. ДАБАЕВА, М. Р. БАГДАСАРЯН и А. С. НОРАВЯН

Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии
НАН Республики Армения

Институт тонкой органической химии им. А. Л. Мнджояна
Армения, 0014, Ереван, пр. Азатутян, 26
E-mail: noravyan@mail.ru

Поступило 20 XI 2012

Хлорированием 4-оксо-3,4,7,8,9,10-гексагидропиримидо[4',5':4,5]фуоро[2,3-b]хинолина хлорокисью фосфора получено его 4-хлорпроизводное, которое взаимодействием с тиомочевинной переведено в соответствующий гидросульфид, введенный в реакцию с различными галогенпроизводными. Осуществлено алкилирование 4-оксо-3,4,7,8,9,10-гексагидропиримидо[4',5':4,5]фуоро[2,3-b]хинолина.

Библ. ссылка 5.

В продолжение исследований в области производных конденсированных пиримидинов, обладающих ценными биологическими свойствами, в том числе высокой противосудорожной и транквилизирующей активностью [1-4], на основе 4-оксо-3,4,7,8,9,10-гексагидропиримидо[4',5':4,5]фуоро[2,3-b]хинолина (**1**) [5] нами был предпринят синтез S- и N-замещенных производных пиримидофуоро[2,3-b] хинолинов.

Взаимодействием 4-оксо-3,4,7,8,9,10-гексагидропиримидо[4',5':4,5]фуоро[2,3-b]хинолина (**1**) с хлорокисью фосфора в присутствии пиридина получен хлорид **2**, который введен в реакцию с тиомочевинной, приведшую к тиолу **3**. Последний может существовать как в тиолактамной, так и тиолактимной формах. Сигнал NH группы при 3120 см^{-1} в ИК-спектре указывает на предпочтительность тионной формы. Однако, поскольку направление реакции, как правило, зависит от степени поляризуемости атомов, а поляризуемость атома S больше поляризуемости атома N, в результате реакции образуются S-замещенные производные **4-14**.

В отличие от тиона, как и следовало ожидать, в результате алкилирования пиримидинона **1** образуются продукты N-замещения. Об этом свидетельствуют отсутствие полосы поглощения, характерной для NH-группы, и наличие полосы, характерной для C=O группы при 1670 см^{-1} .

Строение полученных соединений и их индивидуальность подтверждены данными ИК- и ЯМР¹H спектров, чистота проверена хроматографически.

Экспериментальная часть

ИК-спектры сняты на спектрометре «Nicolet Avatar 330 FT-JR» в вазелиновом масле, спектры ЯМР¹H – на приборе «Varian Mercury 300» в ДМСО-d₆. ТСХ проведена на пластинках «Silufol UV-254» в системах этилацетат–гексан, 2:1 (2); этилацетат–метанол–гексан, 2:1:1 (2-14); пиридин–бутанол, 1:3 (15-22).

4-Хлор-7,8,9,10-тетрагидропиримидо[4',5':4,5]фуоро[2,3-*b*]хинолин (2).

Смесь 2.4 г (0.01 моля) соединения 1, 2 мл абсолютного пиридина и 30 мл хлорокси фосфора нагревают 4 ч при 100°C. Избыток хлорокси фосфора отгоняют в вакууме и к остатку при охлаждении по каплям прибавляют 20 мл ледяной воды. Затем смесь нейтрализуют 25% водным раствором аммиака, выпавшие кристаллы отфильтровывают, промывают водой и перекристаллизовывают из спирта. Выход 2.2 г (84.2%), т. пл. 151-152°C, R_f 0.65. Найдено, %: Cl 13.85; N 16.42. C₁₃H₁₀ClN₃O. Вычислено, %: Cl 13.67; N 16.17. ИК-спектр, ν , см⁻¹: 1520, 1560, 1600 (аром., C=C, C=N сопр.). Спектр ЯМР¹H, δ , м. д., Гц: 1.86-2.02 (м, 4H, CH₂CH₂CH₂CH₂); 2.96 и 3.02 (оба уш. т, по 2H, J = 6.3, 10-CH₂ и 7-CH₂); 8.31 уш. с, 11-CH); 8.91 (1H, с, N=CH).

7,8,9,10-Тетрагидропиримидо[4',5':4,5]фуоро[2,3-*b*]хинолин-4-илгидросульфид (3). Смесь 2.6 г (0.01 моля) соединения 2, 1.0 г (0.013 моля) тиомочевини и 60 мл абсолютного этанола кипятят при перемешивании в течение 3 ч. После охлаждения выпавшие кристаллы отфильтровывают, растворяют в 20 мл 2N раствора NaOH и нейтрализуют уксусной кислотой. Выпавшие кристаллы отфильтровывают, промывают водой, эфиром, перекристаллизовывают из спирта. Выход 2.2 г (83.5%), т. пл. 297-298°C, R_f 0.52. Найдено, %: N 16.53; S 12.81. C₁₃H₁₁N₃OS. Вычислено, %: N 16.33; S 12.46. ИК-спектр, ν , см⁻¹: 1545, 1575, 1595 (аром., C=C, C=N сопр.); 3120 (NH). Спектр ЯМР¹H, δ , м. д., Гц: 1.85-2.02 (м, 4H, CH₂CH₂CH₂CH₂); 2.97 и 3.03 (оба уш. т, по 2H, J = 6.3, 10-CH₂ и 7-CH₂); 8.12 уш. с, 1H, 11-CH); 8.15 (с, 1H, N=CH).

Общая методика получения меркаптопроизводных 4-14. Смесь 0.01 моля соединения 3, 0.56 г (0.01 моля) гидроксида калия в 20 мл 90% этилового спирта перемешивают при нагревании при 50°C до полного растворения, охлаждают, затем к смеси прибавляют 0.01 моля соответствующего хлорпроизводного и смесь кипятят 1 ч. После охлаждения к смеси добавляют 50 мл воды, выпавшие кристаллы отфильтровывают, промывают водой, эфиром и перекристаллизовывают из спирта. ИК-спектры, ν , см⁻¹: 1540, 1570, 1600 (аром., C=C, C=N сопр.).

2-Ацетамидо-(7,8,9,10-тетрагидропиримидо[4',5':4,5]фууро[2,3-*b*]-хинолин)-4-илсульфид (4). Выход 91.1%, т. пл. 253-254°C, R_f 0.58. Найдено, %: N 17.59; S 10.25. C₁₅H₁₄N₄O₂S. Вычислено, %: N 17.82; S 10.20. Спектр ЯМР¹H, δ, м. д., Гц: 1.86-2.03 (м, 4H, CH₂CH₂CH₂CH₂); 3.00 и 3.06 (оба уш. т, по 2H, J=6.2, 10-CH₂ и 7-CH₂); 4.07 (с, 2H, SCH₂); 7.01 и 7.42 (оба ш, по 1H, NH₂); 8.25 (уш. с, 1H, 11-CH); 8.87 (с, 1H, N=CH).

Бензил-7,8,9,10-тетрагидропиримидо[4',5':4,5]фууро-[2,3-*b*]-хинолин-4-ил-сульфид (5). Выход 84.9%, т. пл. 126-127°C, R_f 0.62. Найдено, %: N 12.25; S 9.11. C₂₀H₁₇N₃OS. Вычислено, %: N 12.09; S 9.23. Спектр ЯМР¹H, δ, м. д., Гц: 1.86-2.02 (м, 4H, CH₂CH₂CH₂CH₂); 2.99 и 3.04 (оба уш. т, по 2H, J = 6.1, 10-CH₂ и 7-CH₂); 4.66 (с, 2H, SCH₂); 7.19-7.32 (м, H-3,4,5, C₆H₅); 7.43-7.47 (м, 2H, H-2,6, C₆H₅); 8.88 (с, 1H, N=CH).

Фенэтил-7,8,9,10-тетрагидропиримидо[4',5':4,5]фууро[2,3-*b*]-хинолин-4-ил-сульфид (6). Выход 86.1%, т. пл. 132-133°C, R_f 0.63. Найдено, %: N 11.55; S 8.94. C₂₁H₁₉N₃OS. Вычислено, %: N 11.63; S 8.87. Спектр ЯМР¹H, δ, м. д., Гц: 1.86-2.02 (м, 4H, CH₂CH₂CH₂CH₂); 2.99 и 3.05 (оба уш. т, по 2H, J = 6.2, 10-CH₂ и 7-CH₂); 3.08 (м, 2H, CH₂Ph); 3.63 (м, 2H, SCH₂); 7.15-7.32 (м, 5H, C₆H₅); 8.23 (уш. с, 1H, 11-CH); 8.86 (с, 1H, N=CH).

Аллил-7,8,9,10-тетрагидропиримидо[4',5':4,5]фууро[2,3-*b*]-хинолин-4-ил-сульфид (7). Выход 75.2%, т. пл. 95-96°C, R_f 0.65. Найдено, %: N 14.22; S 10.55. C₁₆H₁₅N₃OS. Вычислено, %: N 14.13; S 10.78. Спектр ЯМР¹H, δ, м. д., Гц: 1.86-2.02 (м, 4H, CH₂CH₂CH₂-CH₂); 2.99 и 3.04 (оба уш. т, по 2H, J = 6.2, 10-CH₂ и 7-CH₂); 4.07 (дт, 2H, J₁=6.8, J₂=1.3, SCH₂); 5.17 (дк, 1H, J₁=9.9, J₂=1.3, =CH₂); 5.39 (дк, 1H, J₁=16.9, J₂=1.3, =CH₂); 6.01 (ддт, 1H, J₁=16.9, J₂=9.9, J₃=6.8, CH=CH₂); 8.23 (уш. с, 1H, 11-CH); 8.84 (с, 1H, N=CH).

2-Хлорбензил-7,8,9,10-тетрагидропиримидо[4',5':4,5]фууро[2,3-*b*]-хинолин-4-илсульфид (8). Выход 86.1%, т. пл. 128-129°C, R_f 0.57. Найдено, %: Cl 9.29; N 11.12; S 8.29. C₂₀H₁₆ClN₃OS. Вычислено, %: Cl 9.28; N 11.00; S 8.40. Спектр ЯМР¹H, δ, м. д., Гц: 1.86-2.02 (м, 4H, CH₂CH₂CH₂CH₂); 2.99 и 3.04 (оба уш. т, по 2H, J = 6.1, 10-CH₂ и 7-CH₂); 4.77 (с, 2H, SCH₂); 7.20-7.30, 7.38-7.43 и 7.62-7.67 (все м, 2H, 1H и 1H, C₆H₄); 8.24 (уш. с, 1H, 11-CH); 8.91 (с, 1H, N=CH).

4-Хлорбензил-7,8,9,10-тетрагидропиримидо[4',5':4,5]фууро[2,3-*b*]-хинолин-4-илсульфид (9). Выход 85.2%, т. пл. 114-115°C, R_f 0.56. Найдено, %: Cl 9.54; N 11.12; S 8.53. C₂₀H₁₆ClN₃OS. Вычислено, %: Cl 9.28; N 11.00; S 8.40. Спектр ЯМР¹H, δ, м. д., Гц: 1.86-2.02 (м, 4H, CH₂CH₂CH₂CH₂); 3.00 и 3.05 (оба уш. т, по 2H, J = 6.1, 10-CH₂ и 7-CH₂); 4.65 (с, 2H, SCH₂); 7.25-7.30 и 7.44-7.49 (оба м, по 2H, C₆H₄); 8.24 (уш. с, 1H, 11-CH); 8.88 (с, 1H, N=CH).

N-1-(4-Метилфенил)-ацетамидо-(7,8,9,10-тетрагидропиримидо[4',5':4,5]фууро[2,3-*b*]-хинолин-4-илсульфид (10). Выход 87.1%, т. пл. 204-205°C, R_f 0.54. Найдено, %: N 13.95; S 7.58. C₂₂H₂₀N₄O₂S. Вычислено, %: N 13.85; S 7.93. Спектр ЯМР¹H, δ, м. д.: 1.86-2.02 (м, CH₂CH₂CH₂CH₂); 2.29 (с, 3H, CH₃); 2.96-3.12 (м, 4H,

10-CH₂ и 7-CH₂); 4.30 (с, 2H, SCH₂); 7.00-7.06 и 7.41-7.47 (оба м, по 2H, C₆H₄); 8.25 (уш. с, 1H, 11-CH); 8.88 (с, 1H, N=CH); 10.01 (уш. с, 1H, NH).

N-1-Фенилацетиамидо-(7,8,9,10-тетрагидропиримидо[4',5':4,5]фууро[2,3-б]хинолин-4-илсульфид (11). Выход 88.9%, т. пл. 221-222°C, R_f 0.53. Найдено, %: N 14.23; S 8.39. C₂₁H₁₈N₄O₂S. Вычислено, %: N 14.35; S 8.21. Спектр ЯМР¹H, δ, м. д., Гц: 1.87-2.03 (м, 4H, CH₂CH₂CH₂CH₂); 3.00 (уш. т, 2H, J=6.1) и 3.06 (уш. т, 2H, J=6.2, 10-CH₂ и 7-CH₂); 4.33 (с, 2H, SCH₂); 7.00 (тт, 1H, J₁=7.4, J₂=1.1, H-4 C₆H₅); 7.20-7.28 (м, 2H, H-3,5 C₆H₅); 7.56-7.61 (м, 2H, H-2,6 C₆H₅); 8.25(уш. с, 1H, 11-CH); 8.89 (с, 1H, N=CH); 10.13 (уш. с, 1H, NH).

N-1-(2,4-Диметоксифенил)-ацетиамидо-(7,8,9,10-тетрагидропиримидо[4',5':4,5]фууро[2,3-б]хинолин-4-илсульфид (12). Выход 83.1%, т. пл. 200-201°C, R_f 0.59. Найдено, %: N 12.58; S 7.25. C₂₃H₂₂N₄O₄S. Вычислено, %: N 12.44; S 7.12. Спектр ЯМР¹H, δ, м. д., Гц: 1.87-2.04 (м, 4H, CH₂CH₂CH₂CH₂); 3.01 и 3.07 (оба уш. т, по 2H, J=6.2, 10-CH₂ и 7-CH₂); 3.75 и 3.82 (оба с, по 3H, OCH₃); 4.21 (с, 2H, SCH₂); 6.38 (дд, 1H, J₁=8.8, J₂=2.5, H-5 C₆H₃); 6.44 (д, 1H, J=2.5, H-3 C₆H₃); 8.01 (д, 1H, J=8.8, H-6 C₆H₃); 8.26 (уш. с, 1H, 11-CH); 8.97 (с, 1H, N=CH); 9.32 (уш. с, 1H, NH).

N-1-Бензоилацетиамидо-(7,8,9,10-тетрагидропиримидо[4',5':4,5]фууро[2,3-б]хинолин-4-илсульфид (13). Выход 85.1%, т. пл. 218-219°C, R_f 0.62. Найдено, %: N 13.39; S 7.66. C₂₂H₁₈N₄O₃S. Вычислено, %: N 13.39; S 7.66. Спектр ЯМР¹H, δ, м. д., Гц: 1.87-2.04 (м, 4H, CH₂CH₂CH₂CH₂); 3.01 и 3.06 (оба уш. т, по 2H, J=6.2, 10-CH₂ и 7-CH₂); 4.33 (с, 2H, SCH₂); 6.99 (тт, 1H, J₁=7.4, J₂=1.1, H-4 C₆H₅); 7.20-7.27 (м, 2H, H-3,5 C₆H₅); 7.56-7.61 (м, 2H, H-2,6 C₆H₅); 8.25 (уш. с, 1H, 11-CH); 8.89 (с, 1H, N=CH); 10.10 (уш. с, 1H, NH).

N-1-Бензгидрилацетиамидо-(7,8,9,10-тетрагидропиримидо[4',5':4,5]фууро[2,3-б]хинолин-4-илсульфид (14). Выход 79.1%, т. пл. 235-236°C, R_f 0.60. Найдено, %: N 11.78; S 6.65. C₂₈H₂₄N₄O₂S. Вычислено, %: N 11.66; S 6.67. Спектр ЯМР¹H, δ, м. д., Гц: 1.87-2.03 (м, 4H, CH₂CH₂CH₂CH₂); 3.01 и 3.06 (оба уш. т, по 2H, J=6.1, 10-CH₂ и 7-CH₂); 4.21 (с, 2H, SCH₂); 6.14 (д, 1H, J=8.5, CH); 7.18-7.32 (м, 10H, C₆H₅); 8.24 (уш. с, 1H, 11-CH); 8.78 (с, 1H, N=CH); 8.94 (д, 1H, J=8.5, NH).

Общая методика получения амидов 15-23. Смесь 2.4 г (0.01 моля) соединения 1, 1.4 г (0.01 моля) поташа и 10 мл диметилформамида, перемешивая, нагревают при 50-60°C до полного растворения. После охлаждения к смеси добавляют 0.01 моля соответствующего хлорпроизводного и нагревают при 50-60°C 3 ч. Затем реакционную смесь охлаждают, добавляют 20 мл воды, выпавшие кристаллы отфильтровывают, промывают водой, эфиром и перекристаллизовывают из спирта. ИК-спектры, ν , см⁻¹: 1550, 1600, 1620 (аром., C=C, C=N сопр.); 1680 (C=O).

2-(4-Оксо-3,4,7,8,9,10-гексагидропиримидо[4',5':4,5]фууро[2,3-б]хинолин-3-ил)- ацетамид (15). Выход 87.2%, т. пл. 278-279°C, R_f 0.59. Найдено, %: C 60.55; N

4.58; N 18.93. C₁₅H₁₄N₄O₃. Вычислено, %: C 60.40; H 4.73; N 18.78. Спектр ЯМР¹H, δ, м. д., Гц: 1.86-2.03 (м, 4H, CH₂CH₂CH₂CH₂); 3.00 и 3.06 (оба уш. т, по 2H, J=6.2, 10-CH₂ и 7-CH₂); 4.71 (с, 2H, NCH₂); 7.11 и 7.64 (оба ш, по 1H, NH₂); 8.09 (уш. с, 1H, 11-CH); 8.35 (с, 1H, N=CH).

3-Бензил-3,4,7,8,9,10-гексагидропиримидо[4',5':4,5]фуоро[2,3-б]хинолин-4-он (16). Выход 61.9%, т. пл. 215-216°C, R_f 0.63. Найдено, %: C 72.45; H 5.60; N 12.48. C₂₀H₁₇N₃O₂. Вычислено, %: C 72.49; H 5.17; N 12.68. Спектр ЯМР¹H, δ, м. д., Гц: 1.86-2.02 (м, 4H, CH₂CH₂CH₂CH₂); 2.99 и 3.04 (оба уш. т, по 2H, J=6.1, 10-CH₂ и 7-CH₂); 5.31 (с, 2H, NCH₂); 7.19-7.32 (м, 3H, H-3,4,5 C₆H₅); 7.43-7.47 (м, 2H, H-2,6 C₆H₅); 8.05 (уш. с, 1H, 11-CH); 8.59 (с, 1H, N=CH).

3-Фенэтил-3,4,7,8,9,10-гексагидропиримидо[4',5':4,5]фуоро[2,3-б]хинолин-4-он (17). Выход 61.1%, т. пл. 248-249°C, R_f 0.62. Найдено, %: C 73.12; H 5.50; N 12.36. C₂₁H₁₉N₃O₂. Вычислено, %: C 73.03; H 5.54; N 12.17. Спектр ЯМР¹H, δ, м. д., Гц: 1.84-2.00 (м, 4H, CH₂CH₂CH₂CH₂); 2.98 и 3.04 (оба уш. т, по 2H, J=6.02, 10-CH₂ и 7-CH₂); 3.07 (м, 2H, CH₂Ph); 4.32 (м, 2H, NCH₂); 7.15-7.33 (м, 5H, C₆H₅); 8.05 (уш. с, 1H, 11-CH); 8.11 (с, 1H, N=CH).

2-(4-Оксо-3,4,7,8,9,10-гексагидропиримидо[4',5':4,5]фуоро[2,3-б]хинолин-3-ил)-1-тетрагидро-1H-1-пирролил-1-этанон (18). Выход 64.9%, т. пл. 230-231°C, R_f 0.62. Найдено, %: C 64.70; H 5.43; N 16.03. C₁₉H₂₀N₄O₃. Вычислено, %: C 64.76; H 5.72; N 15.89. Спектр ЯМР¹H, δ, м. д., Гц: 1.86-2.02 (м, 4H, CH₂CH₂CH₂CH₂); 1.88-2.00 и 2.03-2.12 (оба м, по 2H, CH₂CH₂ пирролид.); 2.99 и 3.03 (оба уш. т, по 2H, J=6.2, 10-CH₂ и 7-CH₂); 3.44 и 3.65 (оба т, по 2H, J=6.8, N(CH₂)₂); 4.89 (с, 2H, NCH₂); 8.09 (уш. с, 1H, 11-CH); 8.29 (с, 1H, N=CH).

N-1-Фенил-2-(4-Оксо-3,4,7,8,9,10-гексагидропиримидо[4',5':4,5]фуоро[2,3-б]хинолин-3-ил)ацетамид (19). Выход 64.1%, т. пл. 281-282°C, R_f 0.61. Найдено, %: C 67.45; H 4.80; N 14.83. C₂₁H₁₈N₄O₃. Вычислено, %: C 67.37; H 4.85; N 14.96. Спектр ЯМР¹H, δ, м. д., Гц: 1.86-2.03 (м, 4H, CH₂CH₂CH₂CH₂); 3.00 (уш. т, 2H, J=6.1) и 3.06 (уш. т, 2H, J=6.2, 10-CH₂ и 7-CH₂); 4.95 (с, 2H, NCH₂); 7.1 (тт, 1H, J₁=7.4, J₂=1.1, H-4 C₆H₅); 7.21-7.28 (м, 2H, H-3,5 C₆H₅); 7.59-7.63 (м, 2H, H-2,6 C₆H₅); 8.11 (уш. с, 1H, 11-CH); 8.42 (с, 1H, N=CH); 10.28 (уш. с, 1H, NH).

N-1-(4-Метоксиметил)-2-(4-оксо-3,4,7,8,9,10-гексагидропиримидо[4',5':4,5]фуоро-[2,3-б]хинолин-3-ил)ацетамид (20). Выход 64.2%, т. пл. 288-289°C, R_f 0.60. Найдено, %: C 65.30; H 4.95; N 13.86. C₂₂H₂₀N₄O₄. Вычислено, %: C 65.34; H 4.98; N 13.85. Спектр ЯМР¹H, δ, м. д., Гц: 1.86-2.03 (м, 4H, CH₂CH₂CH₂CH₂); 2.99 и 3.04 (оба уш. т, по 2H, J=6.1, 10-CH₂ и 7-CH₂); 3.76 (с, 3H, CH₃); 4.94 (с, 2H, NCH₂); 6.77-6.83 и 7.49-7.54 (оба м, по 2H, C₆H₄); 8.12 (уш. с, 1H, 11-CH); 8.41 (с, 1H, N=CH); 10.15 (уш. с, 1H, NH).

N-1-(4-Хлорфенил)-2-(4-оксо-3,4,7,8,9,10-гексагидропиримидо[4',5':4,5]фуоро-[2,3-б]хинолин-3-ил)ацетамид (21). Выход 66.1%, т. пл. >300°C (с разл.), R_f 0.52. Найдено, %: Cl 8.56; N 13.89. C₂₁H₁₇ClN₄O₃. Вычислено, %: Cl 8.67; N 13.70.

Спектр ЯМР¹H, δ, м. д., Гц: 1.86-2.02 (м, 4H, CH₂CH₂CH₂CH₂); 2.99 и 3.04 (оба уш. т, по 2H, J=6.2, 10-CH₂ и 7-CH₂); 4.95 (с, 2H, NCH₂); 7.22-7.27 и 7.60-7.66 (оба м, по 2H, C₆H₄); 8.12 (уш. с, 1H, 11-CH); 8.42 (с, 1H, N=CH); 10.44 (уш. с, 1H, NH).

N-1-(4-Ацетилфенил)-2-(4-оксо-3,4,7,8,9,10-гексагидропиримидо[4',5':4,5]фуоро-[2,3-б]хинолин-3-ил)ацетамид (22). Выход 64.9%, т. пл. >300°C (с разл.), R_f 0.50. Найдено, %: С 66.65; Н 4.98; N 13.05. C₂₃H₂₀N₄O₄. Вычислено, %: С 66.34; Н 4.81; N 13.45. Спектр ЯМР¹H, δ, м. д., Гц: 1.86-2.03 (м, 4H, CH₂CH₂CH₂CH₂); 2.52 (с, 3H, CH₃); 3.00 и 3.04 (оба уш. т, по 2H, J=6.2, 10-CH₂ и 7-CH₂); 5.00 (с, 2H, NCH₂); 7.71-7.76 и 7.86-7.91 (оба м, по 2H, C₆H₄); 8.12 (уш. с, 1H, 11-CH); 8.43 (с, 1H, N=CH); 10.65 (уш. с, 1H, NH).

S- ԵՎ N-ՏԵՂԱԿԱԼՎԱԾ ՊԻՐԻՄԻԴՈՅՈՒՐՈՒ[2,3-Բ]ԽԻՆՈԼԻՆՆԵՐԻ ԱՕԱՆՑՅԱԼՆԵՐԻ ՄԻՆԹԵԶԸ

Վ. Վ. ԴԱԲԱԵՎԱ, Մ. Ռ. ԲԱԳԴԱՍԱՐՅԱՆ և Ա. Ս. ՆՈՐԱՎՅԱՆ

Մշակվել է 7,8,9,10-տետրահիդրոպիրիմիդո[4',5':4,5]ֆուրո[2,3-բ]խինոլին-4-իլիդիդրոսուլֆիդի սինթեզի հարմար եղանակ 4-քլոր-7,8,9,10-տետրահիդրոպիրիմիդո[4',5':4,5]ֆուրո[2,3-բ]խինոլինից, որն իր հերթին ստացվել է 4-օքսո-3,4,7,8,9,10-հեքսահիդրոպիրիմիդո[4',5':4,5]ֆուրո[2,3-բ] խինոլինից: Իրականացվել են վերը նշված նյութերի ակտիվացման ռեակցիաները տարբեր հալոգենածանցյալներով պոտաշի ներկայությամբ:

SYNTHESIS OF S- AND N-SUBSTITUTED DERIVATIVES OF PYRIMIDOFURO[2,3-b]QUINOLINES

V. V. DABAEVA, M. R. BAGDASARYAN and A. S. NORAVYAN

The Scientific Technological Centre of Organic and Pharmaceutical Chemistry NAS RA
A. L. Mnjoyan Institute of Fine Organic Chemistry
26, Azatutyun Str., Yerevan, 0014, Armenia
Fax: (37410) 28 – 83 – 32 E – mail: noravyan@mail.ru

A convenient method for the synthesis of 7,8,9,10-tetrahydropyrimido[4',5':4,5]furo[2,3-b]quinolin-4-ylhydrosulfide from 4-chloro-7,8,9,10-tetrahydropyrimido[4',5':4,5]furo[2,3-b]quinoline, which in its turn was obtained from 4-oxo-3,4,7,8,9,10-hexahydropyrimido[4',5':4,5] furo[2,3-b]quinoline, has been developed. The reactions of hydrosulfide with oxoderivatives by various halogen derivatives in the presence of potassium carbonate were realized.

ЛИТЕРАТУРА

[1] *Машковский М.Д.* Лекарственные средства. М., Новая волна, 2010, с. 838.
[2] *Ленинджер А.* Биохимия. М., Мир, 1976, с. 628.
[3] *Taltavull J., Serrat J., Gracia., Gawalda A., Andres M., Grdoba M., Miralpeix M., Villela D., Beleta J., Ryder H., Pages Z.* // J. Med. Chem., 2010, v. 53, p. 6912.
[4] *Taltavull-Moll J., Pages-Santacana L. M.* Eur. Appl. PCT/EP, 2006, 007218.
[5] *Դաբաևա Վ.Վ., Բաղդասարյան Մ.Ր., Որավյան Ա.Ս.* // ХГС, 2007, №10, с. 1571.