**НЕОБЫЧНОЕ ЗАМЕЩЕНИЕ ХЛОРА У ВИНИЛЬНОГО АТОМА
УГЛЕРОДА ТИОЛЯТ-АНИОНАМИ В ХЛОРИДЕ
3-ХЛОРБУТ-2-ЕНИЛТРИФЕНИЛФОСФОНΙΑ**

Четвертичные фосфониевые соли, содержащие α,β -непредельную связь, издавна привлекают большое внимание исследователей благодаря их чрезвычайной реакционной способности относительно основных реагентов [1,2]. Настоящее исследование посвящено как изучению геометрии синтезированного ранее 3-хлор-бут-2-енилтрифенилфосфоний хлорида (**1**) [3], так и изысканию возможности нуклеофильного присоединения А-Н соединений по β,γ -хлорвинильной группировке соли **1** с целью его функционализации. Согласно проведенным ЯМР ^1H , ^{31}P и NOEZY исследованиям, фосфониевая соль **1** представляет собой смесь *цис*- и *транс*-изомеров в процентном соотношении 70:30. Насколько нам известно, в литературе отсутствуют какие-либо данные относительно реакций нуклеофильного присоединения по β,γ -непредельной связи в четвертичных фосфониевых солях. Однако полученные нами ранее данные о протекании щелочного гидролиза соли **1** [3], сопровождающегося анионизацией исключительно 3-хлорбут-2-енильной группы, косвенно свидетельствуют о преобладающем действии отрицательного индукционного эффекта атома хлора в хлорвинильной группе, вследствие чего углерод, связанный с атомом хлора, может быть подвержен атаке нуклеофила.

В качестве А-Н соединений нами были использованы теоретически обладающие относительно высокой нуклеофильностью этан-, бутан- и 3-метилбутантиолы. Первая же попытка вовлечь в реакцию с солью **1** бутантиол в кипящем ацетонитриле в запаянной ампуле не увенчалась успехом. Однако в результате реакции имела место исчерпывающая трансформация мажорного *цис*-изомера в *транс*-изомер соли **1**. Проведением той же реакции соли **1** с этан- и бутантиолами в присутствии стехиометрических количеств триэтиламина были получены 3-этил- и -бутилсульфанилбут-2-енилтрифенилфосфоний хлориды (**2,3**) с выходами 46.2 и 60.5%, соответственно.

Образование фосфониевых солей **2** и **3** представляется протекающим через последовательные стадии присоединения алкантиолов и отщепления хлористого водорода.

Неожиданным образом из продуктов реакции йодистого аналога соли **1** с 3-метибулантиолом нами был выделен и идентифицирован продукт восстановления исходной соли – бут-2-енилтрифенилфосфоний йодид (**4**). Последний образуется, по-видимому, с участием двух молекул 3-метил-булантиола по схеме, предложенной Беттрапом для 4-метилтио-1,2,3-триазолиевых солей [4].

Экспериментальная часть

Спектры ЯМР 1H и ^{31}P снимали на спектрометре "Varian Mercury-300" [300.077 МГц (1H) и 121.47 МГц (^{31}P)] при 303 К, используя в качестве растворителя смесь DMSO- d_6 - CCl_4 (1:3). Химические сдвиги приведены относительно ТМС (1H) и 85% H_3PO_4 (^{31}P).

Спектр ЯМР 1H *цис*-изомера соли **1** (δ , м.д., Гц): 2.11 (д.д, 3H, $J_1 = 5.6$, $J_2 = 1.1$, =CCH $_3$); 4.81 (д.д.д, 2H, $J_1 = 16.1$, $J_2 = 7.5$, $J_3 = 1.1$, $P^+CH_2CH=$); 5.73 (т.д.кв, 1H, $J_1 = 7.5$, $J_2 = 5.6$, $J_3 = 1.1$, $P^+CH_2CH=$); 7.42-7.78 (м, 15H, Ph_3P^+). Спектр ЯМР ^{31}P : δ_p 26.81 м.д.

Спектр ЯМР 1H *транс*-изомера соли **1** (δ , м.д., Гц): 1.81 (д.д, 3H, $J_1 = 4.6$, $J_2 = 1.1$, =CCH $_3$); 5.03 (д.д, 2H, $J_1 = 16.2$, $J_2 = 8.2$, $P^+CH_2CH=$); 5.50 (т.д.кв, 1H, $J_1 = 8.2$, $J_2 = 4.6$, $J_3 = 1.1$, $P^+CH_2CH=$); 7.8-8.01 (м, 15H, Ph_3P^+). Спектр ЯМР ^{31}P : δ_p 27.35 м.д.

3-Этилсульфанилбут-2-енилтрифенилфосфоний хлорид (2). Смесь 0.8 г (2.1 ммоль) 3- хлорбут-2-енилтрифенилфосфоний хлорида (**1**), 0.13 г (2.1 ммоль) этантиола и 0.21 г (2.1 ммоль) триэтиламина в 10 мл ацетонитрила нагревали в запаянной ампуле на кипящей водяной бане в течение 15 ч. Получили 0.4 г (46.2%) смеси *цис*- и *транс*-изомеров фосфониевой соли **2**, т.пл. 199-200°C. Найдено, %: Cl 8.26. $C_{24}H_{26}ClPS$. Вычислено, %: Cl 8.61. Спектр ЯМР 1H (δ , м.д., Гц): 1.1 (т, 3H, $J = 7.0$, SCH $_2CH_3$); 1.54 (д, 3H, $J = 3.7$, =CCH $_3$); 2.6 (кв, 2H, $J = 7.0$, SCH $_2CH_3$); 4.82 (д.д, 2H, $J_1 = 15.4$, J_2

=7.7, P⁺CH₂CH=); 4.97-5.06 (м, 1H, P⁺CH₂CH=); 7.70-7.78 (м, 6H, Ph₃P⁺); 7.82-7.93 (м, 9H, Ph₃P⁺). Спектр ЯМР ³¹P: δ_p 25.94 и 26.27 м.д.

3-Бутилсульфанилбут-2-енилтрифенилфосфоний хлорид (3). Опыт проводили аналогично предыдущему. Из 0.8 г (2.1 ммоль) соли **1**, 0.19 г (2.1 ммоль) бутантиола и 0.21 г (2.1 ммоль) триэтиламина получили 0.56 г (60.5%) смеси *цис*- и *транс*-изомеров фосфониевой соли **3**, т.пл. 202-203⁰С. Найдено, %: Cl 7.84. C₂₆H₃₀ClPS. Вычислено, %: Cl 8.06. Спектр ЯМР ¹H, δ, м.д., Гц): 0.83 (т, 3H, J=7.0, SCH₂(CH₂)₂CH₃); 1.23-1.43 (м, 4H, SCH₂(CH₂)₂CH₃); 1.55 (д, 3H, J = 3.8, =CCH₃); 2.52 (т, 2H, J=6.9, SCH₂(CH₂)₂CH₃); 4.80 (д.д, 2H, J₁=15.5, J₂=7.8, P⁺CH₂CH=); 4.95-5.03 (м, 1H, P⁺CH₂CH=); 7.70-7.77 (м, 6H, Ph₃P⁺); 7.83-7.92 (м, 9H, Ph₃P⁺). Спектр ЯМР ³¹P: δ_p 26.14 и 26.17 м.д.

Бут-2-енилтрифенилфосфоний йодистый (4). Опыт проводили аналогично предыдущему. Из 0.8 г (1.7 ммоль) 3-хлорбут-2-енилтрифенилфосфоний йодистого, 0.17 г (1.7 ммоль) 2-метил-бутантиола и 0.17 г (1.7 ммоль) триэтиламина получили 0.09 г (23.8%) фосфониевой соли **4**, т.пл. 210-211⁰С. Найдено, %: I 28.83. C₂₂H₂₂I₂P. Вычислено, %: I 28.60. Спектр ЯМР ¹H, (δ, м.д., Гц): 1.67 (т.д, 3H, J₁=6.3, J₂ = 1.3, =CHCH₃); 4.54 (д.д, 2H, J₁= 15.7, J₂ = 7.1, P⁺CH₂CH=); 5.27-5.40 (м, 1H, P⁺CH₂CH=CH); 5.75-5.89 (м, 1H, P⁺CH₂CH=CH); 7.69-7.95 (м, 15H, Ph₃P⁺). Спектр ЯМР ³¹P: δ_p 26.80 м.д.

3-ՔԼՈՐՐՈՒՏ-2-ԵՆԻԼՏՐԻՖԵՆԻԼՖՈՍՖՈՆԻՈՒՄ ՔԼՈՐԻԳՆՈՒՄ ՎԻՆԻԼԱՅԻՆ ԱԾԽԱԾՆԻ ՄՈՏ ԳՏՆՎՈՂ ՔԼՈՐԻ ՈՉ ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ ՏԵՂԱԿԱՆՈՒՄԸ ԹԻՈՒԼԱՏ-ԱՆԻՈՆՆԵՐՈՎ

Մ. Ժ. ՆՈՎԱԿԻՄՅԱՆ, Գ. Ծ. ԳԱՄՊԱՐՅԱՆ և Ա. Ս. ԲԻՉԱՆՉՅԱՆ

Ցույց է արված, որ 3-քլորբուտ-2-ենիլֆոսֆոնիում քլորիդը փոխազդում է էթան- և բուտանթիոլների հետ ամպոլայում, եռացող ացետոնիտրիում ստեխիոմետրիկ քանակությամբ արիէթիլամինի ներկայությամբ առաջացնելով 3-էթիլ-, բուտիլսուլֆանիլբուտ-2-ենիլֆոսֆոնիում քլորիդներ 46 և 61% ելքերով համապատասխանաբար: Ռեակցիան պատկերացվում է հաջորդաբար ընթացող քլորվինիլային խմբին ալկանթիոլների միացմամբ և դեհիդրոքլորացմամբ:

**UNUSUAL SUBSTITUTION OF CHLORINE AT VINYL CARBON ATOM
BY THIOLATE-ANIONS IN 3-CHLOROBUT-2-
ENYLTRIPHENYLPHOSPHONIUM CHLORIDE**

M. Zh. OVAKIMYAN, G. Ts. GASPARYAN and A. S. BICHAKHCHYAN

The Scientific Technological Centre of Organic
and Pharmaceutical Chemistry NAS RA
Institute of Organic Chemistry
26, Azatutyun Str., Yerevan, 0014, Armenia
E-mail: arpenikb@mail.ru

It has been established that 3-chlorobut-2-enyltriphenylphosphonium chloride interacts with ethane- and butanthiols in the presence of stoichiometric quantities of triethylamine in the boiling acetonitrile in the sealed ampoule affording 3-ethyl-, butylsulfanylbut-2-enyltriphenyl-phosphonium chlorides in 46 and 61%, correspondingly. The reaction seems to proceed through the successive stages of addition of alkanethiols to the chlorovinyl grouping of the phosphonium salt and subsequent dehydrochlorination.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Овакимян М.Ж., Мовсисян М.Л., Гаспарян Г.Ц., Инджикян М.Г. // ЖОХ, 2011, т. 81, вып. 2, с. 346.
- [2] Овакимян М.Ж., Гаспарян Г.Ц., Григорян М.Р. // Хим.ж.Армении, 2014, т. 67, №1, с. 59.
- [3] Хачатрян Р.А., Торгомян А.М., Овакимян М.Ж., Инджикян М.Г. // Арм.хим.ж., 1974, т. 27, №8, с. 682.
- [4] Vegtrup M. // Acta.Chem.Scand., 1971, v. 25, №9, p. 3500.

Научно-технологический центр органической
и фармацевтической химии НАН
Республики Армения
Институт органической химии
Армения, 0014, Ереван, пр. Азатутян, 26
E-mail: arpenikb@mail.ru

**М. Ж. ОВАКИМЯН
Г. Ц. ГАСПАРЯН
А. С. БИЧАХЧЯН**

Поступило 23 VI 2016