

Ռ. Հ. Սրգսյան

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՐԻ ՄԵՂՐՈՒ ՇՐՋԱՆԻ ԽԱՂՈՂՆԵՐԻ
 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍՈՐՏԵՐԸ

Մեղրու շրջանը գտնվում է Հայկական ՍՍՐի Կարավա-սարենյան ծալրա-մասում և լեռնային ու լիճային տեղանքից խառնարկված է Շնոր-հիվ բարձր (մինչև 3000 մ) լեռների, Մեղրու շրջանում կարելի է գտնել մի քանի դոտիններ, սկսած ալպյանից մինչև կիսաանապատային չոր մերձաբլու-ղաբլուներ, որտեղ գյուղատնտեսությունը հնարավոր է ինտենսիվացնել ոռոգ-ման միջոցով:

Մեղրու շրջանում այգեգործությունը զբաղվում են Արաքս գետից մինչև 5—8 կմ վրա գտնվող գյուղերում (Մեղրի, Շվանիձոր, Կարճեան, Ալիդարա, Նուվադի, Կուրիս, Վարձավար, Լեհվադ), կլիմայական պայ-մաններն այգեգործության բարենպաստ են այգեգործության զար-գացման համար, բայց անհրաժեշտ հողային տարածության և ոռոգման ջրի սակավությունը (բացառությամբ Մեղրի գյուղից, որտեղ ջուրն առատ է) հնարավորություն չեն տալիս այգիներն բնագործակալու Այգիների ընդ-հանուր տարածությունն ամբողջ շրջանում մոտ 190 հեկտար է, Համեմա-տաբար ալպյան չոր ալպիներ ունեն Շվանիձորը (24,5 հա), Ալիդարան (23,3 հա) և Կարճեանը (22,7 հա), Մնացած գյուղերը միջին հաշվով ունեն 10—15-ական հեկտար:

Մեղրու շրջանի Դյուրառնի ալպյաններով այգիների միջին բերքա-տվությունը 1940—1946 թ.թ. հետևյալ պատկերն է ներկայացնում.

№ ը. կ.	Դյուրառն	Բերքատվությունը ցենտներով						
		1940 թ.	1941 թ.	1942 թ.	1943 թ.	1944 թ.	1945 թ.	1946 թ.
1	Շվանիձոր	6	40	40	26	4	11	14
2	Նուվադի	32	35	55	51	15,5	39	55
3	Ալիդարա	62	61	81	31	59	87	78
4	Մեղրի	45	49	58	46	60,5	59	71
5	Կարճեան	40	46	26	72	21,5	18	22
6	Կուրիս	71	59	74	47	36,5	52	46
7	Վարձավար	60	71	33	62	23	60	36
8	Լեհվադ	57	58	52	45	32	42	30
9	Վարդանաձոր	—	—	—	—	35	47	18

Այգիներն ըստ սորտային կազմության խառնարկված են, Տարածված սորտերի թվին են պատկանում Արևիկ (Արևիկա), Հաստակաթ (Այրողան), Ալիդարա (Ալիդարա կախանի), Ճուղի, Շահանդյուլ, Մաի ձու, Շիրեի,

Քիչ միչ, Սև Արևիկ (Սև ալպուրա), Շեկ սեպուհ, Սև իծապտուկ, Արարատի (Հաչարաչ), որին տեղում սխալմամբ անվանում են նաև Թայիֆի, Ամբարի (Շաֆեյի) և այլն:

Այս սորտերն այդիներում լինում են անհատ վազերով, բացառությամբ Արևիկ սորտի, որը շրջանի բոլոր այդիներում կապում է 95—98⁰ բացի Ալիզարա գյուղից, որտեղ նրա տոկոսը հասնում է 70—75-ի:

Մեղրու շրջանի տեղական խաղողի սորտերի մասին ընդհանուր տեղեկություններ տալիս են Պ. Դ. Յարուշենկոն և Ն. Ֆ. Դրիզորյանը⁹: Տեղական սորտերի նկարագրությունն ժամանակ նրանք Այրոզան անվան տակ նկարագրել են Մեղրու շրջանում հայտնի ձուղի¹⁰ սորտը, իսկ Սև Կոռուպ անվան տակ նկարագրել են Այրոզան կամ Հաստակոթ սորտը: Վերջին սորտի վերաբերյալ նշված է, որ նա շատ տարածված և բերքատու է: Սակայն մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ նրա քանակն այդիներում չի անցնում 2—3⁰—ից, իսկ բերքատվությունը միջակից քիչ բարձր է, օգտագործվում է զլխավորապես տեղանի ուղիտակ գինուին գուշն տալու համար: Նույն աշխատության մեջ Սպիտակ Կախանի անվան տակ նկարագրված է Մեղրու շրջանում հայտնի և Ալիզարա գյուղի այդիների 20—25⁰ կազմող Ալիզարա սորտը: Սակայն այս անունը չի բերվում նույնիսկ որպես սինանիմ: Մեղրու շրջանում գինու հիմնական սորտ է համարվում Արևիկը: Այդ սորտից են ստացել Մեղրու շրջանի հայտնի գետերային և տեղանի թունդ գինիները: Սակայն նրա մասին Յարուշենկոն և Դրիզորյանը գրում են, թե նա գինու սորտ է, բայց այդ տեսակետից բարձր որակի չէ: Այդ տեսակետը միանշանակ չի համապատասխանում իրականության, քանի որ Արևիկից ստացվում է բարձր որակի գինի:

Մեղրու շրջանի այդիներում հատ ու կենտ վազերով կարելի է հանդիպել Արարատի սորտին, որը տեղում անվանում են Թայիֆի կամ Լույի տաշի: Հեղինակներն այս սորտի հետ բավականաչափ ծանոթ չլինելու հետևանքով, հենվելով Թայիֆի անվան վրա, նույնիսկ ենթադրում են, թե նա ծագում է Արարատից, կամ շատ մոտ է Միջին Ասիայի Ալիզարայի սորտին: Նույն հեղինակները տերևներն ըստ թավոտությունից խմբավորելիս Արևիկը դասել են Երևանի կողմից լերկ, տակի կողմից ջիզերի վրա ուտայնանման թավ, իսկ միջջիզային տարածությունը ծածկված խուլ խոզամազերով խմբին, մինչդեռ մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ Արևիկի տերևները թե երեւի և թե տակի կողմից միանշանակ լերկ են:

Շնորհիվ լեռնաշղթաների պաշտպանություն, Մեղրու շրջանում ձմռան ցերմաստիճանի իսկապես անկում տեղի չի ունենում, որը հնարավորություն է տալիս այդիները չթափել: Այդիները վաղ պարնանային ցրտահարությունից պաշտպանելու համար շրջանում ընդունված է հետևյալ ձևավորման սխեման¹¹ բարձրարուն, 8—12 աչք ունեցող 2—3 մաս, որոնք հետագայում աղեղնաձև թևերով կապում են ընդ: Թնի բարձրությունը միջին հաշվով հավասար է մեկ մետրի: Բունը կապում են 3—4 սմ արամազիժ ունեցող հենարանից: Որպեսզի վաղ պարնան ցրտահարությունից

⁹ Պ. Դ. Յարուշենկո և Ն. Ֆ. Դրիզորյան—Ստալինգրադի տեղական Մեղրու երևան, 1941:

¹⁰ Ձուղի—ճրտ և աղի (պղնձալուր խաղող) բառերի միացումն է: Այդ անունն իսկապես բնորոշում է տվյալ սորտը, որի ողկույղներին երկտերթյունը հասնում է 40—70 սմ:

այգիները պաշտպանվեն, էտից հետո մատերը չեն կուսցնում և կապում բնին, իսկ երբ նրա շիվերը հասնում են 25—30 սմ, շնորհիվ շիվերի ծանրության մատերն աստիճանաբար թևքվում են զեպի ցած. հենց այդ մամանակից սկսում են մատերի կապելը բնից: Այգիների հողը թևթև ավազային, երբեմն մսնր խճով հարուստ, կամ կավա-ավազային է, հումուսով համեմատաբար աղքատ, որի հետեանքով առնվազն երեք տարին մեկ անգամ այգիները պարարտացվում են զոմազրով: Ձմռանը այգիների հողը մեծ մասամբ չի սառչում, որի շնորհիվ այգեփորը հիմնականում կատարվում է ձմռան ամիսներին կամ վաղ դարձանը: Շնորհիվ ուղեքի և նախկինում գոյություն ունեցող մասնավոր հողատիրության, այգիները անկվել են փոքր կառույցներով (հաճախ 0,1—0,3 հեկտար), տարբեր խտություն և ուղղություն ունեցող շարքերով: Այգիների խտությունը տասանվում է՝ շարքը շարքից 1—1,5 մ և վաղը վաղից 1—1,25 մ հեռավորության սահմաններում:

Այգիների առաջին սոողումը սովորաբար կատարվում է այգեփորից առաջ, եթե այգիները փորվում են ձմռան ամիսներին, ապա փորից առաջ չեն սոողում: Երկրորդ սոողումը կատարվում է ծաղկումից առաջ (եթե այգիները դարձան կամ ձմռան ամիսներին փորված են). երրորդը՝ պտուղների կաղձակերպվելուց հետո: Հետագա սոողումները կատարվում են, ըստ ջրի առկայության, ամիսը 2—3 անգամ: Այն պայմանում, որտեղ ջրի մեծ պակասություն է պայմանավորվում (Գարձևան, Շվանիձոր) այգիներն ամբողջ տարվա ընթացքում ջրվում են երկու կամ երեք անգամ՝ 1—2 անգամ ամռանը, 1 անգամ ձմռանը:

Ամսուր ընթացքում այգիները մեծ մասամբ լողանում են 1—2 անգամ. քաղնաճը, շնորհիվ հողի փխրության՝ կատարվում է ձեռքով: Քաղահանած խտոր փսում-չարացնում են թմբերի վրա, հետագայում հավաքելու համար: Մտաերը բնին կապելու ընթացքում կատարվում է շվատումը, իսկ բերքի լրիվ հասունացման շրջանում հաճախ հեռացնում են ծայրի շիվերի սղկույցներից վերև գտնվող մասը:

Հիվանդություններից զգալի չափով տարածված են միլդիուեն և օղիումը, իսկ ֆուսարիոտներից՝ պղխարսպիոր և խաղողի վահանակիը (ВУХО-ГРЯЗНЫЙ пероид, Կերջինս ոչ ամեն տարի է, որ համեմատաբար ուժեղ է բաղձանում):

ԵԱՎՈՂԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍՈՐՏԵՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ԵՎԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ա Ր Ե Վ Ի Կ

Արեխիը Հայկական ՍՍՌ-ում համարվում է արորիդեն սորտ և մինչև այժմ հայտնի է եղել Այադուրա անունով: Հայտնաբերվում հիմնականում տարածված է Մեղրու շրջանում. կա նաև Ղափանի շրջանում և մոտ 10 հեկտար՝ Ալիզարա անվան տակ մշակվում է «Արարա» օրենստի Միկոյանի անվան սովետում, իսկ առանձին վայեր՝ նաև Արաաչատի այգիներում: Արեխիը մտել է հիմնական ստանդարտային սուրտիմենտի մեջ Մեղրու շրջանի համար:

Արեխի ավելի համառոտ նկարագրությունը մեծ ափն ենք 1947 թ. հրապարակել «Այգեկոչափի» գրքում: Ներկա նկարագրությունը լրացված է հետագա ուսումնասիրություններով:

Տ և ր և ք կլսրաժուռն է, հինգըթականի, Էրբեճն Կոտայքակ կամ ամբողջական, 16,2 (12,1—18,0) սմ երկարությամբ, 16,3 (13,3—18,8) սմ լայնությամբ, Էրեսի կողմից լերկ, մուգ կանաչ, հարթ, տակի կողմից կա-



Նկար 1. Արեւիկ

նաչ, լերկ՝ 'Վերին կտրվածքները՝ ծանծաղ կամ բացակա, մեծ մասամբ փակ, առանց լուսանցքի կամ ճեղքանման լուսանցքով, կոթունային կարրվածքը բաց քնարաձևից մինչև Ս-աձև, սուր հատակով: Գլխավոր ջղերն իրենց ելման կետում ներկված թույլ գինեկարմիր գույնով:

Մ ա գ ի կ ք ֆունկցիոնալ իզական է. վարսանդը սափորաձև, տեղեկները 4—6 հատ, մեծ մասամբ 5, կտրաչոտ գեղիք՝ սպառ:

Ողկույզը լաշն կոնաձև կամ աձև է, հիմնականում նոսր, լավ փոշոտման ղեպքում՝ խիտ։ Ազատ փոշոտման ղեպքում՝ 17,0 (9,4—27,3) սմ երկարությամբ, 9,5 (3,0—25,6) սմ լայնությամբ, 194 (25—782) զր կշռով։ Լրացուցիչ փոշոտման ղեպքում՝ 19,0 (9,5—25,2) սմ երկարությամբ, 12,3 (6,7—17,6) սմ լայնությամբ, 372 (40—1433) զր կշռով։

Պատուհը կլորավուն է, խոշոր, 1,87 (1,35—2,1) սմ երկարությամբ, 1,83 (1,35—2,1) սմ լայնությամբ, 100 պտղի կշիռը՝ 414 զր, խակ ծավալը՝ 364 սմ³։ Գույնը ստվերում՝ կանաչ ղեղնավուն է, արևի տակ՝ վառ դեղնականաչավուն, պտղամիսը հյութալի, մսալի, բավականին քաղցր (այրող) համով, մաշկը հաստ և կոպիտ, ծածկված բարակ մոմաշերտով, հեշտությամբ պտղամսից անջատվող, հյութն անգույն։ Մեքենան 1—4, հաճախ 1—2 հասն 100 սերմի կշիռը՝ 4,09 զր։

Ազրո-բխոցիական հատկությունները

Ծաղկման սկիզբը՝ 1945 թվին—3/V, 1947 թ.—28/V:

Արևիկն ուշահաս սորա է. նրա հասունացման սկիզբը Մեղրու պայմաններում ընկնում է օգոստոսի առաջին կեսին, խակ լրիվ հասունացումը՝ սեպտեմբերի առաջին կեսին։ Բավականին փարթամ է։ Բերքատվությունը կախված է փոշոտման հաջողությունից, կամ փոշոտման ղեպքում սալիս է բարձր բերք։ Ազատ փոշոտված մեկ վաղի բերքատվությունը 1947 թ. տվյալներով առաջնություն է 1,105 կգ-ից մինչև 4,733 կգ, միջինը՝ 3,02 կգ, Լրացուցիչ փոշոտում ստացած մեկ վաղի բերքատվությունը առաջնություն է 3,448—14,616 կգ, միջինը՝ 7,027 կգ, Տնկարկի խտությունը 1,5×1,25 մ։

Մեղրու շրջանում կատարված երեք տարվա դիտողությունները ցույց են տվել, որ Արևիկը բավականին ուժեղ է վարակվում թև միլիդիոսով և և թև օբիդիոսով։

Տնտեսական-տեխնոլոգիական հատկությունները

Խաղողի մեխանիկական կազմությունը բնութագրելու համար ոտսրե բերում ենք 1947 թ. կատարած 11 ազատ փոշոտված և 13 լրացուցիչ փոշոտում ստացած ողկույթների մեխանիկական անալիզի միջին տվյալները։

	Ազատ փոշոտված	Լրացուցիչ փոշոտված
Ողկույթի կշիռը	230 զր	494 զր
Ողկույթի պտուղների թիվը . .	59 հաս	120 հաս
Ողկույթի պտուղների կշիռը . .	226,3 զր	487,2 զր
Մեկ պտղի կշիռը	3,83 զր	4,07 զր
Պտուղների ծավալը	214,1 սմ ³	428,0 սմ ³
Մեկ պտղի ծավալը	3,62 սմ	3,65 սմ ³
Չանչի կշիռը	3,63 զր	6,77 զր
Ողկույթի մաշկի կշիռը	9,25 զր	16,36 զր
Ողկույթի սերմերի կշիռը . . .	3,99 զր	8,72 զր
Հյութի և պտղամսի կշիռը . .	213,13 զր	462,13 զր


Հյութի քիմիական կազմությունը 1947 թ. սեպտեմբերի 1-ին հետև-

վյալն է եղել. ազատ փոշոտման ղեկավար՝ 21⁰/₀, ընդհանուր
թթվայնությունը 5,47⁰/₀₀, լրացուցիչ փոշոտման ղեկավար՝ 18,7⁰/₀,
թթվայնությունը 4,95⁰/₀₀:

Արևիկը հիմնականում պորձ է անվում սեղանի թունդ և քաղցրավուն
զինինձր ստանալու համար: Արևիկից պատրաստվում է նաև չամիչ:

Հ Ա Ս Տ Ա Կ Ո Ք

Հատուկորթը համարվում է Հայկական ՍՍԽ-ում արժրիղեն սորտ և
հայտնի է նաև Այրոդան անունով: Նա գտնվում է Մեղրու շրջանի այգի-
ներում և իր քանակով (քաղի Ալիդարա գյուղի այգիներից) երկրորդ տեղն
է բռնում: Հաստակորթի ուսումնասիրությունը կատարված է Մեղրու շրջանի
Մեղրի գյուղի այգիներում:



Նկար 2. Հաստակորթ

Տ ե ռ ե թ կըրտվուն է, հնդուրթակ, երբեմն ենթարկվակներով, 18,1
(14,6 — 22,6) սմ երկարությամբ, 17,7 (14,6 — 21,0) սմ լայնությամբ, երեսի
կողմից՝ լերկ, կանաչ, հարթ, տակի կողմից՝ թիթեղ և գլխավոր չղերը
ծածկված շատ նոսր ոստայնաման թավով: Վերին կտրվածքները՝ խոր

կամ միջակ խորությամբ են, բացից մինչև փակ տատանվող ձևով, բացերը քնարաձև, սուր հատակով, փակերը նեղ, էլիպսաձև լուսանցքով, Գլխավոր փղերը երեսի կողմից ներկված են մուգ, տակի կողմից՝ համեմատաբար թույլ գինեկարմիր գույնով, Տերևակիթը լերկ է, ներկված գինեկարմիր գույնով:

Խաղիկը ֆունկցիոնալ իդական է, վարսանդը տանձաձև, առեչքները 4—7 հատ, մեծ մասամբ 5, կորացած դեպի ցած:

Ողկույթը զտնա-կոնաձև է, երբեմն գլանաձև, հիփակաձև խիտ, լավ փաշտման դեպքում շատ խիտ, ազատ փաշտման դեպքում՝ 13,1 (9,6—15,6) և՛ երկարություն, 8,3 (6,3—12,5) և՛ լայնություն, 147 (50—303) գր կշռով, Լրացուցիչ փաշտման դեպքում 13,7 (10—16,7) և՛ երկարություն, 8,8 (5,4—12,0) և՛ լայնություն, 223 (54—437) գր կշռով:

Պատույն էլիպսաձև է, միջակ, 1,78 (1,35—2,1) և՛ երկարություն, 1,56 (1,3—1,8) և՛ լայնություն, 100 պտղի կշիռը՝ 279 գր, իսկ ծավալը 242 սմ³, Գույնը սև, պտղամիսը հյութալի, մաշկը համեմատաբար հաստ, ծածկված նոսր մոմաշերտով, պտղամսից անջատվող, հյութն անդույնա մերմեր՝ 1—4, հաճախ 3—3 հատ, 100 սերմի կշիռը՝ 3,69 գր:

Ագրո-բիօլոգիական հատկությունները

Հաստակիթը միջահաս սորտ է, նրա հասունացման սկիզբը Մեղրու պայմաններում բնկնում է օգոստոսի սկզբին, լրիվ հասունացումը՝ օգոստոսի վերջին:

Անճեղդությունը փարթևում է, Բերքատվությունը կախված է փաշտման հաջողությունից, լավ փաշտման դեպքում տալիս է միջակից բարձր բերք, Ազատ փաշտված՝ մեկ վաղի բերքատվությունն ըստ 1947 թ. տվյալների տատանվում է 1,060 կգ-ից մինչև 4,322 կգ, միջինը՝ 2,196 կգ, Լրացուցիչ փաշտում ստացած մեկ վաղի բերքատվությունը տատանվում է 1,031 կգ-ից մինչև 4,547 կգ, միջինը՝ 3,041 կգ, Տնկարկի խառնվյուղը՝ 2,0×1,0 մ:

Մեղրու չըջանում 1945 թվից մինչև 1947 թ., կատարված գիտողությունները ցույց են տալիս, որ Հաստակիթն ավելի մեծ չափով տուժում է միլդիայի, քան օրդիումից:

Տնտեսական-տեխնոլոգիական հատկությունները

Խաղողի մեխանիկական կտրվածությունը բնորոշելու համար ստորև բերում ենք 1947 թ. կատարված 12 ազատ փաշտված և 12 լրացուցիչ փաշտում ստացած ողկույթների մեխանիկական անալիզի միջին տվյալները.

	Ազատ փաշտված	Լրացուցիչ փաշտված
Ողկույթի կշիռը	214,0 գր	269,2 գր
Ողկույթի պտուղների թիվը	77 հատ	89 հատ
Ողկույթի պտուղների կշիռը	208,33 գր	261,96 գր
Մեկ պտղի կշիռը	2,706 գր	2,93 գր
Պտուղների ծավալը	186,34 սմ ³	240 սմ ³
Մեկ պտղի ծավալը	2,42 սմ ³	2,69 սմ ³

	Ազատ փոշոտված	Կրայուցիչ փոշոտված
Չանչի կշիռը	5,65 գր	7,20 գր
Ողկույզի մաշկի կշիռը	8,5 գր	10,18 գր
Ողկույզի սերմերի կշիռը	5,69 գր	7,54 գր
Հյութի և պտղամսի կշիռը	194,16 գր	241,21 գր

Հյութի քիմիական կազմությունը 1947 թ. սեպտեմբերի 4-ին եղել է՝ ազատ փոշոտման զեպքում շաքարը՝ 20,1⁰, թթվայնությունը՝ 5,92⁰, լրացուցիչ փոշոտման զեպքում շաքարը՝ 18,8⁰, թթվայնությունը՝ 6,25⁰։

Հաստակոթը պինդ սորո է, բայց Մեղրու շրջանում տարածված գինու հիմնական սորո հանդիսացող Արևիկի հետ համեմատաբար, տալիս է ցածր որակի գինի։ այդ պատճառով հաստակոթը անզուրկում ոգտապործում են գլխավորապես սեղանի սպիտակ գինուն զույն տալու համար։

Ս Ե Վ Ա Ր Ե Վ Ի Կ

Սև Արևիկը (Սև Ալպոտրա) հայկական ՍՍՌ-ում համարվում է արուբիզեն սորո։ Մեղրու շրջանի այգիներում լինում է հատուկ նշանակություն ունեցող Սև Արևիկի ուսումնասիրությունը կատարված է Մեղրու շրջանի Մեղրի գյուղի այգիներում։

Տերևը կտրավուն է, մեծ մասամբ հորթկալի, երբեմն ամբողջական կամ հնդարկթակ, 16,6 (14,2—22,2) սմ երկարությամբ, 17,3 (15,2—22,1) սմ լայնությամբ, երեսի կտրվող լերկ, մուգ կանաչ, հարթ, տակի կտրվող լերկ, կանաչ։ Վերին կտրվածքները ծանծաղ են կամ բացակայում են, հազվադեպ զեպքում միջակ խորությամբ, փակ, նեղ էլիպսոսձև լուսանցքով, երբեմն առանց լուսանցքի։ Ներքին կտրվածքները մեծ մասամբ բացակայում են, սովորական զեպքում ծանծաղ են, բայց ճիգնուման լուսանցքով։ Կոթունային կտրվածքը փակ է, ընդլայնական էլիպսոսձև լուսանցքով, երբեմն բաց։ Տերևակոթը լերկ է, կանաչ կամ ներկված գինեկտրմիր գույնով։

Ծաղիկը ֆունկցիոնալ խոտկան է, վարսանդը տանձածե, տեղեքները 4—6 հատ, մեծ մասամբ 3, կորացած զեպի ցած։

Ողկույզը տեղ է, հիմնականում նոսր, 19,7 (14,8—27,7) սմ երկարությամբ 12,0 (8,5—15,0) սմ լայնությամբ, 419 (259—617) գր կշռով։

Պտուղը կտրվում է, խոշոր, 1,98 (1,6—2,5) սմ երկարությամբ, 1,78 (1,4—2,2) սմ լայնությամբ, 100 պտղի կշիռը 381 գր, իսկ ծավալը 341 սմ³։ Դույնը մուգ կարմիր է, պտղամիսը հյութալի, մսալի, բավականին քաղցր, մաշկը համեմատաբար հաստ, ծածկված թույլ մոմաշերտով, պտղամսից զծվար անջատվող, հյութի անդույն։ Սերմերը՝ 1—4, հասակ 1—2, 100 սերմի կշիռը 5,07 գր։

Աղբյուրաբանական հատկությունները

Սև Արևիկը միջնադար սորո է, նրա հատանալիսն սկիզբը համընկնում է օգոստոսի սկզբին, լրիվ հասունացումը՝ օգոստոսի վերջին։ Աճեցողությունը բավականին ուժեղ է։

Մեղրու շրջանում կատարված երեք տարվա դիտողությունները ցույց են տալիս, որ Սև Արևիկն զգալի չափով առավել է թե միջինային և թե սիլվեստից։



Նկար 3. Սև ձի Արեւիկ

Տնտեսական-տեխնոլոգիական հատկությունները

Նապոյի մեխանիկական կադմաթյունը բնութագրելու համար ուսումնասիրում ենք 1947 թ. կատարված 10 ոգկույզի մեխանիկական անալիզի միջին տվյալները.

Ոգկույզի կշիռը	410	գր
Ոգկույզի պատույնների թիվը	108	հատ
Ոգկույզի պատույնների կշիռը	110,4	գր
Մեկ պտղի կշիռը	3,87	գր
Մեկ պտղի ծավալը	3,6	սմ ³
Չանկի կշիռը	8,78	գր

Ողկույցի մաշկի կշիռը	12,8	գր
» սերմերի կշիռը	9,6	գր
Հյութի և պտղամսի կշիռը . . .	387,82	գր

Հյութի քիմիական կազմությունը 1947 թ. սեպտեմբերի 5-ին՝ չափաբան
19,90% քիմիականությունը՝ 6,37%:

Սև Արեւիկը գործ է ածվում սեղանի գինի ստանալու համար:

Շ Ե Կ Ռ Ե Պ Ո Ն

Շեկ Ռեպսեն համարվում է Հայկական ՄՍՌ-ում արտրիկեն սորո հ
տարածված է Մեղրու շրջանի այգիներում, իր քանակով երրորդ տեղն է
բռնում:

Շեկ Ռեպսեի ուսումնասիրությունը կատարված է Մեղրու շրջանի
Մեղրի գյուղի կոլտնտեսության 1-ին բրիգադայի այգիներում:



Նկար 4. Շեկ Ռեպսե

Տ Ե ր և ր կլորավուն է, սրտաձև, հնգալիկակ, 14,0 (12,8—19,5) մմ
կարուսյամբ, 15,8 (13,0—20,0) մմ լայնությամբ, երեսի կողմից լերկ
մուգ կանաչ, հարթ, թույլ փայլով, տակի կողմից լերկ, կանաչ: Հյութ
կարվածքները՝ միջակ խտությամբ կամ ծանծաղ, փափկ, ճեղքանման կամ

ենդ էլիպսաձև լուսանցքով, երբեմն բաց, քնարաձև բացվածքով, սուր հասակով, ներքին կտրվածքները՝ ծանծաղ, բաց, ճեղքանման կամ քնարաձև բացվածքով, հոթունային կտրվածքը՝ տատանող-բացից մինչև փակ, բացերը՝ քնարաձև, սուր հատակով, փակերը՝ էլիպսաձև լուսանցքով, երբեմն տատանափոր: Տերևակոթը՝ լերկ բաց կանաչ, ներկված զինկարմիր գույնով:

Մտղիկը երկսև է, վարսանդը տանձաձև, սուկաքները 4—6, հիմնականում՝ 5:

Ողկույզը կոնոսի է կամ գլանա-կոնոսի, մեծ մասամբ նոսր, 18,5 (11,7—22,7) սմ երկարությամբ, 10,4 (8,1—11,7) սմ լայնությամբ, 278 (184—396) գր կշռով, չանչը՝ դեղնավուն:

Մտուղն էլիպսոձև է, միջակ մեծությամբ, 1,7 (1,5—2,1) սմ երկարությամբ, 1,5 (1,25—1,75) սմ լայնությամբ, 100 պտղի կշիռը՝ 256 գր, իսկ ծավալը՝ 238 սմ³: Դույնը կարմիր է, պտղամսիսը հյութալի, քաղցր, մաշկը միջակ հաստությամբ, ծածկված թույլ մոմաշերտով, պտղամսից նեղ անջատվող, հյութն անղույն: Մերմերը 1—3 հատ, հաճախ 1—2, 100 սերմի կշիռը՝ 3,57 գր:

Ագրո-բիոլոգիական հատկությունները

Շնկ մեպսեն ափսիս չուտ է հասունանում, քսն միջահաս սորտերը հասունացման սկիզբը՝ հուլիսի սկզբներին, իսկ լրիվ հասունացումը՝ օգոստոսի առաջին կեսին: Աճեցողությունը միջակ է:

Մեղրու շրջանում կատարված երեք տարվա դիտողությունները ցույց են տալիս որ Շնկ մեպսեն ափսիս չատ վարակվում է միլիդիայով, քսն փրկումով:

Տնտեսական-տեխնոլոգիական հատկությունները

Խաղողի մեխանիկական կազմությունը բնութագրելու համար ստորև բերում ենք 1947 թ. կատարված 10 ողկույզի մեխանիկական անալիզի միջին արժեքները.

Ողկույզի կշիռը	379	գր
Ողկույզի պտուղների թիվը	106	հատ
Ողկույզի պտուղների կշիռը	273	գր
Մեկ պտղի կշիռը	2,57	գր
Պտուղների ծավալը	252,2	սմ ³
Մեկ պտղի ծավալը	2,38	սմ ³
Չանչի կշիռը	6,0	գր
Ողկույզի մաշկի կշիռը	7,68	գր
Ողկույզի սերմերի կշիռը	5,18	գր
Հյութի և պտղամսի կշիռը	260,16	գր

Հյութի քիմիական կազմությունը 1947 թ. սեպտեմբերի 6-ին եղել է՝ քաքար՝ 16,6%, թթվայնությունը՝ 5,85%₀₀:

Շնկ մեպսեն դարձ է ածվում սրպես սեղանի խաղող:

Ու է Վ Ի Մ Ա Պ Տ Ո Ի Կ

Մե իմպատուիլը համարվում է Հայկական ՍՍԽ-ում արտրիզեն սորտ և առանձին վապերով զտնվում է Մեղրու շրջանի այգիներում: Շնորհիվ

պտուղներն անբավարար երկարությամբ Մե Իծապատուկ տնունն տալիքան էլ
էի համապատասխանում այդ ուրախն:

Սե Իծապատուկի ուսումնասիրությունը կատարված է Մեղրու շրջանի
Մեղրի դուղի 3-րդ բլրիկադառն աղբիներում:



Նկար 3. Սե Իծապատուկ

Տեղի և՛ բաց դժողորմ կլիմային է, բայց ձևի՝ սրտածե, հնդաբլթակ
1,51 (1,21— 1,92) սմ երկարությամբ, 1,57 (1,35— 1,91) սմ լայնությամբ:

Երեսի կողմից լերի, բայց կանաչ, հարթ, տակի կողմից դիտավոր ջրերի հիմքում խողովապետ, բայց կանաչ, վերին կտրվածքները՝ տասանվող ծան- ձաղից մինչև միջակ խորություն, մեծ մասամբ միջակ խորություն, իննականու միակ, համարյա առանց լուսանցքի կամ նեղ էլիպսաձև լու- սանցքով, բացերը՝ քնարաձև, նեղ բացվածքով, սուր հատակով, Ներքին կտրվածքները՝ ծանծաղ, միակ կամ բաց, բացերը՝ ճեղքանման բացված- քով, միակերպ՝ առանց լուսանցքի, Բլիսակները՝ խոնարհված զեպի ներքև, ճեղքակոթը՝ լերի, ներկված գինե-կարմիր գույնով:

Մ ա ղ ի կ ը Երկուսն է, վարսանդը երկարավուն շշաձև, առնչքները 5 - 6: Ողկույզը կոնաձև է, երբեմն նույն պլանակոնաձև, մեծ մասամբ նույն, երբեմն խիտ, 22,2 (15,6 - 26,1) սմ երկարությամբ, 11,2 (9,5 - 14,6) սմ լայնությամբ, 310 (160,8 - 440,5) գր կշռով:

Պատուը երկար է, խոշոր, 2,25 (1,65 - 2,75) սմ երկարությամբ, 1,57 (1,25 - 1,8) սմ լայնությամբ: 100 պտղի կշիռը՝ 320 գր, իսկ ծավալը՝ 291 սմ³: Դույնը սև է, պտղամիտը մասյի, հյութալի, քաղցր, մաշկը միջակ հաստությամբ, ծածկված հաստ մոմաշերտով, պտղամիտից զծվար անջատ- վող, հյութն անգույն, սերմերը 1 - 4, հաճախ 1 - 2 հատ: 100 սերմի կշիռը 3,66 գր:

Ագրո-բիոլոգիական հատկությունները

Շաղկման սկիզբը 1945 թվին նշվել է հունիսի 2-ին:

Սև Խձապտուկը միջահաս տարատ է: Հասունացման սկիզբը՝ հուլիսի 2-րդ կեսին, իսկ լրիվ հասունացումը՝ օգոստոսի առաջին կեսին: Աճեցու- ղությունն ուժեղ է:

Սև Խձապտուկը բավականին ուժեղ վարակվում է միլդիույով և համե- մաաբար թույլ՝ օրդիումով:

Տնտեսական-տեխնոլոգիական հատկությունները

Խաղողի մեխանիկական կազմությունը բնութագրելու համար ստորև բերում ենք 1947 թվին կատարված 10 ողկույզի մեխանիկական անալիզի միջին տվյալները.

Ողկույզի կշիռ	316,43	գր
Ողկույզի պտուղների թիվը	97	հատ
Ողկույզի պտուղների կշիռ	310	գր
Մեկ պտղի կշիռը	3,2	գր
Պտուղների ծավալը	284,3	սմ ³
Մեկ պտղի ծավալը	2,91	սմ ³
Չանչի կշիռը	6,43	գր
Ողկույզի մաշկի կշիռը	10,81	գր
Ողկույզի սերմերի կշիռը	6,79	գր
Հյութի պտղամսի կշիռը	292,4	գր

Հյութի քիմիական կազմությունը 1947 թ. սեպտեմբերի 8-ին եղել է՝ շաքարը՝ 21,4%, թթվայնությունը՝ 5,24%:

Սև Խձապտուկն օգտագործվում է որպես սեղանի խաղող:

Ճ Ռ Ա Դ Ի

Ս ի ն ո ն ի մ ք — Թուրկի Կուլյուզլի*:

Ճոռաղին համարվում է Հայկական ՍՍՏ-ում արորիզեն սորտու Մեղրու



Նկար Թ. Ճոռաղի

չըջանում դռնվում է առանձին վազերով: Ճոռաղիի ստամենստիրուկյունը կատարված է Մեղրու չըջանի կուրխ դյուզի տյգիներում:

* Չիսնեն, Երևանի և Արտաշատի թուրքի կուլյուզլի հետ, որը ժելարի «Իսկենդի» է:

Տ երևի կտրավուն է, հնգարկթակ, Երբեմն ենթարկթակներով, 20,4 (16,7—23,5) սմ երկարությամբ, 20,7 (17,0—25,5) սմ լայնությամբ, երևի կողմից լերկ, մուգ կանաչ, հարթ, տակի կողմից կանաչ, լերկ, զլխավոր լիզերը կսթունին միանալու կետում ծածկված են խոցամազներով:

Վերին կտրվածքները՝ միջին խորությամբ կամ ծանծաղ, հիմնականում փակ, էլիպսաձև լուսանցքով, երբեմն լուսանցքի հիմքում ատամնաձև հավելվածքով: Գոթունային կտրվածքը՝ առանձնով լայնից մինչև փակ, բայց հանդիպում են տերևներ, որոնց բլթակները ձաղարաձև բարձրացած են վերև և կոթունային կտրվածքին տալիս են փակ տեսք: Կոթունային կտրվածքը՝ էլիպսաձև, լայն հատակով: Գլխավոր ջիղերն իրենց ելման կետում երևի կողմից ներկված են գինե-կարմիր գույնով:

Ծաղիկը երկսեռ է, վարսանդը սափսրած, առեչքները՝ 4—7, մեծ մասամբ 5 հատ:

Ողկույզը պանաձև կամ պտնականաձև է, ծայրի մասում խիտ, կոթունի մոտ նոսր. լինում են նաև բոլորովին խիտ ողկույզներ 35,0 (20,2—43,5) սմ երկարությամբ, 12,0 (10,4—14,2) սմ լայնությամբ, 667 (331—894) գր կշռով:

Պտուղը կտրավուն է, միջակ մեծությամբ, 1,75 (1,40—2,05) սմ երկարությամբ, 1,76 (1,40—2,10) սմ լայնությամբ. 100 պտղի կշիռը՝ 336 գր. ձավալը՝ 310 սմ: Գույնը սև, պտղամիսը հյութալի, հալչող, թույլ քաղցրությամբ, մաշիլը միջակ հաստությամբ, ծածկված նոսր մոմաշերտով, պտղամուկը համեմատաբար զժվար անջատվող, հյութն՝ անզույն: Սերմերը՝ 1—4, հաճախ 1—2 հատ. 100 սերմերի կշիռը՝ 3,95 գր:

Ագրո-բիոլոգիական հատկությունները

1945 թվին ծաղկման սկիզբը նշվել է հունիսի 6-ին:

Ճողգին ուշահաս սորտ է. նրա հասունացման սկիզբը Մեղրու պայմաններում ընկնում է օգոստոսի վերջերին, իսկ լրիվ հասունացումը՝ սեպտեմբերի 2-րդ կեսին: Աճեցողությունը բավականին ուժեղ է: Չնայած Ճողգին ողկույզների մեծությանը, բերքատվությունը միջակից չի անցնում. նրան կաշի է ողտալործել որպես ելանյութ՝ բերքատու սորտերի հետ խաչաձևելու միջոցով բարձր բերքատու սորտեր ստանալու համար:

Ըստ մեր ղիտողությունների Ճողգին համեմատաբար ուժեղի շատ է տուժում օրդիումից, քան միլդիումից. զգալի չափով տուժում է նաև ողկուղակների:

Տնտեսական-տեխնոլոգիական հատկությունները

Խաղողի մեխանիկական կադմությունը բնութագրելու համար ստորև բերում ենք 1947 թ. կատարված 10 ողկույզի մեխանիկական անալիզի միջին տվյալները.

Ողկույզի կշիռը	666,9	գր
Ողկույզի պտուղների թիվը . .	193	հատ
Ողկույզի պտուղների կշիռը . .	649,7	գր
Մեկ պտղի կշիռը	3,36	գր
Պտուղների ձավալը	508,3	սմ ³

Մեկ պտղի ծավալը	3,1 սմ ³
Չանցի կշիռը	19,3 գր
Ողկույղի մաշկի կշիռը	19,5 գր
Ողկույղի սերմերի կշիռը	13,41 գր
Հյութի և պտղամսի կշիռը	614,69 գր

Հյութի քիմիական կազմությունը 1947 թվի սեպտեմբերի 7-ին Էղեկի օդային 15,8%₀, թթվայնությունը՝ 8,4%₀։

Ճանաչելն խառնում են Մեղրու ստանդարտ սորո հանդիսացող Արևիկի հետ և զորձ են ածում սեղանի զինի ստանդարտ համար։

Р. А. Ергесян

Основные сорта винограда Мегринского района Армянской ССР

Р е з ю м е

Из описанных в статье 6 сортов винограда Мегринского района пять описываются впервые, причем три (Сев Аревик, Шек репсе и Сев ицапук) не указаны в „Списке сортов винограда, находящихся в Армянской ССР“, приведенном в „Ампелографии Армянской ССР“, изданной в 1947 г. в Ереване. Вошедшее в названную Ампелографию описание сорта „Аревик“ в настоящей работе дополнено на основании последующих исследований, произведенных автором.

В начале статьи дана краткая характеристика среды произрастания названных сортов.

Аревик (Алагура). Является основным сортом Мегринского района, занимая 95—98% всей площади садов, за исключением сел. Алидара, где он составляет всего около 75%₀.

Листья голые. Цветки функционально женские. Гроздь в основном рыхлая, при благоприятном опылении плотная, широко коническая, средней величины. Ягода округлая, крупная, в тени желтовато-зеленая, на солнце ярко зеленовато-желтая; мякоть сочная, мясистая, приторно сладкая. Кожица толстая, грубая, покрытая тонким восковым налетом, легко отделяющаяся от мякоти; сок бесцветный.

Начало цветения—в конце мая и в начале июня; начало созревания—в первой половине августа; полное созревание—в первой половине сентября.

Рост сильный; урожайность высокая при благоприятном опылении. Болезнеустойчивость слабая; сильно поражается как милдью, так и оидиумом.

Используется для приготовления в основном крепких столовых и сладких вин, частично—изюма.

Астакот (Айбоган). Считается аборигенным сортом Армянской ССР. В Мегринском районе, за исключением сел. Алидара, занимает второе место.

Листья на верхней поверхности голые, на нижней поверхности пластинка и основные жилки покрыты редким паутинистым опушением. Цветки функционально женские. Гроздь в основном плотная, при благоприятном опылении очень плотная, цилиндро-коническая, иногда цилиндрическая. Ягода—средней величины, эллиптическая, черная; мякоть сочная, кожица сравнительно толстая, покрытая тонким восковым налетом, отделяющаяся от мякоти; сок бесцветный. Начало созревания—в начале августа, полное созревание—в конце августа. Рост сильный; урожайность—при благоприятном опылении—выше среднего. Поражается как мильдью, так и оидиумом, по первым сильнее.

Используется в качестве винного сорта, преимущественно для окрашивания сока сорта „Аревик“.

Черный Аревик (Черн. Алагура). Считается аборигенным сортом Армянской ССР. В виноградниках Мегринского района находится отдельными кустами.

Листья голые. Цветки функционально женские. Гроздь рыхлая, без определенной формы. Ягода округлая, крупная, темнокрасная, мякоть мясисто-сочная, довольно сладкая; кожица сравнительно толстая, покрытая тонким восковым налетом, трудно отделяющаяся от мякоти; сок бесцветный. Начало созревания—в начале августа, полное созревание в конце августа. Рост довольно сильный. Сильно поражается мильдью и оидиумом.

Используется для приготовления столового вина.

Шек ренсе. Считается аборигенным сортом Армянской ССР. В Мегринском районе занимает третье место среди распространенных там сортов.

Листья голые. Цветки обоеполые. Гроздь преимущественно рыхлая, коническая или цилиндро-коническая. Ягода эллиптическая, средней величины, красная; мякоть сочная, сладкая; кожица средней толщины, покрытая тонким восковым налетом, легко отделяющаяся от мякоти; сок бесцветный. Начало созревания—в начале июля, полное созревание—в первой половине августа. Рост средний. Больше поражается мильдью, чем оидиумом.

Используется как столовый сорт.

Сев ицатук. Считается аборигенным сортом Армянской ССР. В виноградниках Мегринского района находится отдельными кустами.

Листья голые, на нижней стороне у основания жилок щетинистые волоски. Цветки обоеполые. Гроздь преимущественно рыхлая, иногда плотная, коническая, иногда цилиндро-коническая. Ягода длинная, крупная, черная; мякоть мясисто-сочная, сладкая; кожица средней толщины, покрытая толстым восковым налетом, трудно отделяющаяся от мякоти. Сок бесцветный. Начало цветения в 1945 г. отмечено 2-го июня. Начало созревания—во второй половине июля, полное созревание—в первой половине августа. Рост сильный. Сильно поражается мильдью, слабо—оидиумом.

Используется в качестве столового сорта.

Тжраки (Турки-куйруги*). Считается аборигенным сортом Армянской ССР. В виноградниках Мегринского района находится отдельными кустами.

Листья голые, с покрытыми у основания щетинистыми волосками жилками. Цветки обоеполые. Гроздь у вершины плотная, у основания рыхлая, иногда вся плотная, цилиндрическая или цилиндрико-коническая, очень длинная. Ягода округлая, средней величины, черная; мякоть сочная, не очень сладкая; кожица средней толщины, покрытая тонким восковым налетом, сравнительно трудно отделяющаяся от мякоти; сок бесцветный. Начало цветения в 1945 году отмечено 6-го июня; начало созревания в конце августа, полное созревание — во второй половине сентября.

Рост довольно сильный. Урожайность, несмотря на величину гроздей, средняя. Сравнительно больше поражается оидиумом и гроздевой листоверткой.

Используется в качестве винного сорта в смеси с основным сортом Мегринского района — „Аревик“. Можно использовать в качестве исходного материала в смеси с урожайными сортами для получения высокоурожайных гибридов.

* Не надо смешивать с Ереванским и Арташатским Турки-куйруги (лисий лавст), являющимся синонимом сорта Чилар.