

Ս. Ղ. Նուսթյան

ԵՐԵՎԱՆԻ ՇՐՋԱԿԱՅՔՈՒՄ ՏԱՐԱԾՎԱԾ ՀՈՆԻ ՄԻ ՔԱՆԻ
ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՒՄԸ

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ

Հոնը պատկանում է այն կուլտուրաների շարքին, որոնք լրիվ չեն առումնաբերված, թեև մի շարք դիտանկաններ, օրինակ՝ Հ. Գ. Բունիաթյանը, Դ. Դ. Յարաշենկոն, Մ. Դ. Գառաբյանը [1], Ա. Ա. Գրոսս-Դեյմը [2], Յա. Ս. Մեդվեդևը [3], Վ. Ս. Սյորոգյանիկը [4], Բ. Վեռտաշյանը [5], Դ. Վ. Ջրուսեիշը [6], Ֆ. Վ. Յերեմիտինովը [7], Ն. Զ. Ումիդովը [8], Ն. Դ. Ունիչևը [9] և ուրիշները զբաղվել են այս կուլտուրայով:

Հոնի պտուղներից պատրաստում են պահածոներ, քաղցրալենիներ, պյուրե, պաստեղներ, չիտթներ, խմիչքներ, օդի, զովադուցիչ ջրեր և այլն: Հայաստանի հյուսիսային շրջանների ազդարնակությունը հոնը օգտագործում է թարմ և չորացրած վիճակում: Չորացրած հոնից պատրաստվում է ընտիր սպաս:

Հոնի տերերները պարունակում են ազադիչ (գարադիչ) նյութ մոտ 12—14 % [6], որն օգտագործվում է կաշեպարծուկյան մեջ: Հոնի փայտանյութը պինդ և ծանր է և լավ հղվելու բնորոշությունն ընդհիվ օգտագործվում է փայտե դարպարանքների համար: Ըստ Դալենի [8] առաջինը հոնի պտուղներն օգտագործել են վերքեր բուժելու համար: Սալերնայի [8] ժամանակվա բժշկությունը հաստատում է նույնը: Ըստ Բոխենի [8] հոնից պատրաստված պահածոներիով բուժում էին տենդը: Հոնից պատրաստված չիտթը և ճրա կորիզն օգտագործվում են փորվածի դեմ: Համախոտրհային առաջին պատերազմի ժամանակ հոնն օգտագործվել է որպես C վիտամինով հարուստ պտուղ—խնդախա հիվանդության դեմ [2]:

Ըստ տեղեկեցիկու Ա. Մ. Ժուկովսկու, հոնի հայրենիքը Առաջավոր Ասիան է և Կովկասը: Հոնը վայրի զբույսն էր տարածված է Կենտրոնական և Հարավ-Արևմտյան Եվրոպայում, Ուկրաինայում, Ղրիմում, Կովկասի և Անդրկովկասի անտառներում: Հոնը Հայաստանում տարածված է հիմնականում Դորիսի, Ղափանի, Շամշադինի, Ալավերդու, Ինչպես նաև Գիրովականի, Դիլիջանի, Մեղրու և այլ շրջաններում:

Հայաստանում պաշտոնաձևից մեջ կուլտուրական մշակության պայմաններում հոնը կալմում է պաղատու ծառերի 0,8 % [6]: Այս նշանակում է, որ հոնի վրա հարկ եղած ուշադրությունը չի դարձված: 1945—1946 թվի պրոդարծություն հաշվառման տվյալներով Հայաստանի տարբեր շրջանների այգիներում մշակության մեջ եղած հոնի տարածվածությունն ունի հետևյալ պատկերը (աղյուսակ 1):

Ինչպես երևում է աղյուսակից, հոնի ծառերի տարածման տեսակետից առաջին տեղը բռնում են Դորիսի և Ալավերդու, ապա Շամշադինի

ու Նոյեմբերյանի շրջանները: Մասերի քանակի տեսակարար կշռով առաջին տեղն է բռնում Շամշադինի (6,8 °) շրջանը, հետո Դորիսի:

Աղյուսակ 1

Շրջաններ	Մասերի տարածումը բաշխված ներքի՝ առ- կուներով	Տվյալ շրջանի պարզաբան մասերի հազար մասն հոնը
1. Դորիս . . .	32	6,2
2. Այսփերդի . . .	22,5	2,7
3. Նոյեմբերյան . . .	12,1	4,3
4. Իջևան . . .	8,7	4,3
5. Մեղրի . . .	4,1	0,7
6. Շամշադին . . .	16,2	6,8
7. Դափան . . .	3,1	1,3
8. Կերտավան . . .	0,2	անշան
9. Աշտարակ . . .	0,2	„
10. Երևան . . .	0,1	„
11. Բերիս . . .	0,1	„
12. Կոտայք . . .	0,1	„
13. Արտաշատ . . .	անշան	„
14. Դիլիջան . . .	„	„
15. Մեջիկ . . .	„	„
16. Էջմիածին . . .	„	„

Հոնը պատկանում է հոնազդիների ընտանիքին [5], սա ինքնափոշոտ-
վող, դանդաղ աճող, երկարակյաց ծառ է կամ թուփ: Ժյուզեբը կանաչ են
կամ մուգ մոխրագույն: Ճիւղերը պարզ են, հարթկյւր, երկարավուն
ձվաձև կամ էլիպսոձև, հետզհետե նեղացող պաղպթով, ծայրին կարճ սրվա-
ծուխյամբ, վերին երեսը մուգ կանաչ է, տակից ստորինը՝ բաց կանաչ,
դասավորված են հակադիր, աշնանը թափվում են: Մազկարույր կիսահո-
վանոց է 9—22 ծաղիկներով, պատված չորս հատ համեմատաբար մեծ
թերթներից կազմված ծածկոցով (նկ. 1): Մազիկն ունի քառասուռ բաժակ,
չորս զեղին թերթներից կազմված պսակ, չորս առեկ և մեկ վարսանդ
(նկ. 1—1, 2, 3): Մազիկներն առաջանում են նույն տարվա, երկամյա և
բազմամյա ճյուղերի վրա:


Հոնը համեմատաբար մեծ բերք է տալիս, նրան նույնպես հատուկ է
պարբերական բերքաավաճումը, բայց այնքան ուժեղ արտահայտված,
որքան մյուս կորիզավորների մոտ: Եթե նրա վերարբմամբ համապա-
տասխան տղրոտեխնիկա կիրառվի, ապա նա անկասկած ավելի կայուն
բերք կտա: Ցասնահիշելից՝ քսան տարեկան հասակ ունեցող հոնի ծառերը
մեր պայմաններում տալիս են 12—15, իսկ ավելի մեծ հասակ և փարթամ

պտակ ունեցողները՝ 20—30 կիլոգրամ բերք, իսկ մշակության ղեկքում փարթամ ծառը կարող է տալ 100—120 կիլոգրամ բերք [4]։



Նկ. 1. Հոնի ծաղկի և պտղի կառվածքը։


Հոնը ցրտադիմացկուն և սովորաբար վաղ ծաղկող է։ Այդ պատճառով տուժում է վաղ դարձանային ջրաերկից, ինչպես, օրինակ, 1949 թ. Երևանի պայմաններում։ Ձմռան ցրտերին բավական լավ դիմանում է։ Պտղի ձևը տարբեր է՝ երկարավուն, ձվաձև, առնձաձև, չլաձև, պահածաձև, տակառաձև և այլն։ Պտղի գույնը լինում է կարմիր, բաց կարմիր, մուգ կարմիր (սևին սովոր), դեղին, Պտղի կշիռը՝ 1—5 գրամ։ Պտղի քիմիական կազմը ստ զրահան տվյալների հետևյալն է.



Նկ. 2. Տախտածե հոն։

Չոր նյութ	16,30—17,09	%
Լճահանուր շաքար	6,88—9,46	»
Խնձորաթթու	2,10—2,89	»
Դարադանյութեր	12,00—14,00	»
Թաղանթանյութեր	0,85	»
Վիտամիններ	28—68, մ/գ	%

Ի նկատի առնենալով հոնի կտրեարությունը ժողովրդական տնտեսության մեջ և դաշտապուշտական տնտեսաշրջանում, մենք անհրաժեշտ համարեցինք ասումնասիրել հոնի այն փաթեթաշնակ ծառերը, որոնք աճում են Երևան քաղաքում ու նրա արվարձաններում և դրա հիման վրա պարզել նրա լայն տարածման սեղիները Արարատյան դաշտավայրում: Մենք այսուհի հարկ ենք համարում բերել մեր հետազոտության ավյալները: Որոշ ավյալներ բերում ենք նաև Հայաստանի մյուս շրջաններում աճող հոների մասին: Ասումնասիրությունները կույց ավին, որ Երևանում և նրա շրջակայքում կան բոլոր պատկերների ձևի հետևյալ ախտի հոներ՝ տակառած, տանձաձև, պանտձև, շչաձև: Ստորև տալիս ենք դրանց նկարագրությունը:




Ֆ. 3. Տանձաձև հոն:

Տակառածն հոն (նկ. 2).— Աճում է Նորքի բարձունքի հյուսիս-արևմտյան թևքովյան վրա: Ծառերը քսան տարեկան են: Ծառի բարձրությունը և պսակի լայնությունը 2-ական մետր է, պսակը բաժակաձև, ճյուղերի զույնը զորշ-մսխրազույն: Նույն տարվա աճող ճյուղերը կանաչ են: Պտուղը տակառածն է, երկու ծայրերը սեղմված են հարթ գաղաթնիկով, նրա մեջտեղը ամենալայն տեղն է: Պտուղը կարմիր է, երկարությունը 1,48 սմ, լայնությունը 1,35 սմ, միջին կշիռը 2,83 գր, որից կորիզները՝ 0,28 գր: Պտղի չոր նյութը կազմում է 16,93 %, բնդհանուր չաքարը 8,04 %, խճճորաթթուն 2,63 %, կորիզը կարճ է և հաստ, գաղաթի կողմը բութ, կաթի կողմն անմիջապես նեղանում է և վերջանում քիչ արվածքով: Կորիզի երկարությունը՝ 1,0 սմ, լայնությունը՝ 0,54 սմ: Այսպիսով, մինչդեռ կորիզի երկարությունը համարյա երկու անգամ ավելի է, քան լայնությունը, պտղի երկարությունը համարյա հավասար է լայնությանը:

Տանձաձև հոն (նկ. 3).— Աճում է Նորքի բարձունքի հարթավայրում, զյուղի մեջ: Կա ութ ծառ: Ծառերի բարձրությունը հասնում է 2,5—4 մ, պսակի լայնությունը՝ 2—4 մ, կան ծառեր, որոնք ունեն մեկից ավելի բուն: Բունը և ճյուղերը զորշ մսխրազույն են: Բնի բարձրությունը հասնում է 80 սմ, տրամագիծը՝ 10—20 սմ: Պտուղը բաժակաձև է, նույն տար-

վա աճող ճյուղերը կանաչ գույնի են: Պտուղը պտղակոթի կողմից զեպի զաղաթիլ չլ մոտով պտղի ամենահաստ տեղն է, սրից սկսած բարակում են և վերջանում հարկի գագաթով, իսկ զեպի կոթունն աստիճանաբար բարակում է: Լրիվ ֆիզիոլոգիական հասունացման ժամանակ կարմիր գույնի է լինում, Երկարությունը՝ 2,32 սմ, լայնությունը՝ 1,59 սմ, միջին կշիռը՝ 2,7 գր, սրից կորիզը՝ 0,59 գր: Կորիզի գագաթի կողմը բուրբ է, իսկ կոթի կողմը սրացած: Չոր նյութը կազմում է 19,79 %, ընդհանուր չափարը՝ 11,01 %₁₀, խնձորաթթուն՝ 2,7 %




Նկ. 4. Կլանաձև հոն:

Գլանաձև հոն (Նկ. 4).—Հայտնաբերված է միայն մեկ ծառ, որը գտնվում է Նորքի բարձունքի Նյուսիս-արևմտյան թևքով լայն վրա: Ծառի բարձրությունը 3 մ է, պտղը՝ ցրված բաժակաձև: Թնի բարձրությունը հողի մակերեսից 10 սմ է, 30 սանտիմետր տրամագծով, սրից ճյուղաժողովում են մի քանի հոտ, իրար հետ խճճված գորշագույն ճյուղեր: Նույն տարվա աճող ճյուղերը կանաչ են, տերևները լայն, երկար և բարակ ծայրով: Պտուղը դեղնաձև է, երկարությունը 2,26 սմ, լայնությունը՝ 1,3 սմ: Դաղաթի հիմքի մոտ միանգամից սկսում է նեղանալ, գույնը կարմիր է:


Թեկ պտղի միջին կշիռը 2,11 գր է, սրից կորիզը՝ 0,3 գր: Կորիզը նույնպես երկարավուն-գլանաձև է, երկարությունը 2,53 սմ է, լայնությունը՝ 0,5 սմ: Դաղաթի կողմը քիչ բուրբ է, կոթի կողմը՝ սուր: Պտղի մեջ չոր նյութը կազմում է 19,7 %, ընդհանուր չափարը՝ 9,8 %₁₀, խնձորաթթուն՝ 2,69 %₁₀:

Գլանաձև հոն (Նկար 5).—Ունում է Նորքի բարձունքի Նյուսիսային թևքով լայն վրա: Նրեանի հոների մեծ մասն այս տեսակից է: Ծառի բարձրությունը 4 մ է, պտղը՝ բաժակաձև, բունը 15 սմ հաստությամբ և 80 սմ բարձրությամբ: Թնի գույնը դուրձ է, նույն տարվա աճող ճյուղերը կանաչ են: Պտղի գագաթի կողմը լայն և հարթ է, գագաթից զեպի կոթի բարականում և երբեմն փոքրիկ վզիկով միանում է պտղակոթի հետ: Լրիվ ֆիզիոլոգիական հասունացման ժամանակ պտուղը կարմիր է, երկարությունը 1,55 սմ է, լայնությունը՝ 1,33 սմ, միջին կշիռը 2,12 գր, սրից կորիզը՝ 0,33 գր: Պտղի նյութը կազմում է 17,28 %, ընդհանուր չափարը՝

6,97 $\%$, խնձորաթխուն 3,11 $\%$, կորիզի երկարությունը 1,33 սմ է, լայնությունը՝ 0,51 սմ. գաղաթի կողմը բուլ է, կոթի կողմը քիչ սրված:



Նկ. 5. Չգածե հոն:



Նկ. 6. Շչածե հոն:

Շչածե հոն (Նկար 6).— Նորքի ձորում հայտնաբերված է երեք պտղատու ծառ: Բերված են Ղրիմից, մոտ 50 տարի առաջ: Ծառի բարձրությունը 2 մ է, պտակը կոնաձև, 1,5 մ լայնությամբ: Ծառը հոգից բարձրանում է մեկ բնով, որի բարձրությունը 30—40 սանտիմետր է: Կեղևը մոխրադույն կամ դորձադույն է, նույն տարվա աճող չիվերը կանաչ: Ծաղկաբույլի բողբոջները խոշոր են: Պտուղը խոշոր է: Պտղադաղաթը հարթ է. աճենամեծ լայնությունը պտղի $\frac{1}{3}$ մասում է, սրտեղից սկսում է բարակել դեպի կոթի կողմը, մինչև պտղի $\frac{1}{4}$ մասը, հետո սկսում է նեղանալ և կաղմում է

Աղյուսակ 2

Հայաստանի մի ըսնի շրջանները հետերի քիմիական անալիզի արդյունքները^{*)}

1	2	Տեղանքները ԱՐՈՒՆՆԵՐԸ և ՎԱՐԱՐՆԵՐԸ							
		Պարբերական	Պարբերական	Պարբերական	Պարբերական	Պարբերական	Պարբերական	Պարբերական	Պարբերական
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Նոյեմբերյան—ձիբանի 1	2,26	87,25	0,20	21,14	11,28	3,39	55,46	
2	Նոյեմբերյան—ձիբանի 2	1,84	89,1	0,20	18,26	10,32	2,99	65,02	
3	Նոյեմբերյան—Վարանի 1	1,97	86,3	0,27	17,22	9,72	2,76	61,44	
4	Նոյեմբերյան—Վարանի 2	2,06	86,6	0,28	19,47	18,08	3,10	50,71	
5	Իգնանի	2,78	84,17	0,44	15,01	5,40	1,05	52,8	
6	Նամազդինի 1	2,41	85,47	0,35	16,15	7,88	2,21	51,2	
7	Նամազդինի 2	2,67	86,13	0,27	14,47	7,98	1,73	50,7	
8	Նամազդինի 3	2,07	82,12	0,36	16,48	7,96	2,28	61,4	
9	Նամազդինի 4	1,64	84,20	0,26	15,85	7,60	2,21	55,4	
10	Մեղրի	2,64	88,60	0,29	15,78	5,70	2,07	46,6	
11	Տակառամ	1,83	82,07	0,28	16,93	8,04	2,63	—	
12	Տանձան	2,7	81,53	0,34	19,79	11,01	2,7	—	
13	Գյուլան	2,11	87,31	0,3	19,7	9,8	2,68	—	
14	Չվան	2,12	87,00	0,33	17,28	6,97	3,31	—	
15	Շան	5,39	87,40	0,56	21,71	8,16	3,49	—	

լայն վիզի, որը միանում է պտղակաթիկ հիմքում և կաղաժում է մուսյին ուսուցիկի, իրիվ ֆիզիոլոգիական հասունացման մասանով պտուղը կարմիր է. երկարությունը 3,2 սմ է, լայնությունը՝ 1,7 սմ. միջին կշիռը 5,39 գր է, որից կարիզը՝ 0,58 գր: Կորիզի երկարությունը 1,8 սմ է, լայնությունը՝ 0,73 սմ: Կորիզի զվեի կողմը բութ է, կոթի կողմն ունի ուժեղ սրվածք: Պաղի չոր նյութը 21,7-ի⁶⁾ է. ընդհանուր շաքարը՝ 8,16⁶⁾, խնձորաթթուն՝ 3,49⁶⁾:

Արևանի շրջակայքի հետերը իրենց քիմիական բարձր պուղանիչներով հետ հեն մնում Նոյեմբերյանի, Նամազդինի, Իգնանի, Մեղրու շրջանների հետերից, որը երևում է 2-րդ աղյուսակում բերված տվյալներից:

Անհրամենտ է մեծ ուշադրություն դարձնել հետի վրա և լայնորեն տարածել նրան նաև Արարատյան դաշտավայրում, մասնակցով պտուղների ասորտիմենտի մեջ: Հարկավոր է մշակել հետի ազդրտեխնիկան և բարձր ազդրտեխնիկայի պայմաններում մշակելով ազնվացնել նրան:

Հայկական ՍՍԻ Գիտությունների Ազգեմիություն
Բույսերի Գենետիկայի և Սելեկցիայի Ինստիտուտ

^{*)} Քիմիական անալիզը կատարվել է Հայկական ՍՍԻ Գիտությունների Ազգեմիության Պաղարտածական Թնայնություն քիմիական լաբորատորիայում, գիտությունների Բեկնածու Սուրեն Մինասյանի գեկվարությունով:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Г. Х. Бунятян, Г. Д. Ярошенко, М. Г. Гаспарян — Содержание витамина С в некоторых дикорастущих растениях Арм. ССР. Изв. Арм. ФАН СССР. № 7 (21), 18, 1942.
2. А. А. Гроссгейм — Дикие съедобные растения Кавказа. Изд. Аз.ФАН, Баку, 1942.
3. Я. А. Мидасов — Деревья и кустарники Кавказа. Тифлис, 1919.
4. В. И. Слободяник — Кизил. Сад и огород, № 8—9, 1946.
5. Р. Веттштейн — Руководство по систематике растений. Москва, 1912.
6. Г. В. Трусевич — Дикорастущие плодовые Азово-Черноморского Края и их использование. Азчериздательство, 1936.
7. Ф. В. Церевитинов — Химия свежих плодов и овощей. Сельхозгиз, Москва, 1933.
8. Н. Э. Умиков — Врачебное применение плодов, ягод и овощей с древнейших времен. Тбилиси, 1947.
9. Н. Д. Уничев — Дикорастущий кизил в Дагестане и его использование. АН СССР. Дагестанская научно-исследовательская база. Тр. первой научной сессии 8—11 октября 1947.

А. К. Нароян

Характеристика кизила, распространенного в окрестностях Еревана

Р е з ю м е

Кизил является хорошим сырьем для консервной промышленности и имеет народнохозяйственное значение.

В Армении он распространен в основном в Горисском, Иджеванском, Кафанском, Алавердском, Шамшадинском, Ноемберянском районах, в незначительном количестве встречается в Дилижанском, Кироваканском, Аштаракском районах и в окрестностях гор. Еревана.

Кизил по количеству деревьев составляет 0,8% плодовых Армении, в указанных основных же районах возделывания от 16 до 32% плодовых.

Анализ плодов кизила Армении показали высокое содержание сахара, витаминов, хорошую плотность.

В окрестностях Еревана встречаются разновидности кизила: с бочкообразными, грушевидными, яйцевидными, округлыми плодами, имеющими также высокие показатели. Однако, культуре кизила в Армении не уделяется должного внимания. Необходимо изучить имеющиеся у нас разновидности кизила, разработать его агротехнику и включить его в сортимент плодовых Армении, а также широко использовать его при посадке защитных лесных полос.