

Գ. Գ. Խաչարյան

ԹԹԵՆՈՒ ԱՋՔԱՊԱՏՎԱՍՏՆԵՐԻ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ

Առաջին անգամ ռեսպուբլիկայում թթենու պիտական տնկարան կազմակերպվել է Էջմիածնում՝ 1930 թվին. 30 հեկտար տարածություն, իսկ հետագայում նաև շերամապահական մի քանի խոշոր կոլտոշներում, որտեղից տարեկան մի քանի միլիոն սորտային սնկիներ են արտադրվում:

Նպատակ դնելով իրագործություն մեջ (տնկարաններում և թթստաաններում) փորձարկել գարնան և աշնան աչքապատվաստները և դառնիլ նրանց կիրառման ամենալավ ժամկետները, ինչպես նաև օգտագործել ամռան աչքապատվաստները սովիկի լայն մասշտաբով, երևանի գիտահետազոտական շերամկայանի կողմից առաջին անգամ 1935—1938 թ. թ. ընթացքում Էջմիածնի թթենու տնկարանում և Շերամկայանի հողամասում զբվել են աչքապատվաստների ժամկետների փորձերը:

Ն. Շավրուք [1] հայտնում է, որ թթենու աչքապատվաստը կարելի է կատարել գարնանն ու ամռանը: Դարնանը պատվաստը կատարում են միայն արմատները ամբողջած վայրակների վրա, իսկ ամռան պատվաստը աչի վայրակների՝ որոնք տնկված են աշնանը կամ վաղ գարնանը: Դարնան պատվաստը կատարում են աչի ժամանակ, երբ սկսվում է սննդափոխանակության շրջանը. ամռանը, երբ դարնան ռոտերը բավական ամրանում են, որը սովորաբար լինում է ոչ չուտ քան հունիսը:

Յու. Ա. Բակուլինը [2] իր փորձերից եզրակացնում է, որ աչքապատվաստի ամենալավ ժամկետը համարվում է ապրիլ ամսվա սկիզբը՝ 1—12-ը (աչքերը կպել են $21,14^{\circ}$), որովհետև նույն տարում կատարած այլ ժամկետների փորձերը սովիկ են որոշակի բացասական արդյունք (հունիսի 15-ին կպել են 2° -ով, հուլիսի 1-ին՝ 4° , հուլիսի 15-ին՝ 21° , օգոստոսի 1-ին՝ 12° , սեպտեմբերի 15-ին՝ 2°):

Ս. Մ. Ստարոուխովը [3] դառնում է, որ սնկիների բների և թփերի վրա աչքապատվաստի ամենալավ ժամկետը համարվում է թթենու դաբադաման երկու-ֆուկերի՝ բողբոջների բացվելու և մասնը տերեւների երևալու շրջանը, մոտավորապես 15 օր: Ավելի վաղ և ավելի ուշ ժամկետներում աչքերի կաշոդակնանությունը իջնում է. ավելի վաղ շրջանում աչքապատվաստի կաշոդակնանության իջնիլը բացատրվում է անբարենպաստ եղանակներով և բույսի մեջ ոչ բավարար հյուսվածքմամբ: Ավելի ուշ ժամկետում՝ հյուսվածքման ուժի թուլացմամբ, պատվաստակալի ծերացմամբ, որի հետևանքով ստեղծվում է հոտակային տնկավաստրվյուն պատվաստակալի և պատվաստացուի միջև:

Ձմեռած կորսնիկներով ամռան աչքապատվաստի ամենալավ ժամկետը համարվում է հունիսի 19-ը (կպել են $82,5^{\circ}$ -ով): Ավելի ուշ՝ հուլիսի 19-ի ժամկետում իջնում է աչքապատվաստի կաշոդակնանությունը ($40,9^{\circ}$):

Նախալովկայանի պայմանների համար արժեքացող ամռան կանաչ

աչքապատվաստի լավագույն ժամկետը համարվում է հուլիսի երկրորդ տասնորյակը:

ԵՔնած աչքով առօրինակ աչքապատվաստի ժամանակ աչքերը կպչում են բարձր տակտով (90—35⁰), սակայն ձմռան ընթացքում աչքերը փչանում են, անկախ նրանից, թե նրանք ձմեռը ծածկված են եղել հողով, թե ոչ:

Ս. Գ. Բեգարաշվիլին [4] ձմռան կտրոնները պահելով ստացարանում համապատասխան պայմաններում մինչև հուլիսի 15-ը, և յոթնամյա բարձրարուն ծառերի վրա պատվաստելով զարնանը՝ ապրիլի 17-ից մինչև մայիսի 15-ը, ապա ամռանը՝ հունիսի 2-ից մինչև հուլիսի 10-ը, և ընթացիկ տարվա կանաչ կտրոններով՝ հուլիսի 17-ից մինչև օգոստոսի 16-ը, եկել է այն եզրակացություն, որ ձմեռած կտրոններով զարնան և ամռան աչքապատվաստները ավելի բարձր տակտով են կոչում և արժեանքավոր (զարնանը՝ 72,2—83,1⁰, իսկ ամռանը՝ 77,8—91,0⁰), քան ամռան ընթացիկ տարվա կանաչ կտրոնների աչքապատվաստները (38,6—47,5⁰):

Հայանի է, որ Ի. Միչուրինը իր բաղմաթիվ փորձերով ապացուցել է երիտասարդ հիբրիդի պատվաստացուի և պատվաստակալի փոխադրեցություն, մենտորի և վեգետատիվ հիբրիդացման դերը նոր սորտեր ստանալու գործում [5]:

Հիբրիդի պատվաստացուի և պատվաստակալի փոխադրեցությունն ապացուցված է նաև թթագործություն մեջ [6]:

Ճվալ աշխատությունում աչքապատվաստի ժամկետների փորձերը զրվել են միայն թթենու բաղմացման համար լավագույն ժամկետը զբաղեցնող իմաստով, կանոց չառնելով պատվաստացուի և պատվաստակալի փոխադրեցություն վրա, որովհետև թթենու աչքապատվաստով բաղմացման ժամանակ, թե պատվաստացուն և թե պատվաստակալները արտադրություն մեջ վերցնում են, և մեր փորձերում էլ վերցված են, հաստակավոր ծառերից և վայրի տնկանյութից:

ՓՈՐՁԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՆ ՈՒ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆ

Աչքապատվաստի փորձնական աշխատանքները կատարվել են էջմիածնի թթենու տնկարանում և Երևանի գիտա-հետազոտական շիրմապահական կայանի հոգամասում, որը գտնվում է Երևան քաղաքից դեպի էջմիածին տանող ճանապարհին, 6 կմ հեռավորության վրա:

Այսպիսով, փորձերը զրվել են Արարատյան հարթավայրի նյութական պայմաններում, որտեղ ամենատաք ամիսներին—հունիս, հուլիս և օգոստոսը միանգամայն նպաստավոր է թթենու աճման ու զարգացման համար, իսկ տարեկան մաքսիմում ջերմության պայմաններում (մինչև 40⁰ C) նրա աճեցողությունն արագանում է: Ամենացուրտ՝ զեկտեմբեր, հունվար և փետրվար ամիսներին թթենիները չեն ֆուսկում, իսկ բացարձակ մինիմում ջերմաստիճանում (—29,5⁰ և —27,4⁰) նայած տեղին, խնամքի պայմաններին և այլն, թթենիները ֆուսկում են մասնակիորեն: Տարեկան տեղումների քիչ քանակի պատճառով թթենու մշակումը հնարավոր է միայն արհեստական ստորման պայմաններում: Այսպիսկան տյու պայմաններում թթենիները սկսում են բողբոջել ապրիլ ամսվա կեսերից, տերևները բաց-

վում են ապրիլի վերջերից, մայիսի սկզբներին: Ամառվա ուժեղ շոգերն անցնելուց հետո գալիս է մեղմ ու երկարատև աշունը, որի հետևանքով թթննու վեղետացիան բավական երկարում է և նայած սեղին, ծառերին տված խնամքին, թթննու սորտին և այլն, տերևաթափը տեղի է ունենում նոյեմբերի վերջերին, մինչև իսկ դեկտեմբերի սկզբներին:

Անջապատվաստի ժամկետների փորձերը զրվել են 1935 թ. էջմիածնում ամռանը՝ հուլիսի 1—3-ին, 1936 թ. ապրիլի 10-ից մայիսի 5-ը, յուրաքանչյուր 10 օրը մեկ անգամ և օգոստոսի 10-ից մինչև սեպտեմբերի 15-ը, 20 և 15 օրը մեկ անգամ, երկամյա տնկիների վրա: Այնուհետև երևանի գիտա-հետազոտական շերամկայանի հոգամասում բարձրարուն (150 սմ) թթննիների պսակի վրա 1937 թ. դարձանը՝ ապրիլի 24—30-ը և հուլիսի 5-ին: Փորձնական աշխատանքների արդյունքները արտադրութային մեջ ստուգված են 1936—40 թ. թ. ընթացքում:

Դարձանը պատվաստները կատարված են նախորդ տարում տնկված տնկիների վրա, աշնանը՝ տվյալ տարվա դարձանը տնկած, իսկ ամռանը՝ տվյալ տարվա դարձանն ու նախորդ դարձանը տնկվածների վրա, բոլոր ղեպքերում էլ արմատավզից 5—6 սմ բարձրությամբ: Բարձրարուն ծառերի վրա անջապատվաստը կատարված է պսակի ճյուղերի հիմքից՝ 5—6 սմ բարձրությամբ, յուրաքանչյուր ճյուղին 2-ական աչք:

Դարձան պատվաստի համար ձմեռած կտրոնները պատրաստվել են մարտ ամսվա ընթացքում, և մինչև պատվաստելը պահվել խոնավ ավազում, պահեստում՝ 6—7°C ջերմությամբ պայմաններում: Աշնան պատվաստը կատարված է տվյալ տարվա կանաչ կտրոնների աչքերով, իսկ ամռան՝ մինչև պատվաստի ժամկետը աճած դարձան՝ նույնպես կանաչ կտրոնի աչքերով: Ամռանը և աշնանը կտրոնները պատրաստված են անջապատվաստ կտաարիկու օրը: Ամռան և աշնան պատվաստացու աչքերը հանված են առանց բնափայտի, իսկ դարձան՝ մի փոքր բնափայտով:

Դարձան և ամռան պատվաստի ժամանակ պատվաստակալի կողքի շիվերը մաքրված են արմատավզից հաշված 10 սմ բարձրությամբ: Պատվաստի 3—5-րդ օրը մասնակիորեն կտրվի են պատվաստակալի շիվերը, իսկ պատվաստաճյուղը 5—6 սմ բարձրությամբ հասնելուց հետո, նաև բուռնը՝ թողնելով բուռնի, Բուռնիները հեռացնելուց հետո, պատվաստաճյուղերը կապվել են նրանց մոտ տնկած 60—70սմ բարձրությամբ ձողին:

Որպեսզի աչքերը չբացվեն, աշնանը պատվաստակալը մաքրվել է արմատավզից հաշված միայն 10 սմ բարձրությամբ, թողնելով վրան բոլոր փայտած շիվերը:

Հողի մշակումը և պատվաստների խնամքը կատարված է ագրոկանոններով նախատեսված դուրսույններով:

Ձմռան ցրտերից պաշտպանելու համար մինչև ցրտերի բնկնելը պատվաստած աչքերը ծածկվել են հողով:

ՓՈՐՁԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԵՐԸ

Մինչև մեր փորձերը, տնկարանում ամռան պատվաստը կատարում էին նախորդ տարվա դարձանը տնկված տնկիների վրա, այսինքն տնկելուց յրբի մեկ և կես վեղետացիա հետո, հունիսի վերջերից մինչև հուլիսի սկզբները: Այսպիսով՝ դարձան պատվաստի հետ համեմատած ամռան պատ-

վատոր մոտ երեք ամսով ուշանում է: Դրա հետևանքով, ինչպես մեր փորձերը ցույց են տալիս, պատվաստի տարվա վերջում ճյուղերի աճն այնքանից ցածր է (տես աղ. 1), որ տվյալ տարում նրանցից չի կարելի ստանալ ստանդարտին համապատասխանող (125 – 150 սմ) բարձրություն տնկանյութ: Նայած սորտին պատվաստոճյուղը աճել է 30,5 սմ – 45,5 սմ: Այստեղից հետևում է, որ ստանդարտին հասցնելու համար այդ տնկիները մեկ տարի ևս պետք է աճեցնել, իսկ դա նշանակում է սորտային տնկանյութ ստանալու համար անհրաժեշտ է երեք տարի:

Բացի դրանից, ինչպես երևում է աղյուսակից, աչքապատվաստի կպչողականությունը ցածր է:

Ամռան աչքապատվաստի ժամկետը օդտաղործելու և ընդհակառակը սորտային տնկանյութ ստանալը արագացնելու նպատակով, վայրակների տնկման տարին, ամռանը կատարվել են աչքապատվաստներ տվյալ դարձանը տնկված վայրակների վրա:

Հուլիսի 1–3-ին կատարած աչքապատվաստ

Աղյուսակ 1

Դիտարկվող տարի	Թթենու սորտերը	Աչքապատվաստի կպչելու աս. %	Պատվաստոճյուղի միջին երկար. սմ	Հաստութ. արմատաՎզի մոտ սմ
1	Ա ն կ ո բ ի դ	71,6	30,5	2,0
2	Կ ո կ ու ս ո 70	65,0	45,5	2,5
3	Կ ա տ ա ն ե ո	75,0	40,8	2,7

Դառնան աչքապատվաստ

Աղյուսակ 2

Դիտարկվող տարի	Թթենու սորտերը	Աչքապատվաստի ժամանակը	Աչքապատվաստի կպչելու աս. %	Պատվաստոճյուղի միջին երկարութ. սմ	Հաստութ. արմատաՎզի մոտ սմ
1	Ա ն կ ո բ ի դ	10/IV	90,0	—	—
2	Լ ու	20/IV	80,0	134,0	6,0
3	Կ ա ն բ ո ս ո *	" "	90,0	135,0	5,8
4	Նեղումիզանաի	" "	83,0	133,0	6,4
5	Կոկուսո 70	" "	93,0	201,0	8,3
6	Օ շ ի մ ա	30/IV	88,0	200,0	6,5
7	Կայերիորոս	5 V	81,0	222,0	8,0

Այդպիսի աչքապատվաստի արդյունքները բացասական էին: Նրանք կպել էին միայն 15–20⁰ օ-ով: Տնկիների կեղևը բնավայտից զովորությամբ անջատվելու պատճառով նստրավոր չէր լինում աչքը կանոնավոր

տեղավորել կտրվածքի մեջ: Տնկինների կեղևի զգվարտությամբ անջատվելը պետք է բացառել հյուսիսաշարժման ցածր աստիճանով, որն սղղել է նաև աչքերի կաշոդականության վրա: Աստ երևույթին արժատային սիստեմը հողում դեռևս չի ամրացած չլինելու պատճառով, հյուսիսաշարժը բավարար չափով չի կատարվում:

Ամռան պատվաստը տնտեսապես բարձր արժեք չունենալու պատճառով, անհրաժեշտ էր փորձարկել զարնան և ամռան աչքապատվաստները և գտնել նրանց լավագույն ժամկետները:

Գարնան աչքապատվաստների ժամկետների փորձերը, որոնք զրվել էին ապրիլի 10-ից մինչև մայիսի 5-ը, տվել են հետևյալ արդյունքները (աղ. 2): Տարբեր ժամկետներում ստույգ սորտերի աչքերը կպել են 81-ից մինչև 93⁰ -ով, որը շատ ավելի բարձր է, քան ամռան աչքապատվաստի կաշոդականությունը:

Անկորիզ թթնու ապրիլի 10-ի աչքապատվաստները, որոնք կպել էին 90⁰ -ով, բողբոջների արթնանալու ժամանակ եղանակների անկայունություն պատճառով փչացան, որի պատճառով աղյուսակում ցույց չի տրված այդ ժամկետի պատվաստաճյուղերի աճը: Ապրիլի 20-ին պատվաստած բոլոր սորտերի աչքերը կպել են բարձր տոկոսով, և մինչև օգոստոսի 25-ը (ուսումնասիրության օրը) նրանց պատվաստաճյուղերը աճել են 133 սմ-ից մինչև 204 սմ երկարությամբ:

Չնայած նրան, որ երկրորդ ժամկետից հետո (20/IV), երրորդ և չորրորդ ժամկետներում պատվաստները կատարվել են 10 և 15 օր հետո, այնուամենայնիվ այդ ժամկետների պատվաստների ճյուղերը նույնպես հասել են 200—222 սմ բարձրության: Իհարկե դա կախված է սորտերի աճեցողության ընդունակությունից, բայց և այնպես փորձերը ցույց են տալիս, որ մայիսի 5-ի աչքապատվաստի ժամկետում էլ կարելի է ստանալ ստանդարտին համապատասխանող բարձրարուն տնկանյութ:

Գարնան աչքապատվաստի ժամկետների այդ փորձերից կարելի է եզրակացնել, որ ապրիլ ամսվա առաջին տասնօրյակում եղանակների անկայունության պատճառով աչքապատվաստները անհաճող են ընթանում: Մնացած ժամկետներում մեկ վեգետացիայի ընթացքում կարելի է ստանալ բարձրարուն ստանդարտ տնկանյութ: Այնուհետև զարնան աչքապատվաստների կաշոդականությունն ավելի բարձր է (միջինը՝ 86,4⁰/₁₀₀), քան ամռան (միջինը՝ 70,5⁰/₁₀₀):

Առնան աչքապատվաստների վերջնական արդյունքը երևում է հետևյալ տարվա գարնանը, դրա համար էլ կաշոդականության աստիճանը պարզելու համար աչքերը ստուգվել են երկու անգամ առաջին՝ հոկտեմբերի միջերին, երբ աչքերի կաշոդականությունը վերջնականապես կարելի էր ճշտել, և երկրորդ՝ հետևյալ զարնանը, ապրիլի վերջերին: Երկրորդ ստուգման նպատակն էր պարզել աչքերի ցրտահարման աստիճանը ձմռան ընթացքում:

Առնան աչքապատվաստների ժամկետների արդյունքները ցույց են տրված աղ. 3-ում: Աղյուսակից երևում է, որ առնան աչքապատվաստի բոլոր ժամկետների աչքերի կաշոդականությունը նույնպես բարձր է, ինչպես զարնան: Հոկտեմբերին ստուգելու ժամանակ դա կզիլ է 81—90⁰ միջինը՝ 86⁰/₁₀₀, որը նույնն է, ինչ որ գարնանը:

Չնայած նրան, որ ձմռան ընթացքում աչքերը հազով ծածկված են եղել, այնուամենայնիվ նրանք ցրտահարվել են 2,5—4,3°-ով:

Առաջին ժամկետի՝ օգոստոսի 10-ի պատվաստի աչքերի 49°-ը արթնացել են, որոնք փչացել են ձմռան սոռձին ցրտերից:

Նման երևույթ նկատվեց նաև էջմիածնի տնկարանի արտադրական աչքապատվաստի ժամանակ 1938 թ. աշնանը: Օգոստոսի 17-ից կատարած 68,935 աչքապատվաստներից կպել էին 61,560 հատ. կամ 89,3% -ը, որոնցից սոռձին օրերի՝ օգոստոսի 17, 18-ի պատվաստներից արթնացել էին մոտ 5% -ը:

Երկրորդ և երրորդ, այսինքն սեպտեմբերի 1-ի և 15-ի պատվաստներից աշնան ընթացքում աչքերը չեն բացվել, որից եզրակացնում ենք, որ աշնան աչքապատվաստը պետք է կատարել օգոստոսի վերջերին: Օգոստոսի սկզբներին կատարած պատվաստների աչքերի բացվելու պատճառը Արարատյան հարթավայրի երկարատև և սառն աշունն է, որի հետևանքով թթենու վեղետացիան երկարում է, և աճեցողությունը շարունակվում է մինչև խորը աշուն: Վաղ պատվաստի ժամանակ աչքերը զտնվելով տաք պայմաններում, բացվում են: Համեմատաբար ուշ կատարած աչքապատվաստները կպչում են հաճույք և մնում են քնած զրոյ թյուֆ մինչև դարուն: Որինակ, մեր 1936 թվի այս փորձերից հետո, նույն էջմիածնի տնկարանում փորձնական-արտադրական նպատակով 1937 թ. օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 15-ը կատարած



Նկ. 1. Սուրտ կոկոստ 70. Աչքապատվաստը կատարված է ապրիլի 20-ին, նկարահանված է օգոստոսի 25-ին:

13.300 կպած պատվաստի աչքերից աշնան ընթացքում ոչ մեկը չէր արթնացել:

Աշնան աչքապատվաստներին վտանգ կարող են սպառնալ ձմռան ցրտերը: Վերևում մենք առաջինք, որ այդ վտանգը կանխելու համար

Աշխատանքային ժամկետները

Աղյուսակ 3

ԲՔԻՆՈՒ ՍՏՐՈՐ	Աշխատանքային ժամանակը	Կողմնակի		Տվյալ աշխատանքային արժեքի բան- աժողով	Պատժանքային միջոցի մի- ջին եր- կար ամ
		Լուսնի բնի	Նախաշխատանքային արժեքի		
	10-VIII	88.6	33.5	18.8	112.4
Ա Ն Գ Ո Ր Ի Ղ	1 IX	90.0	86.7	—	138.9
	15 IX	81.5	70.0	—	140.1

աշխատանքը պետք է հողով ծածկել, ինչպես արել էինք թե մեր փորձերի, և թե էջմիածնի տեղաբնակի փորձնական-արտադրական աշխատանքային ժամանակի 2-րդ փուլում, որ մեր փորձերի ժամանակ ձմռանը թաղարան աշխատանքային ժամանակի 2,5—4,3 -ը փչացել էր, նման երևույթ եկառվել էր էջմիածնի տեղաբնակի 1937 թ. փորձնական-արտադրական աշխատանքային ժամանակի 1938 թ. ապրիլի 2-ին ստուգելով պատժանքային կողմնակի միջոցներ, պարզվեց, որ ձմռան շրջանի անցնելուց հետո աշխատանքը կապել էին 85⁰ -ով, Սակայն նույն թվի օգոստոսի 10-ին նորից ստուգելով, հայտնաբերվեց, որ պատժանքային փուլի նման միայն 75⁰ -ը, ծնացած 14⁰ -ը փչացել էին անհույս խնամքի, ինչպես նաև ձմռան ընթացքում, որը չէր եկառվել ապրիլի 2-ի ստուգման ժամանակ, քանի որ աշխատանքը ղեկ չէին բողբոջել:

Օգոստոսի 25-ին, չափելով աշխատանքային ժամկետների պատժանքային փուլերը, պարզվեց, որ նրանց միջին երկարությունը եղել էր 139—142 ամ, որոնցից կարելի էր ստանալ բարձրագույն թվերներ (նկ. 2):

1938 թ. օգոստոսի 16-ին էջմիածնի տեղաբնակի 1937 թ. աշխատանքային ժամկետների պատժանքային փուլերի 87,0⁰ -ի պատժանքները ձևավորված էին 125 ամ բարձրագույն վրա, որոնցից յուրաքանչյուրը մինչև վեց-տասնիայի վերջը իրենց վրա ունեին 40—45 ամ երկարություն պատժանքի հիմնական միջոցներ, Այնպիսի բարձր բուն շտապակերտ պատժանք բաղկերից հիվանդություններ էր, որը տարածված էր էջմիածնի տեղաբնակի:

Մեր այդ փորձնական և տեղաբնակի փորձնական-արտադրական աշխատանքային ժամկետների աշխատանքներից կարող ենք եզրակացնել, որ Արտադրական հարձակվելու պայմաններում տեղաբնակներում աշխատանքային ժամկետները նույնպիսի զրախան արդյունք են տալիս, ինչպիսին տալիս են դարձան աշխատանքային ժամկետները:

Մեզ մոտ ղեկ չառ հայտնաբերված թվերները հիմնված են ոչ փորձնական վայրի թվերներով, Այդպիսի թվերները անհրաժեշտ է վերադաստիարակել կուլտուրական ստուգելով, նրանց տեղի բերականությունը բարձրացնելու նպատակով: Փարզ է, որ այդպիսի թվերները պետք է վերադաստիարակել թվերային ժամկետներում, նախկիններում դրանք պատժանքային են միայն ամսաներ, չերաժի կերակրումները վերջանալուց հետո, որ-



Նկ. 2. Սորո կոչուտ 70, Աշրապատվապուր կատարված է սեպտեմբերի
1-ին, նկարահանված է օգոստոսի 25-ին:

պնդել նախ օգտագործվելու տեղեկություն, ապա ղեկավարումով անտվեկն կոնկրետ -
բանաճ ստրուկտուր:

Այդ ժամկետի պատվառաների ժամանակ, որը տեղի է ունենում պատվաստացուի բուրժները հատուցանալու շրջանում, այն է՝ հունիսի վերջերից մինչև հուլիսի սկզբները իրեն պատվաստացու օգտագործում են տվյալ տարվա, մինչև այդ ժամկետը աճած երիտասարդ կանաչ չիվերրո Որոշ հեղինակներ [3] զանում են, որ այդպիսի պատվաստացուի աչքերով կատարված պատվաստները ավելի ցածր ազդեցությամբ են կազմում, քան ձմեռած կտրանների աչքերով պատվաստները: Մեր փորձերը ցույց են առելու, որ Արարատյան հարկավայրի կլիմայական պայմաններում այդ չի արդարա-

1937 թ. հունիսի 5-ին ավյալ տարվա կանաչ ճյուղերի հաստանացած աչքերով պատվաստելով նույն տարվա մինչև հունիսի 5-ը աճած կանաչ պտտվաստակալ ճյուղերի վրա, աշխինքն օգտագործելով հասակակից կամ-պոնենտներ, փորձերը ջույց են տվել, որ աշխարհի զեպքում աչքերը ոչ միայն կպոմ են բարձր տեխնոլոլ, այլ և մինչև վեղետացիայի վերջը տա-լիս են բավական երկար շիվեր (ազ. 4)։

Աղյուսակ 4

[illegible]

Աղյուսակից Երևամ է, որ նախած ստորին աշգրտի կպել են 79—81¹ ճ-ով, իսկ պատմության ճյուղերի միջին աճը եղել է 83—96 սմ.

Վեղեհատաղիտն չբջանը կտրե լինելու պատճառով այդ ժամկետի պատ-
վաւստ յուղերը համեմատաբար կտրե են լինում, լրիւ չեն հասունանում
և ձմեռան ընկիւղքում ճուղերի ծայրերը ցրտահարվում են $8-10^{\circ}$ ջ-ով,
որն առանձնապէս վտանգաւոր է, քանի որ հետեւյալ տարվա դարնանը
չկրաի կերակրման ժամանակ այդ պտտվաստանջուղերը կտրու են հիմ-
քիդ հաշված մաս 45-50 սմ բարձրության վրա, սրտի կատուցելու հա-
մար:

Ըստ հաճախ տնկաբաններից բաց են թողնվում ոչ սորտային վայրե բարձրորտն խիճենի, որոնց սորտային խիճենու փոխադրվելը կատարվում է խիճաստեղծում տնկման առաջին տարիներին մինչև շերտի կե-
քակրման համար նրանց օգտակար չլինելը։ Այդպիսի խիճենիների պատվաստման համար մեծք կիրառել ենք զարնան ժամկետի աշտարակայանում։

1937 թվի ապրիլի 25—30-ը խխառանի երիտասարդ բարձրարուն (անվամբ 1935 թվին) ծառերի պտակի վրա կատարված են աչքապատվաստներ խխենու զահապան ստրուկերով, որոնց արդյունքը պույկ է տրված աղ. 5-ում:



Նկ. 3. Լորիտասարդ չղզուաղործվող բարձրաբուն ծառերի զարնան ապառազառվառառ
Պատվառառ կատարվառ է աղբիլի 30-իռ, Նկարառնառվառ է օղոռառառ 23-իռ

Աղյուռակիղ Լրևոռմ է, որ բարձրառուն ծառերի վրա Լա, զարնան առառվառառների աղբերը բարձր առկառոռ Լն կղչոռմ: Նառառ սարոռին, Նառառնոռմ է մինչև 87⁰ զ-ի, իսկ առառվառառառնոռղի մինչին առմռ՝ 120 — 171 ոռմ: Բարձրառուն ծառերի առակի ծառվոռմառն Նառառառ առնչառռռնոռ չԼն աղղրառն Լրկարոռթյառն ճյուղերը Պառկի առառջին Լարկի Նառառառ բառվառկառն Լն մինչև իսկ 50 սմ Լրկարոռթյառմռ ճյուղերը ԼթԼ առառվառառառնոռղերը 60 սմ բարձրոռթյառն ԼառնԼոռղ ԼԼառո կարԼինը 50 սմ բարձրոռթյառն վրա, առառնառառառառառթյառն ԼոռնԼնառյինը մԼկ վԼղԼառառթԼառյի րնթառղթոռմ սառառառ Լրկ-Լարկառնի առակ, քառնի որ առառվառառառնոռղերը առղ բարձրոռթյառմռ կոռԼ-յառղ Լառո, Նառիղ զառթս կղառյին Նառ չիվԼը, որոռը կառԼին Լա 70 — 80 սմ

Պարենան աշխատավարձերը և բիտառաբեր ծառերի վրա

Աղյուսակ 5

Աշխատավարձի կարգի	Թիֆլիսի աշխատավարձերը	Աշխատավարձի կարգի	Պարենան աշխատավարձերը	Հատուկ արժեքի մասին
1	Աշխատավարձի	87,2	137,1	2,6
2	Նախնական	80,7	149,0	2,8
3	Կենտրոնական	76,4	161,6	2,6
4	Բարձրագույն	70,8	120,1	2,7
5	Տնօրենի	82,0	164,7	3,0
6	Ծառաբեր	80,4	171,0	2,0
7	Բարձրագույն	85,2	146,3	2,0
8	Կենտրոնական	84,6	135,0	2,7

քաղաքում, որոնց վրա հետևյալ տարիներին հնարավոր կլինի կառուցել նաև երրորդ հարկը (նկ. 3)։

Այսպիսով մեր փորձերով ապացուցվում է, որ թիֆլիսյան մեծ ևս կիրառելի են դարձան և աշխատավարձերը, և որովհետև է նրանց լավագույն մասկետները։

Մեր փորձական աշխատանքների հետ մեկտեղ էջմիածնի թիֆլիսյան տնկարանում փորձական-արտադրական նպատակով 1936 թ. աշխատելու և աշխատավարձի 6000 վաճառքի վրա հետազոտում աշխատելու և աշխատավարձի քանակը յուրաքանչյուր տարի ավելանում է, բարձրա-նախնային և աշխատավարձի կազմակերպության քանակը, որը երևում է աղյուսակ 6-ից։

Աղյուսակ 6

Աշխատավարձի քանակը և նրանց կազմակերպություն	1936 թ.		1937 թ.		1938 թ.		1939 թ.		1940 թ.	
	Աշխատավարձի քանակը	Կազմակերպություն	Աշխատավարձի քանակը	Կազմակերպություն	Աշխատավարձի քանակը	Կազմակերպություն	Աշխատավարձի քանակը	Կազմակերպություն	Աշխատավարձի քանակը	Կազմակերպություն
Էջմիածնի տնկարան	6.000	83,7	13.300	88,7	68.935	89,3	107.500	92,0	139.000	95,0

Հետազոտում 1936 թվից մինչև 1941 թ. թիֆլիսյանը աշխատելու և նաև թիֆլիսյանը շրջանների կոլեկտիվներում, ըստ որում յուրաքանչյուր տարի աշխատավարձի քանակը միշտ ավելացել է։ Այսպես՝ 1936 թ. աշխատելու և աշխատավարձի 18.100 աշխ. 1937 թ.՝ 41.025, 1938 թ.՝ 202.770, 1939 թ.՝ 392.730, 1940 թ.՝ 400.000 հատուկ։

Աշխատավարձերի հետ մեկտեղ թե կոլեկտիվներում և թե էջմիածնի թիֆլիսյան տնկարանում կիրառել են նաև դարձան աշխատավարձերը։ Սակայն վերջին տարիները հատկապես 1946 — 1948 թ.թ. աշխատելու և

պատմաստները անհաջող արդյունք են ապրիս, որն արտահայտվում է նրանով, որ աչքերը թեպետ կաշտվում են բարձր տեղում, բայց հետևյալ դարնանը նրանց մեծ մասը չի բուրժում և փչանում է:

Այն փաստը, որ աշնան աչքապատմաստի աչքերը կաշտվում են բարձր տեղում, դա ասում է այն մասին, որ աշնան շրջանում թթենու մեջ հյութաշարժն ընթանում է այնպիսի թափով, որ նա հնարավորություն է տալիս միացնելու պատվաստողուի և պատմաստակալի չափածքները:

Մենք այն կարծիքին ենք, որ վերջին տարիների աշնան աչքապատմաստների անհաջող լինելը կախված է ոչ թե թթենու ազդարարողիական հատկություններից, այլ ձմռան շրջանի արտակարգ պրակներից և ազդումի-ջողատումների ոչ լրիվ կիրառումից:

Բնչպես վերը հիշատակել ենք, աշնան պատմաստները կատարվում են օգոստոսի վերջերից մինչև սեպտեմբերի 20-ը, կամ վերջերը: Պատմաստ կատարելուց հետո, մինչև ձմռան առաջին ցրտերն ընկնելը անցնում են մոտ 2-3 տաք ամիսներ, որից հետո սկսվում են ցրտերը: Այդ ժամանակաշրջանում պետք է գտնել պատմաստած աչքերը բուկ տալու ամենալավ ժամանակը, որպեսզի մինչև ձմռան ցրտերն ընկնելը նրանք պաշտպանված լինեն վտանգից:

Առկայն շատ հաճախ պատմաստի աչքերը ծածկում են այն ժամանակ, երբ զեռ շարունակվում են տաք եղանակները: Նրանք գտնվելով տաք և խոնավ հողում՝ փռվում են: Պատահում է աչքերը ծածկում են աշնան երկարատև շոգերից հետո հանկարծակի սկսած ցրտերի ժամանակ, երբ տաք պայմաններից հետո ցրտերի մեջ ընկած աչքերը ջրոտահարվելով, փռվում են լինում: Իսկ եթե դրան ավելացնենք նաև այն, որ հաճախ հողով ծածկելիս անփութի վերաբերմունք, զույց տալով, մեծ մասամբ աչքերը բաց են թողնում, կամ ծածկում հողի բարակ շերտով, որը մինչև ձմեռ կամ ձմռան ընթացքում թափվում է և աչքերը բացվում են, ապա միանգամայն պարզ կլինի, թե վերջին տարիների արտակարգ ցրտերի պայմաններում աշնան աչքապատմաստները ինչու անհաջող են ընթանում:

Ընդունելով, որ վայրակների վրա աչքապատմաստը կատարվում է արմատավորից հաշված 5—6 սմ բարձրությամբ վրա, ապա աչքերը հողով պետք է ծածկել մոտ 15 սմ բարձրությամբ, բավական հաստ խմբով, որպեսզի հողը չթափվի: Աչքերը պետք է ծածկել մինչև ձմռան առաջին ցրտերն ընկնելը՝ հակամեծերի վերջերին: Դարևանը հողը պետք է հետալ դարձան առաջին ցրտերն անցնելուց հետո: Ավելի շուտ բացելու դեպքում աչքերը կջրտահարվեն, իսկ ուշ բացելու՝ խոնավության և տաքության պատճառով նրանք կարող են փչանալ:

Այդպիսի պայմաններում խնամած աչքապատմաստների աչքերը ձմռան ընթացքում լավ պաշտպանված լինելով, զարնանը ժամանակին բացելուց հետո, արթնանում են բարձր տեղում:

Ե Զ Բ Ա Կ Ա Յ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Դրված փորձերի և փորձնական-արտադրական աչքապատմաստների դիտողությունների հիման վրա Արարտոյան հարթավայրի կլիմայական

պայմաններում թիվներու աչքապատվաստների ժամկետները կարելի է համարել հետևյալները.

1. Գարնան՝ վայրակների մեջ հյութաշարժը սկսվելու և բողբոջները բազմելու շրջանում, այսինքն կղանակները կալունանալուց հետո, ապրիլի երրորդ տասնօրյակի սկզբներից մինչև մայիսի 5—10-ը, ձմեռած կրտսերների աչքերով:

2. Աշնան՝ օգոստոսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 20-ը, նույնիսկ մինչև սեպտեմբերի վերջերը, տվյալ տարում աճած կանաչ կտրոնների աչքերով: Զմռան շրջանում աչքերը ցրտից պաշտպանելու համար, պատվաստները ծածկել չոգով 15 սմ բարձրությամբ:

3. Այս երկու ժամկետներից պետք է նախապատվությունը տալ դարձնա աչքապատվաստներին և տվյալ տարվա աչքապատվաստների պլանը հիմնականում կատարել զարնանը: Գարնանը չկառն աչքապատվաստների վերանորոգումը կաաարել աշնանը:

4. Ամռան՝ տնկարաններում պատվաստը կատարել տվյալ տարվա ամռան կանաչ կտրոնների աչքերով, վերջինները հասունանալու մոմենտից մինչև հուլիսի 10—15-ը, իբրև միջոցառում զարնան աչքապատվաստների վերանորոգման համար:

5. Շերամի կերակրման համար չօգտագործվող երիտասարդ բարձրաբուն թիվները պատվաստել նույնպես զարնանը, կղանակները կալունանալուց հետո, ապրիլի երրորդ տասնօրյակի սկզբներից մինչև մայիսի 5—10-ը, ձմեռած կտրոնների աչքերով:

6. Հին, օգտագործվող բարձրարուն թիվներները, պատվաստել ամռան շրջանում, շերամի զարնան կերակրումները վերջանալուց հետո, տվյալ տարվա ամռան կանաչ կտրոնների աչքերով, վերջինները հասունանալու մոմենտից մինչև հուլիսի 10-ը:

Ստացվել է 25 III 1950

Հայկական ՍՍՏ Դիտու թյունների
Ահադեմիայի բուսաբանական աշխ.
Փրկանի Երամատպահական կոչան:

Կ Ր Ա Կ Ա Ն Ո Ւ Թ 8 Ո Ւ Ն

1. Н. Шелков — Шелковица, ее разведение и пользование ею. С. Петербург, 1899.
2. Ю. А. Бакулин — Результаты опытов прививки культурной шелковицы. Москва—Ташкент, 1932.
3. С. М. Остроухов — Вегетативное размножение шелковицы по данным опытов интродукционной Шелководства. Селекция и сортоиспытание шелковицы, Москва, 1940.
4. С. П. Безарашвили — Удлинение периода осенней окулировки шелковицы с повышением процента приживаемости и без потери урожая листа. Селекция и сортоиспытание шелковицы, Москва, 1940.
5. Н. В. Мичурин Т. 1 — Иранские и методы работы. Москва—Ленинград, 1939.
6. А. Н. Федоров — Гидрокультура. Москва, 1947.

Г. Г. Хялятян

Сроки окулировки шелковицы

Резюме

Опыты по срокам окулировки шелковицы проводились в 1935—1938 годах в Эчмиадзинском государственном тутовом питомнике и на экспериментальной базе Шелководческой станции в 6 км. от Еревана по Эчмиадзинской дороге.

Окулировки проводились в школе саженцев первого года—летом и осенью, в школе второго года—весной и летом, на молодых неэксплуатируемых деревьях—весной и на старых эксплуатируемых деревьях—летом.

В результате опытных, а также опытно-производственных данных, окулировка шелковицы в климатических условиях Араратской долины может производиться в следующие сроки:

1. Весеннюю окулировку в школе саженцев—в период времени от распускания почек на дичках после установления теплой погоды (в первых числах третьей декады апреля) до 5—10 мая глазками зимовавших черенков.

2. Осеннюю окулировку—с 20-го августа по 20 сентября, а в теплые годы—даже до конца сентября глазками зеленых черенков текущего года. Для защиты привитых глазков от зимних морозов производится окуливание на высоту 15 см. от земли.

Оба срока окулировок—весенняя и осенняя дают высокую приживаемость и рост окулянта. Предпочтение же дается весенней окулировке, т. к. она обеспечивает выполнение плана данного года.

3. Летнюю окулировку в школах саженцев, глазками зеленых черенков текущего года, следует проводить с момента созревания их до 10 июля, как ремонт не прижившихся глазков весенней окулировки.

4. На молодых, неэксплуатируемых деревьях—весной после установления теплой погоды—в первых числах третьей декады апреля по 5—10 мая глазками зимовавших черенков.

5. На старых эксплуатируемых высокоствольных деревьях—после окончания весенних выкормков, глазками зеленых черенков текущего года со времени созревания их до 10 июля.