

Վ. Ս. Ջաֆաբյան

ՄԻԱՍՅԱԿՆԵՐԻ ԿՈՒՆՏՈՒՐԱՆ ԱՌԱՆՑ ԲՈՒԹԱԿԻ

Պապարուծության հիմնական խնդիրները և անկարանների վերականգնման ու զարգացման ուղիները պարզ ու սրտչակի նշված են ՍՍՌ-ի Ժողատնտեսության վերականգնման ու զարգացման հետպատերազմյան 1946—50 թթ. հնգամյա պլանում:

Ներկայումս սովխոզներում ու կոլխոզներում նոր այգիներ հիմնելու հետ միասին մեծ աշխատանք է տարվում կոլխոզնիկների ու բանվոր-ծառայողների անամերձ հողակտորներում պտղատու ծառեր ու հատապտուղների տնկելու ուղղությամբ:

Պաշարուծության զարգացման ամենանեղ տեղը հանդիսանում են անկարանները, որոնք իրենց արտադրանքով չեն բավարարում արտադրության պահանջներին:

Ի. Վ. Բիչուրինը բազմիցս նշել է անկարանների կարևոր դերը պտղաբուծության զարգացման գործում:

Ահաբաժնետ է հիշել Ի. Վ. Բիչուրինի այն կարևոր ցուցումը, որտեղ նա նշում է, որ ատանց արդյունաբերական օբյեկտների անկարանների լայն ցանցի, պաշարուծության զարգացումի անհնարին է, որ այգիներ հիմնելու համար աշխատակիք տնկանյութի և կաք բերել մատիկ անկարաններից, որտեղ նրանք լավ հարմարված են ակդի աճեցողության պայմաններին:

Տնկարանների աշխատանքի հիմնական ցուցանիշը հանդիսանում է ատանդարտ տնկանյութի ելույթը մեկ հեկտարից:

Հայկական ՍՍՌ-ի անկարանների մեծ մասում տնկանյութի ելույթը չափ ցածր է: Ներկայումս անկարանների հիմնական խնդիրն է բարձրացնել տնկանյութի արտադրանքի քանակը և լավացնել որակը:

Տնկանյութի ելույթը բարձրացնելու գործում մի շարք ագրոմիջոցառումների թվում՝ գրական ազդեցություն է ունենում նաև անկարանում միամյակներն ատանց բույսակի աճեցնելը:

Պաշարուծության պրակտիկայում տնկարանների մեծ մասում միամյակներն աճեցվում են բույսակով:

Բույսակը վայրապի (պատմաստակալի) հիմնական ցողունի մի մասն է, որի հիմքում գտնվում է պատվաստված աչքը:

Բույսակին կապում են աչքապատմաստից աճող չիվը՝ նրան կոտրվելուց պահպանելու և ուղղահայաց ուղղությամբ տալու նպատակով: Վայրապների հեռացումը բույսակ թողնելու համար կատարվում է, երբ նրանք ցուցարկում են կենսաունակության նշաններ, իսկ վերջնականապես հեռացվում են ամառվա երկրորդ կեսերին — օգոստոս ամսին:

Բիամյակները բույսակով աճեցնելը կապված է բանվորական շատ և՛ երբ խոշ մի շարք, մեքենայացման չեփավորվող, աշխատանքային պրոցեսների հետ:

Դիմացակները բուժակով աճեցնելու ղեկավարում են ըստ թափի և պատվաստած աչքից զուտ պատվաստակալի վրա նշան ըստ ճյուղավորումները: Վայրապներին աճեցողությունը սկսելուց հետո շատ արագ կերպով բուժանեցին վրա սկսում են աճել կոպտյին ճյուղեր: Այս կողմից ճյուղավորումներն անհրաժեշտ է ամփոփապես հետաքննել: Ուշացնելու ղեկավարում նրանք ծախսում են սննդարար նյութերը և խիստ հետաձգում պատվաստած աչքերի արթնացումը և նրանց հետագա զարգացումը:

Բուժակներին առաջին մաքրումը կատարվում է, երբ բուժակի վրա կգտնվեն թղթերը սկսում են աճել: Ամեն 1—2 շաբաթից հետո այդ գործողությունները կրկնվում է: Հաջկակա՞ն ՄԱԽ-ի ցածրագլի ցանային տեղադրումներում մանավանդ կարևորագույն պահանջներ կաշտերաների վրա, հարկ է լինում այդ գործողությունները կրկնել 3—4 անգամ և նույնիսկ ավելի:

Դիմացակ՝ երբ բուժակով աճեցնելիս, երբ պատվաստաչիվերը աճում հասնում են 5—7 մմ երկարության, նրանց կապում են բուժակին, իսկ երբ նրանք հասնում են 15—18 մմ երկարության՝ առաջին կապից սրտը բարձրության վրա կապում են երկրորդ անգամ: Երկրորդ կապի մամանակ արձակում են առաջին կապը:

Երբ միամյա պատվաստաչիվերի ցողունների հիմքի մասերը փայտանում-ամրանում են, սրը տեղի է ունենում մատուցողական օգնությունը առաջին կեսերին՝ բուժակները դառնում են ավելորդ: Հենց այդ մամանակ կապերը արձակում են և բուժակները վերջնականապես հետաքննում այդու դանակով:

Այս աշխատանքը կատարելու համար պահանջվում են բավական սրահյուլ բանվորներ:

Պրաֆ. Պ. Մ. Շիրոկ խորհուրդ է առելու բուժակները հետաքննել հուլիս ամսի տուփին կեսերին:

Դիմացակ անկարաններում, պատվաստած աչքերի աճեցողությունը նպաստելու նպատակով, վայրաքների հետաքննումը կատարվում է երկու գործողությամբ:

Վայրաքի առաջին հետաքննումը կատարվում է, հենց որ նրանք ցուցաբերում են կենսականության նշաններ, խոցնելով աչքից վերև 10—12 մմ երկարության բուժակի Բուժակի վերջնական հետաքննումը կատարվում է երկու շաբաթից հետո, երբ պատվաստաչիվերը հասնում են 5 մմ երկարության:

Ի. Վ. Բիչուրինի կենսաբանական Ինստիտուտի Ազդեցությունից Սեկտորը 1931 թ. սկսել է ուսումնասիրել միամյակներն առանց բուժակի աճեցնելու հետաքննությունը՝ մի անգամից, աչքի վերին հետաքննելով վայրաքները: Վայրաքները հետաքննելիս կտրվածքը կատարվել է 150 խիստ խիստ:

Դիմացակներն առանց բուժակի աճեցնելու նկարագրում էին առաջին և ի՞նչ երկրորդ ձևերի ղեկավարում էլ, պատվաստաչիվերին ուղղահայաց սեղանային տալու և կտրվելուց ապահովելու նպատակով կատարվում է պատվաստաչիվերի բազիլից երեք անգամ: Առաջին բազիլից կատարվում է վայրաքը հետաքննելուց անմիջապես հետո, երբ սկսել է աճել պատվաստած աչքը՝ հզոր ծածկելով այն: Հետագա բազիլները կատարվում են բավական խորը, այնպես, որ ծածկվում են պատվաստաչիվերի ստորին մասերը,

Միավորակների աճեցման այս ձևը նույնպես պահանջում է լանդաֆ մեծ ծախսեր, որի հետևանքով արտադրությունը կտրվի չի բնագոյնով:

Ի. Ի. Լավրեյսուկեր 1928—29 թվերին նույնանման փորձեր է կատարել Մլեկի փորձնական կայանում, իսկ 1934 թվին նա փորձերը կրկնել է Վրացական ՍՍՌ-ի Կոխտրսկի սովխոզում, ցիարուսային կուլտուրաների նկատմամբ 1935—36 թվերին այդ ուղղությամբ աշխատանքներ տարվել են լայն արտադրական փորձի կարգով:

Փորձերի զբաղան արդյունքների հիման վրա 1938 թվից միավորակներն ուսուցիչ բուխակի աճեցնելու այդ ձևն ընդունվել է Վրացական ՍՍՌ-ի ագրոմիջոցառումներով և լայնորեն կիրառվում է ՍՍՌՄ-ի սուբտրոպիկ խոնավ գոնայի բոլոր ցիարուսային անկարաններում:

Հաշվական ՍՍՌ-ի անկարաններում վայրազների հեռացումը նույնպես կատարվում է երկու գործողությամբ, իսկ այդ գործողությունները տեղի են ունենում ափելի մեծ ընդմիջումով՝ ապրիլից մինչև օգոստոս ամիսը:

Մեզ մոտ բուխակների հեռացումը համընկնում է ամռան աչքապատվաստի աշխատանքների ժամկետների հետ: Այս պատճառով բոլոր անկարաններում լանդաֆերին ձեռքերի զրկված լինելու հետևանքով բուխակների հեռացումը ձգձկվում է:

Բացի զբաղից վայրազների հեռացումը կատարվում է ամառվա ամենաչոց ամսին, կտրվածքի մակերեսը արագ չորանում է, որի հետևանքով բուխակների նեղացվելուց առաջացած վերքերը մինչև աճեցողության վերջը կայտասային չլուսվածք չեն առաջացնում և չեն ծածկվում:

Հաշվական ՍՍՌ-ի ցածրագիր գոնայում, որտեղ ամառը խիստ քամիներ են լինում, միավորակներն առանց բուխակի աճեցնելու հնարավորությունը պարզելու համար 1947 թվից մի շարք անկարաններում տարվում են աշխատանքներ:

1947 թվին փորձը զրվել է Դյուլ. Մինիսարուխյան պետական տընկարանում, փորձի տակ ընդդրկելով երկու սորտ զեղձ (ճուղարի, նախնի և մեկ սորտ ծիրան (Երևանի):

1948 թվին փորձը կրկնվել է ափելի լայն ծափալով՝ կոլխոզային և սովխոզային հինգ անկարաններում, ընդգրկելով չորս սորտ ծիրան (Երևանի, սափենի, կանաչենի և վաղահաս խստովենի), երկու սորտ զեղձ (նարինջի, լոձ) և երեք սորտ խնձոր (Կանաչական ունեհա, Լոնդոնի պեպին և ամառային սպիտակ կալվիլ):

1949 թվին այդ ուղղությամբ աշխատանքներ են տարվել Պապուրտ-ժական ինստիտուտի, Խորապովիկի կոլխոզի և Դյուլ. Մինիսարուխյան պետական անկարաններում:

Փորձարկվել են մեկ սորտ ծիրան (Երևանի, խոսքովենի, աղջանաբաղ, նուխին, արախուլի, սափենի), երեք սորտ զեղձ (նարինջի, լոձ, ճուղարի), երկու սորտ խնձոր (ոսենա Սիմիերենկո, բելֆյուր զեղին) և մեկ սորտ տանձ (մալուչա):

1947 և 1948 թվերին վայրազների հեռացումը կատարվել է, երբ պատվաստաչվերը հասել են 4—5 սմ երկարության և անկարաններում սկսվել է վայրազների մասսայական հեռացումը՝ խոցնելով բուխակ:

1949 թ. վայրազների հեռացումը կատարվել է երկու ժամկետում:

Առաջինը՝ երբ վայրագները և նրանց վրա պատմատմած աչքերը հայտնաբերել էին կենսաուսուցիչները՝ աճեցողություն ունեցողները սկսելու համար՝ երկրորդ ժամկետ՝ երբ պատմատմած աչքերը աճել էին 4—5 սմ երկարություն, և տնկարաններում սկսվել էր վայրագների մաստաշխարհի հետապնդումը՝ բուխակի թուղենի համար՝ Վայրագները հետապնդելու կարգով զբաղվել է աչքի վերինը՝ 450 խեղցիկամբ և վերջը ծածկվել մածկիկով կամ այլ կերպ:

Միամասնակի կից շարքերում հետապնդել են վայրագները, խոշորակի թուղենի սրբան կոնտրոլ:

Վայրագների հետապնդումն առաջին ժամկետի աշխատանքները կատարվել են Պողոսյան, Խառատուտի տնկարանում, Գործարկելով հինգ սորոս ծիրան (Երևանի, Խոտրովենի, աղմահաբաղ, Նուրին, տրոխալիսի), իսկ երկրորդ ժամկետը՝ Պետական տնկարանում և Նորաղավիթի կոնտրոլ արհեստարանում, փորձի առկա բնագործիկով՝ երեք սորոս ղեղձ (Նուրին, Տուգուրի, լոձ), երկու սորոս ծիրան (Երևանի, սախենի), երկու սորոս խնձոր (Ունեևո Սիմերենկա, Գեղին բերվոր) և մեկ սորոս տանձ (մալաչա):

Վեղետապնդի վերջում տարված հաշվառումները հետևյալ պատկերն են ներկայացնում (տես Ա. Մ. 1, 2 և 3 աղյուսակները):

Աղյուսակներում բերած թվերից պարզ երևում է, որ առանց բուխակի աճեցրած միամշակները, վայրագների հետապնդումն առաջին և ինքն երկրորդ ժամկետում, ունեն սրահական լավ ցուցանիշներ: Միամշակների երկարությունը, հաստությունը և բնականորեն աճը ազդեցիկ բարձր է, քան կոնտրոլի մաս: Բացի դրանից առանց բուխակի միամշակների մոտ վայրագների հետապնդումը հետ կարգավորվել չէր չէր զոյացել և խցանային շերտ, որի հետևանքով վերքի տրամագիծը բավական փոքր է, իսկ սրբանի զիջումը վերքը բավարարելու ծածկվել է: Կոնտրոլ միամշակների մոտ մինչև վեղետապնդի վերջը վերքերի խցանացումը բոլորովին առկա չի ունեցել և նրանց մակերեսը բավական մեծ է:

Այսպես օրինակ վայրագները հետապնդելու առաջին ժամկետում ծիրանի երևանի սորոսի միամշակների վերքի տրամագիծը հասնում է 0,1—0,5 սմ, միջինը 0,4 սմ և նրանց 30°-ը ունեն վերքերի լրիվ ներածում, իսկ կոնտրոլ միամշակների վերքի տրամագիծը հասնում է 0,8—1,6 սմ, միջինը 1—0 սմ:

Խոտրովենի սորոսի առանց՝ բուխակի միամշակների վերքերի տրամագիծը կազմում է 0,1—0,6 սմ, միջինը 0,3 սմ, իսկ 28°-ը ունեն վերքերի լրիվ խցանացում: Կոնտրոլ միամշակների վերքերի տրամագիծը հասնում է 1,1 սմ, միջինը 0,7 սմ, իսկ վերքերի լրիվ խցանացումը տեղի չի ունեցել:

Նուրին սորոսի միամշակների 42°-ը ունեն վերքերի լրիվ խցանացում, մշտների մոտ այն հասնում է 0,1 սմ—0,4 սմ, միջինը 0,2 սմ, իսկ կոնտրոլի մոտ՝ հասնում է 1,3 սմ և լրիվ խցանացում տեղի չի ունենում:

Նույն երևույթը նկատվում է նաև երկրորդ ժամկետում, որի հետևանքով վայրագները հետապնդել են, երբ պատմատմած աչքերը հասել են 4,5 սմ երկարության:

Հաշվառումները ցույց են տվել, որ երկրորդ ժամկետում կոնտրոլում են զրոյան արդյունքներ: Առանց բուխակի աճեցրած միամշակները

կոնսուրյի համեմատությամբ ունեն լավ ցուցանիշներ: Այսպես որինակ՝
 դեղձերից ճուղորի սուրտի միավյակներն առանց բուժակի աճեցնելիս
 նրանց 28⁰/₁₀-ը սահեցել են վերքերի լրիվ խցանացում, մյուսների մոտ այն
 հասնում է 0,4 սմ, իսկ կոնսուրյ միավյակների վերքերի միջին տրամա-
 դիժը հասնում է 0,7 սմ և լրիվ խցանացում տեղի չի ունեցել:

Ծիրանների սորտերը նույնպես առանց բուժակի աճեցնելիս միա-
 մյակների 12—42⁰/₁₀-ը ունեն վերքերի լրիվ խցանացում, իսկ կոնսուրյի
 մոտ նույնիսկ վերքերի խցանացման հետքեր չեն նկատվում: Նույնը կա-
 բելի է ստել նաև խնձորի ու տանձի մասին (տես № 3 աղյուսակ):

Միավյակների չափումների արդյունքները, որոնց վայրդաները հետագվել են,
 երբ պատվաստաշիջերը հասել են 4—5 սմ երկարության

Աղյուսակ 1

Տ և ս ա կ ր	Ս օ ր տ ր	Վ ւ ր թ ա ն տ	Ս ա ն տ ի մ ե տ ր ն ե ր ո Վ					
			Հազվ. ամյակ ներ	Միավյակ- երկարություն	Միավյակ- հաստություն	Աճի մարդ	Վերքի տրամագիծը	Վերքերի խցանացումը
1947 թ. Ծիրան	Երևանի	Առանց բուժակի	50	101,0	1,25			
		Բուժակով	50	84,15	1,07			
	Դեղձ	Առանց բուժակի	50	95,7	1,75			
		Բուժակով	50	89,8	1,13			
1948 թ. Ծիրան	Նարինջի	Առանց բուժ	50	118,3	1,46			
		Բուժակով	50	117,0	1,45			
	Երևանի	Առանց բուժակի						
		Բուժակով	50	173	1,72	345	0,7	—
	Սաթենի	Առանց բուժ.	50	147	1,47	262	1,45	—
		Բուժակով	50	150	1,77	291	0,5	—
	Կանաչենի	Առանց բուժ.	50	138	1,59	203	1,2	—
		Բուժակով	50	140	1,14	219,3	0,5	—
	Խոսրովենի	Առանց բուժ.	50	111	1,1	192	0,8	—
		Բուժակով	50	116	1,11	176	0,6	—
	Նարինջի	Առանց բուժ	50	101	1,02	162	0,86	—
		Բուժակով	50	80,0	1,45	204	0,3	—
Խնձոր	Լ. ռ. ձ	Առանց բուժ	50	71,8	1,4	180	1,3	—
		Բուժակով	50	80,0	1,9	318	0,48	—
	Կանաչակ. սենյակ	Առանց բուժ.	50	72,6	1,76	300	1,27	—
		Բուժակով	50	112	1,27	172	—	—
	Հոնդոնի պե- սին	Առանց բուժ.	50	109	1,2	137	—	—
		Բուժակով	50	111	1,2	120	—	—
	ամսուգա- պիտակ	Առանց բուժ.	50	109	1,2	105	—	—
		Բուժակով	50	106	1,06	106	—	—
	Կալվի	Առանց բուժ.	50	86	1,05	86	—	—
		Բուժակով	50					

Այսպիսով փորձնական աշխատանքները ավարտներն ապացուցում են, որ Հայկական ՍՍՀ-ի ցածրագիրը գտնում ծիրանի, դեղձի, խնձորի, տանձի և այլն միամյակների առանց բուխակի աճեցնելը անարտադր և նպատակահարմար է հետևյալ դրական ցուցանիշների պատճառով:

1. Միամյակներն առանց բուխակի աճեցնելու բնիկացքում չեն նկատվել տնկիների ծամովելու, ուղղահայաց դրոժյունից թերվելու և կոտրվելու դեպքեր:

2. Առանց բուխակի միամյակներն ունեցել են ուղղահայաց աճ, պատմասակալի հետ հեռացման որոշ տնկյուն չեն կազմել, որի հետևանքով մեծացել է պատմասակալի և պատմաստաշիվի ներածման մակերեսը, որով մեծացել է նաև ներածման ամբողջությունը:

3. Միամյակներն առանց բուխակի աճեցնելու դեպքում ավելացել է սառնդարտ անկանյութի քանակը, որը պայմանավորվում է միամյակների ավելի երկարությունը, հաստությունը և բնիկաները աճով (տե՛ս աղյուսակ 1, 2, 3-ի համապատասխան ցուցանիշները) կոտորվել համեմատությամբ:

Միամյակների չափումների արդյունքները, որոնց վայրագները հետաքննել են տնկիջուղիկը՝ պատմաստաճ աչքից վերև

Պտղար. ինտերսուսի տնկարան

Աղյուսակ 2

Տեղանք	Սորտը	Վարիանտ	Ներքին տնկի բույս	Ստորմտրնեքով				
				Միամյակ երկարություն	Միամյակ հաստություն	Ավելի զարմա- րակ	Վերին տնկի բույս	Վերին տնկի բույս
Մի րան	Երևանի	Առանց բուխ.	50	134,0	1,56	238	0,4	30,0
		Բուխակով	50	125,0	1,4	210	1,0	—
	Խոտրովինի	Առանց բուխ.	50	115,0	1,6	195	0,3	28,0
		Բուխակով	50	113,0	1,5	180	0,7	—
	Աղջանարաց	Առանց բուխ.	50	121,0	1,45	209	0,3	20,0
		Բուխակով	50	111,0	1,3	175	0,63	—
	Նոսրին	Առանց բուխ.	50	118,4	1,51	184,5	0,23	42
		Բուխակով	50	113,0	1,35	184,0	0,7	—
	Աբուխալերի	Առանց բուխ.	50	119,5	1,51	198,0	0,26	22
		Բուխակով	50	106,0	1,4	159,0	0,9	—

Բացի որակական ցուցանիշներից, միամյակներն առանց բուխակի աճեցնելը կարևոր առավելություններ ունի նաև տնտեսական տեսակետից:

Միամյակներն առանց բուխակի աճեցնելու դեպքում կրճատվում են մի շարք մոքենայացման չափերից և շատ բանվորական ձեռքեր պահանջող աշխատանքներ, ինչպես օրինակ՝ պատմաստաշիվերը երկու տնդամ բուխակին կապելը, առաջին կապի արձակելը, երկրորդ կապի մամա-

Միավորների չափումների աղյուսակները, որոնց վայրագները հետագանի են,
երբ պատգամադրվենք հասնի են 4-5 ամ երկարությամբ

Աղյուսակ 9

Տեսակը	Ստոր	Վարձան	Ս ա ն ա լ ժ ա ռ Ն ե թ ո Վ					
			Նախնական	Միավոր	Միավոր	Միավոր	Միավոր	Միավոր
Շրջան	Նրանի	Առանց բաժ.	50	157,7	1,76	383,7	0,28	12,0
		Բաժանով	50	135,0	1,5	278,0	0,0	—
	Ստանի	Առանց բաժ.	50	130,0	1,6	344,8	0,27	47,0
		Բաժանով	50	125,5	1,5	317,0	0,96	—
Գ Ն Վ Ն	Նորինի	Առանց բաժ.	50	65,5	1,5	273,0	0,4	—
		Բաժանով	50	68,0	1,47	251,0	1,11	—
	Լ ա Ն	Առանց բաժ.	60	72,9	1,6	313,2	0,9	—
		Բաժանով	50	70,0	1,6	273,3	1,2	—
	Ճուշտի	Առանց բաժ.	50	70,0	1,6	255,0	0,4	28
		Բաժանով	50	68,7	1,5	243,0	—	—
Կանգ	Ռենհա Սի- միթենի	Առանց բաժ.	50	140,0	1,87	218,0	0,64	12,5
		Բաժանով	50	140,0	1,7	150,0	1,04	—
	Դեզին Բի- Փիլի	Առանց բաժ.	50	139,0	2,15	198,0	0,6	4,0
		Բաժանով	50	112,0	1,72	185,0	0,96	—
Ցան	Մալա	Առանց բաժ.	50	118,0	2,02	125	0,5	10,0
		Բաժանով	50	106,0	1,7	106	0,94	—

ապի, բաժանների մացառներից 3-4 անգամ մաքրելը և բաժանների հե-
ռացումը ամռան վերջերին:

Այս աշխատանքները կատարելու համար միջին հաշվով պահանջվում է 212-220 բանվորական ուժ՝ մեկ հեկտարին, որը կազմում է տնկարանի 2-րդ գաղտի բնօրինակը, աշխատանքների 35-40% -ը, իսկ առանց բաժան-
կի աճեցնելու, դեպքում բանավճի խնայողությունը իստեղծ է 175-245
բանվորական ուժի (տես աղյուսակ № 4):

Նրեք տարիների փորձնական աշխատանքների միանգամայն դրական
աղյուսակներն ապացույցել են միավորներն առանց բաժանի աճեցնելու
նպատակադրման խոշոր նշան:

Մեր բնրած փորձնական տվյալների հիման վրա անհրաժեշտ է այս
միջոցառումը ներդնել առաջարկության մեջ արդյունաբերական պաշարա-
նայության ռալոնների մի շարք տնկարաններում, միավորմանակ չարունա-
կել նրանց վրա անհրաժեշտ դիտողություններ՝ վերջնական կարակալու-
թյուն անելու նպատակով:

Խոնավորական ու ժի պահանջը մեծապահանջը բուժակով և ստանդ բուժակի
անհրաժեշտ դեպքում

Աղյուսակ 4

Աշխատանքի տեսակը	Բ ո լ թ ա կ ո վ			Առանց բուժակի		
	Մեծապահանջ բանակը մեկ հեկտարում	Արտադրական նորմա հատե- րով	Բանուժի պա- հանջը մեկ հեկ- տարին	Մեծապահանջ բանակը մեկ հեկտ.	Արտադրական նորմա մեկ հեկտարին	Բանուժի պա- հանջը մեկ հեկ- տարին
Վայրազների հեռացումը թող- նելով բուժակ	25—30,000	1000	25—30			
Վայրազների հեռացումն աչքի վերին	—	—	—	25—30,000	1000	25,30
Պատվաստաշիվի 1-ին կապը	25—30,000	600	40—50	—	—	—
Պատվաստաշիվի 2-րդ կապը	»	800	30—35	—	—	—
Վայրի մացառների մաքրումը բուժակի վրայից 3—4 անգամ	»	1000	75—120	—	—	—
Բուժակների հեռացումը ամառն վերջերին	»	800	30—40	—	—	—
Վերքը ծածկել մածիկով կամ օլիֆով	»	2000	12—15	25—30,000	2000	12—15
			212—290			37—45

Վայրազները հեռացնելու մասնակ անհրաժեշտ պայման պիտի հա-
մարել վերքերը մածիկով կամ օլիֆով ծածկելը:

Վերքերը բաց թողնել չի կարելի, որովհետև արևի և քամիների ազ-
դեցությունը հետևանքով վերքերի վրա փայտանյութը կչորանա և կճաք-
ճքվի, որից կդանդաղի վերքի խցանացումը:

Հայկական ՍՍՏ

Ստացվել է 12 IV 1950

Զիտուխյունների Ակադեմիայի

Պողարու մոխրյա Ինստիտուտ

В. С. Захарян

Культура окулянтов без шипа

Р е з ю м е

В практике плодоводства в питомниках ведется культура оку-
лянтов с шипами, что связано с применением ряда трудоемких ра-
бот, не поддающихся механизации.

Для выяснения возможности культуры окулянтов без шипа в
низменной зоне Армянской ССР, в течение последних трех лет бы-
ли проведены опыты над абрикосами, персиками, яблонями и гру-
шами.

В 1947 и 1948 г. г. удаление дичков проводилось в срок, когда благородные побеги достигали 4—5 см длины.

В 1949 г. удаление дичков проводилось в два срока: первый, когда дички и привитые глазки только проявляли признаки жизнедеятельности, второй, когда благородные побеги достигли 4—5 см. длины.

В результате этих опытов оказалось, что по всем породам и сортам у окулянтов без шипа длина, толщина и средняя сумма прироста сравнительно выше, чем у контрольных (табл. 1, 2 и 3), вследствие чего повышается выход стандартных саженцев.

У окулянтов без шипа к осени диаметр ран был намного меньше, чем у контрольных, у которых до конца вегетации не образовался калюсный наплыв и даже не намечалось начало зарастания.

При этом не наблюдаются искривленности и отклонения от вертикального положения и случаев поломки от сильных ветров, характерных для низменной зоны Армянской ССР. Наоборот, они имели вертикальный рост, не образовали углов отхождения с подпоями, поверхность срастания подвоев с привоями значительно увеличилась, следовательно увеличилась и прочность их срастания.

Выращивание окулянтов без шипов имеет ряд преимуществ и с экономической точки зрения, при этом исключается ряд трудоемких ручных работ, как то: две подвязки к шипу, 3—4-х кратное удаление поросли на дичках и вырезка шипов, экономия в работе, которая составляет от 175 до 245 рабочих дней на га второго поля интенифика.

Необходимо этот способ выращивания окулянтов внедрить в производство и одновременно повторить опыт для окончательных выводов.