

ՀԱՄԱԿԱՌՏ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԹՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐ

Ս. Պ. Մանգոյան

ԲԱՍԲԱԿԵՆՈՒ ԱՌԱՋԻՆ ՍԻՄՊՈԴԻԱՅԻ ԳՈՅԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
 ՀԱՅԿ. ՍՍՐ-Ի ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Բամբակենու վաղաճատության խնդրում կարևոր նշանակություն ունի նրա պարպացման ֆազաների արագ հաջորդումը մեկը մյուսին: Բամբակենու բույսի կազմավորման պրոցեսում մեծ տեղ է զբաղում այն հանգամանքը, թե որ հանգույցի վրա է գոյանում առաջին պտղատու ճյուղը: Վաղաճատ սորտերի մաս առաջին պտղատու ճյուղը գոյանում է զլխավորացեա 3-րդ և 4-րդ հանգույցների վրա, հաճախ 2-րդ և երրեմն առաջին հանգույցի վրա, միջնաճատ սորտերի մոտ՝ 5-րդ և 6-րդ հանգույցների վրա, իսկ ուշաճատ սորտերի մոտ՝ 8-րդ-ից մինչև 10-րդ և ավել հանգույցների վրա: Այսպիսով, որքան ցածր հանգույցների վրա է կազմակերպվում առաջին պտղատու ճյուղը, այնքան ավելի վաղաճատ է լինում սորտը:

Բամբակենու վաղաճատության կապակցությամբ առաջին պտղատու ճյուղի առաջացման խնդիրը կարևոր համարելով, մենք ձեռնարկեցինք այդ հարցի ուսումնասիրությունը մի քանի ուղղությամբ:

Պարզված է, որ, թե ինչ ազդեցություն է ունենում ցանքի խտությունը առաջին բերքատու ճյուղի գոյացման արագության վրա: Այս հարցի հետազոտությունը կատարված է էջմիածնի շրջանի Փայտաքար գյուղի կայստղում ՀՍՍՐ Գիտությունների ակադեմիայի իսկախան անդամ Դ. Հ. Բարաճանյանի և գիտաթյունների թեկնածու Ս. Դ. Բարսեղյանի կողմից դրված բամբակենու երկշառային ցանքի փորձահողամասում, սրտեղ կատարվել է խաչաձև կտրափայտի: Արդյունքները բերում ենք Ա-1 աղյուսակում:

Աղյուսակ I.

Բամբակենու ցանքի խտության ազդեցությունը
 առաջին պտղատու ճյուղի առաջացման վրա

Սորտը	Ցանքի խտությունը	Հետազոտված բույսերի քան.	Առաջին պտղատու ճյուղի առաջացումը (ստորանքով)							
			Ց-րդ հանգույցի վրա	Վ-րդ հանգույցի վրա	Մ-րդ հանգույցի վրա	5-րդ հանգույցի վրա	6-րդ հանգույցի վրա	7-րդ հանգույցի վրա	8-րդ հանգույցի վրա	Մ. միջին բամբակենու քան.
1298	Մեկ բույսերում 2 բույս	194	37,2	49,2	12,8	0,1	0,2	0,2		3,78
	Մեկ բույսերում 8 բույս	383	33,9	50,7	12,5	2,6	0,3	0,0		3,85

Աղյուսակից երևում է, որ 3-րդ հանգույցի վրա առաջին բերքատու ճյուղը ունեցող բույսերի քանակը բույսերում 2 բույս լինելու դեպքում 3,3⁰ սով ավել է, քան նույն հանգույցի վրա, մեկ բույսերում 8 բույս

լինելու գեղաբանական համարյա նույն հարաբերությունները երկու վարիանտներին հիմնականում քիչ պակաս չափով պահպանվում է 4-րդ, 5-րդ և այլ հանդույցների վրա: Անհրաժեշտ է նաև առաջին սիմպոզիայի միջին բարձրություններին (31) տաքերությունները (3,85—3,78): Առաջի կարևոր է եզրակացնել, որ խոտաթյուրները երկշարտային ցանքի խոտածին կուլտիվացիայի գեղաբանական միջակ հոգևորում, հետևաբար առավել ևս խոտը հողերում, չի ազդում առաջին սիմպոզիայի առաջացման պրոցեսի բնական վրա: Այլ կերպ ասած, չի ազդում բամբակի հասունացման պրոցեսի վրա: Ի վարանցյանի [1] փորձերը ցույց են տալիս, որ խոտաթյուրները չի փոխում այն բարձրությունը (ըստ հանդույցների), որի վրա գոյանում է առաջին սիմպոզիալ ճյուղը:

Առաջին բերքատու ճյուղի զոյացումը բամբակենու ցողունի տարբեր բարձրությունների վրա կապված է սորտի հետ, սակայն այդ խնդրում կարևոր դեր են կատարում նաև շրջապատի պայմանները: Սովորաբար վեղատացիոն շրջանի բնիկացրում աննպաստ պայմանները գեղաբանական աշխատանքների մոտ առաջին սիմպոզիան առաջանում է ավելի բարձր հանդույցների վրա, քան նպաստավոր պայմանների գեղաբանական: Այլ կերպ ասած աննպաստ պայմանների գեղաբանական հասունացումը աշխատում է: Ս. Ջերիկսը [2] նպաստավոր պայման է համարում առաջին վեղատացիոն ջրի համընկելը բուսանիզացիայի սկզբի հետ: Բ. Պ. Սորատուսը [3] գտնում է, որ ջրի և սննդի ավելորդ քանակի գեղաբանական առաջին բերքատու ճյուղի զոյացմանը նախորդում են մի քանի ոչ բերքատու ճյուղեր [2—3]: Ըստ Գ. Գ. Քուսանյանի [4] ուսումնասիրությունների, կլիպտակոն ֆուսայի Ա—06-ի նկատմամբ, հարուստ բերքի հողերում բամբակենու բույսերի առաջին սիմպոզիալ ճյուղը գոյանում է ավելի բարձր հանդույցների վրա, քան աղքատ հողերում: Օրինակ՝ հարուստ հողերում առաջին սիմպոզիան 67⁰ և ավելադակերովում է մինչև 8-րդ հանդույցի վրա, իսկ աղքատ հողերում նույն բարձրությունը վրա՝ 81—87⁰ և:

Մեր ուսումնասիրությունների 2 տարվա արդյունքները տարբեր սորտերի վերաբերյալ առաջին բերքատու ճյուղի առաջացման նկատմամբ բերում ենք հետևյալը:

2-րդ աղյուսակից երևում է, որ վաղաճառ սորտերի նկատմամբ այն է՝ 1298, Հ 3210 և ՕԱ—1, բույսերի մեծագույն մասի մոտ առաջին բերքատու ճյուղը կադմախրվում է գլխավորապես 3-րդ և 4-րդ հանդույցների վրա: Իսկ աշխատանք սորտերի մոտ նրա առաջացումը ձգձգվում է, տեղափոխվելով մեծ մասամբ 9-րդ, 10-րդ և ավելի բարձր հանդույցների վրա (Հ 450 555)։

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

1. Միջակ հողերում խոտածին կուլտիվացիայի գեղաբանական ցանքի խոտաթյուրները չի ազդում առաջին բերքատու ճյուղի զոյացման բնիկացրի վրա, կամ չի ազդում բամբակի հասունացման բնիկացրի վրա:

2. Վեղատացիոն շրջանի աննպաստ պայմաններում առաջին բերքատու ճյուղը աշխատանք սորտերի նկատմամբ առաջանում է համեմատաբար ավելի բարձր հանդույցների վրա, սրով և ձգձգվում է հասունացման շրջանը:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. И. Варунян—Еще о густоте посева хлопчатника. Ж. Хлопковое дело. 1, 1930.
2. С. Джерих—Возделывание хлопчатника с суженными междурядиями. Советское хлопководство, 7, 1-41.
3. Б. И. Страумал—Сорта хлопчатника. 1948.
4. Г. Г. Туманян—О возможности разведения египетского хлопчатника в Арм. ССР. 1946.

С. И. Мандоян

Об образовании первого симподия хлопчатника в условиях Армянской ССР

Р е з ю м е

Высота закладки первого симподия на стебле хлопчатника предопределяет его скороспелость. В связи с этим изучалось влияние некоторых факторов на ускорение появления первого симподия.

На опытном участке Института генетики и селекции растений АИ в колхозе с. Паракар Эчмиадзинского района выяснено, что на средних почвах с применением перекрестной культивации густота посева не влияет на процесс образования первого симподия, иначе говоря, на процесс созревания хлопка. При этом сопоставлялась густота в букете с 8 кустами на двухстрочном посеве с густотой букета с 2 кустами на обыкновенном рядовом посеве.

При неблагоприятных условиях вегетационного периода у позднеспелых сортов сильно загибается созревание хлопчатника, ввиду того, что задерживается закладка первого симподия.

