

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Т. М. Мешкова

О новых местонахождениях *Hemidiaptomus*
tarnogradskii Rylov на Кавказе

В 1926 г. Рыловым [2] был описан из озера Цути на Северном Кавказе (высота 2450 м над ур. м.) новый вид веслоногого рачка из рода *Hemidiaptomus*—*H. tarnogradskii*, определенный им предварительно как *H. ignatovi* var. *tarnogradskii*.

Нахождение близкого к *H. ignatovi* (распространенного в водоемах юго-западной Сибири и западной части Центральной Азии) вида на Северном Кавказе Рылов считает интересным явлением, предполагая, что этот веслоногий рачок является реликтом третичного времени.

О втором местонахождении *H. tarnogradskii* в одном из озер группы Шай-Дзуар (высота около 3000 м над ур. м.) сообщает Тарноградский [3], называя этого рачка, согласно предварительному определению Рылова, *H. ignatovi* var. *tarnogradskii*.

Дальнейших указаний в литературе на местонахождение этого вида веслоногого рачка в других водоемах до сего времени мы не находим.

В апреле 1947 г., при гидробиологическом исследовании двух маленьких безымянных водоемов, расположенных: один—недалеко от оконечности Севанской бухты оз. Севан, второй—вправо от ереванской шоссеиной дороги за поселком Севан, нами были найдены в значительных количествах половозрелые особи крупного веслоногого рачка (самка—5 мм, самец—4 мм), морфологическое исследование которых показало принадлежность их к *H. tarnogradskii* [1].

В 1951 г. экспедиция Севанской гидробиологической станции Академии наук Армянской ССР, при исследовании реки Макенис, побывала на озере Ала-гель, находящемся в крайнем юго-восточном углу бассейна оз. Севан, в пределах Азербайджанской ССР (на высоте 2731 м над ур. м.). В планктонных пробах, взятых в этом озере, было найдено 2 вида веслоногих рачков, один—*Diaptomus acutilobatus*, второй был определен нами как *H. tarnogradskii*.

Таким образом, местонахождение указанного выше веслоногого рачка, благодаря двум последним находкам, расширяется с Северного Кавказа в Азербайджан и Армению. Надо полагать, что фаунистические исследования небольших водоемов Закавказья (вид, повидимому, является обитателем небольших водоемов) позволят установить этот вид еще в целом ряде мест.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Мешкова Т. М. Новый вид веслоногого ракообразного. *Diaptomus anahitae* sp. nov., из Армении. ДАН Арм. ССР, IX, 1, 1948.
2. Рылов В. М. *Hemidiaptomus tarnogradskii* sp. nov., новый вид веслоногого ракообразного с Северного Кавказа. Раб.-Сев. Кав. Гидробиол. ст., т. I, вып. 2, 1926.
3. Тарноградский Д. А. Отчет о деятельности Сев.-Кав. Гидробиол. ст. при Горском с.х. ин-те за 1923—25 гг. Раб. Сев.-Кав. Гидробиол. ст., т. I, вып. 1, 1925.

Տ. Մ. Մեշկովա

HEMIDIAPTOMUS TARNOGRADSKII RYLOV-ի
ՆՈՐ ԱՊՐԵՆԱՎԱՅՐԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԿՈՎԿԱՍՈՒՄ

Ա Մ Փ Ո Փ ՈՒ Մ

Hemidiaptomus tarnogradskii թիավոտ խեչափառը նկարագրել է Ռիլովը 1926 թվականին Հյուսիսային Կովկասի Յուսի լճից: Տարնոգրադսկին՝ որպես այդ տեսակի երկրորդ ապրեյալայրը նշում է Շաու Չուար խմբի լճերից մեկը:

Իրականություն մեջ նրա տարածման մասին ուրիշ տեղեկություն չկա:

Սևանի լճի ափին գտնվող երկու փոքրիկ և ժամանակավոր լճակների պլանկտոնն ուսումնասիրելիս և Սևանա լճի ավազանի հարավ-արևելյան անկյունում Ադրբեջանի ՍՍՌ-ում գտնվող Ալա-գյոլ լճի պլանկտոնի նմուշները վերլուծելիս՝ այնտեղ ապրող թիավոտ խեչափառների մեկ տեսակը մեր կողմից որոշված է որպես *H. tarnogradskii*:

Այսպիսով, վերջին այդ երկու հայտնաբերումների շնորհիվ *H. tarnogradskii* տարածման սահմանները լայնանում են և Հյուսիսային Կովկասից հասնում են մինչև Ադրբեջան և Հայաստան: